

中西医内科主治医师《专业实践能力》模考试卷

一、A2型题

1. 某男, 32岁, 因寒战、高热、咳嗽5天入院。查体: 血压115/75mmHg, 急性病容, 呼吸急促, 口唇发绀, 右下肺可听到支气管呼吸音。X线示: 肺段大片炎症浸润阴影。血象: 白细胞 $17 \times 10^9/L$, 中性粒细胞0.78。其治疗叙述错误的是
- A. 一经诊断应立即开始抗生素治疗
 - B. 首选青霉素G
 - C. 病人应卧床休息, 宜食用营养而易消化的食物
 - D. 可应用大环内酯类、氟喹诺酮类、头孢菌素类药物治疗
 - E. 首先应用退热剂, 使体温尽快恢复正常
2. 患者, 女, 35岁。诊断为甲状腺功能亢进症。半年来常有心悸失眠, 消瘦, 神疲乏力, 气短汗出, 口干咽燥, 手足心热, 纳差便溏, 双眼突出, 颈前肿大, 双手颤抖, 舌淡红少苔, 脉细。其证型是
- A. 气阴两虚
 - B. 气血两虚
 - C. 阴虚火旺
 - D. 气滞痰凝
 - E. 肝火旺盛
3. 患者男性, 78岁。肺心病合并慢性呼吸衰竭病史20余年, 现症见: 神志恍惚, 躁动不安。实验室检查: 血气分析: pH7.20, 动脉血二氧化碳分压78mmHg, 其最重要的治疗是
- A. 补充碳酸氢钠, 积极纠正酸中毒
 - B. 应用镇静剂, 减少耗氧量
 - C. 积极氧疗
 - D. 改善通气, 增加肺泡通气量
 - E. 大剂量使用抗生素
4. 患者男性, 30岁。3天前淋雨后出现畏寒高热, 咳嗽, 主要为干咳, 偶见铁锈色痰, 伴右侧胸痛。查体: 热性病容, 体温 $38.9^{\circ}C$, 右上肺叩诊实音, 闻及支气管呼吸音, 心率: 100次/min, 律齐。该病最可能的诊断是

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 肺炎衣原体肺炎
- C. 肺炎克雷伯杆菌肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 流感嗜血杆菌肺炎
5. 患者男性, 70 岁。既往有冠心病, 时有心悸, 胸闷反复发作, 心电图示 P 消失, 代之的是 f 波, 频率 350 次/min, QRS 波间隔不规则。其诊断为
- A. 心室颤动
- B. 阵发性室上速
- C. 心房颤动
- D. 心房扑动
- E. 心室扑动
6. 患者男性, 75 岁。既往有房颤病史 10 年, 高血压, 平时未系统治疗, 3 天前走路时突然倒地伴失语。最可能的原因是
- A. 脑出血
- B. 脑血栓
- C. 脑动脉硬化
- D. 脑血肿
- E. 脑栓塞
7. 患者, 女, 46 岁。心悸不宁, 善惊易恐, 坐卧不安, 恶闻声响, 失眠多梦, 舌苔薄白, 脉虚数。治疗应首选
- A. 安神定志丸
- B. 朱砂安神丸
- C. 酸枣仁汤
- D. 天王补心丹
- E. 养心汤
8. 患者, 女性, 56 岁。心悸失眠 1 月余。思虑过度则见心悸, 眩晕, 失眠, 多梦, 食少, 体倦乏力, 面色无华, 舌淡, 脉细弱。其中医证型是
- A. 肝气乘脾

B. 心血不足

C. 心神不宁

D. 心肾不交

E. 肝火犯胃

9. 患者，男，65岁。咳嗽、咯痰20余年，近3年来出现气喘。在肺底部可闻及湿性啰音，双肺广泛听到哮鸣音。最可能的诊断是

A. 支气管肺癌

B. 支气管哮喘

C. 支气管扩张症

D. 慢性支气管炎喘息型

E. 肺结核

10. 患者，男，21岁。患肺结核1年有余，曾予化疗药物，现行中医治疗。症见咳嗽无力，气短声低，咳痰清稀，色白，量较多，偶咯血，血色淡红，午后潮热，伴有畏风怕冷，自汗、盗汗并见，纳少神疲，便溏，面白，舌质光淡，边有齿印，苔薄，脉细弱而数。辨证为

A. 肺阴亏损证

B. 阴虚火旺证

C. 气阴耗伤证

D. 阴阳两虚证

E. 肺气亏虚证

11. 患者男性，59岁。5年前始胸痛隐隐，时轻时重，过劳后诱发，伴心悸，气短，乏力，自汗，舌淡紫，苔白，脉缓弱，其治则宜

A. 活血化瘀，通脉止痛

B. 通阳泄浊，豁痰开痹

C. 益气活血，通脉止痛

D. 辛温通阳，开痹散寒

E. 益气养阴，活血通络

12. 患者女性，62岁。9年前始自觉胸闷痛，气短喘促，痰多，形体肥胖，肢体沉重，舌苔浊腻，脉滑，治疗宜首选

- A. 补阳还五汤
- B. 生脉散合炙甘草汤
- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D. 血府逐瘀汤加减合二陈汤
- E. 瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤

13. 患者女性, 78 岁。持续胸骨后疼痛 1 小时来诊, 查体: 血压 90/60mmHg, 双肺湿啰音。心电图: 胸前导联 ST 普遍抬高, 可见室性期前收缩, 在前往病房途中突然抽搐, 经抢救无效死亡, 最可能的死亡原因是

- A. 心力衰竭
- B. 心脏破裂
- C. 心源性休克
- D. 室颤
- E. 脑出血

14. 患儿, 男, 6 岁。因血尿、眼睑浮肿、高血压被诊断为肾炎。现症见发热而不恶寒, 咽喉疼痛, 口干口渴, 头面浮肿, 尿少色赤, 舌质红, 苔薄黄, 脉浮数。治疗宜选

- A. 越婢加术汤加减
- B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮加减
- C. 麻黄汤合五苓散加减
- D. 五皮饮合五苓散加减
- E. 防己黄芪汤加减

15. 患者, 男, 57 岁。有慢性肾衰竭病史 5 年。现头晕头痛, 耳鸣眼花, 两目干涩, 口干咽燥, 腰膝酸软, 大便易干, 尿少色黄, 舌淡红少津, 苔薄白, 脉弦。血压升高达 160/92mmHg。治疗应首选

- A. 六味地黄丸
- B. 金匱肾气丸
- C. 杞菊地黄汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 全鹿丸

16. 患者男性, 38 岁。患风湿性心脏病多年, 近日活动后心悸气短加重, 倦怠乏力, 头晕目眩, 面色无华, 动则汗出, 夜寐不宁, 口干, 舌质红, 苔薄白, 脉细数无力。其治疗应首选的方剂是

- A. 独参汤合桃仁红花煎
- B. 炙甘草汤
- C. 参附汤合五苓散
- D. 真武汤合葶苈大枣泻肺汤
- E. 参附汤合生脉散

17. 患者女性, 36 岁。主诉头晕、乏力, 3 年来月经量多, 浅表淋巴结及肝脾未触及, 血红蛋白 58g/L, 白细胞 $8 \times 10^9/L$, 血小板 $185 \times 10^9/L$, 血涂片可见红细胞中心淡染区扩大, 网织红细胞计数 0.005。经补铁治疗后, 评价疗效最早的指标是

- A. 白细胞数量
- B. 血红蛋白含量
- C. 网织红细胞计数
- D. 叶酸、维生素 B₁₂ 含量
- E. 铁蛋白浓度

18. 患者女性, 35 岁。黄疸、贫血伴关节酸痛 3 个月, 体检: 巩膜黄染, 脾肋下 2cm。辅助检查: 血红蛋白 58g/L, 白细胞 $5 \times 10^9/L$, 血小板 $110 \times 10^9/L$, 网织红细胞计数 0.25, 外周血涂片成熟红细胞形态正常, 尿隐血试验阴性, 无家族史。最可能的诊断是

- A. 急性白血病
- B. 急性黄疸性肝炎
- C. 肝癌骨髓转移
- D. 溶血性贫血
- E. 风湿性关节炎

19. 患者, 男, 40 岁。反复上腹部节律性疼痛 4 年, 加重半月。现症见上腹隐隐作痛, 常感寒而发, 喜温喜按, 空腹疼痛加重, 得食可缓, 泛吐清水, 神疲乏力, 大便溏薄, 舌淡, 苔白, 脉细弱。查体: 上腹部压痛, 无反跳痛及肌紧张。胃镜

示十二指肠溃疡，胃液分析示胃酸分泌增高。治疗应首选

- A. 失笑散
- B. 化肝煎
- C. 金铃子散
- D. 八珍汤
- E. 黄芪建中汤

20. 患者，女，35岁，慢性胃炎病史6年。现胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治法为

- A. 疏肝理气，和胃止痛
- B. 化瘀通络，和胃止痛
- C. 清利湿热，醒脾化浊
- D. 养阴益胃，和中止痛
- E. 健脾益气，温中和胃

21. 患者十二指肠溃疡病史8年，饮酒后突发上腹剧痛。查体：板状腹。拟诊为急性穿孔，确诊最重要的检查是

- A. 腹部X线透视
- B. 钡餐透视
- C. 血常规
- D. 粪便隐血试验
- E. 腹腔穿刺

22. 患者，男，70岁。其上腹部无规律性隐痛2个月，1小时前呕咖啡样物150ml，排出柏油样便300ml来诊。患者无肝病史。查体：血压90/60mmHg，心率110次/分，上腹部轻度压痛，肝脾肋下未触及。血红蛋白90g/L。其止血措施最好选择

- A. 维生素K静脉滴注
- B. 奥美拉唑静注
- C. 6-氨基己酸静脉滴注
- D. 三腔两囊管压迫
- E. 垂体后叶素静脉滴注

23. 患者，女，50岁。进行性厌食，上腹部胀痛，进食发噎，日益消瘦1年。查体：面色苍白，双下肢轻微水肿，舌红苔白，脉弦。肝功能正常，大便隐血试验持续阳性，尿常规未发现异常。其中医治法是

- A. 燥湿健脾，化痰和胃
- B. 清热和胃，养阴润燥
- C. 健脾养阴，益胃止痛
- D. 温中散寒，健脾和胃
- E. 疏肝和胃，降逆止痛

24. 患者，男，45岁。上腹隐痛，便潜血阳性，钡餐见胃窦小弯侧黏膜纹理紊乱，胃壁僵硬。首先考虑的是

- A. 慢性胃炎
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 胃淋巴瘤
- E. 萎缩性胃炎

25. 患者男性，50岁。慢性肝炎10年。现B超提示腹腔积液，血钾3.4mmol/L。应首选的利尿剂是

- A. 甘露醇
- B. 利尿酸钠
- C. 氢氯噻嗪
- D. 螺内酯
- E. 呋塞米

26. 患者男性，42岁。饮酒后持续性上腹疼痛10小时，向腰背部放射，伴恶心，呕吐，发热，无血尿。应首选的检查是

- A. 血淀粉酶
- B. 血常规
- C. 血清脂肪酶
- D. 尿淀粉酶
- E. AFP

27. 患者，女，45岁。患糖尿病8年，面色晦暗，消瘦乏力，胸中闷痛，肢体麻木、刺痛，夜间加重，唇紫，舌暗有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。治疗应首选

- A. 玉泉丸
- B. 消渴方
- C. 桃核承气汤
- D. 黄连温胆汤
- E. 血府逐瘀汤

28. 患者，女性，55岁。糖尿病史10年。近2月来感双足趾端麻木，大腿皮肤针刺样疼痛伴尿失禁、无汗就诊。查体：消瘦，营养欠佳，双手骨间肌萎缩，肌力IV级。双肺未闻及干、湿吸音，病理反射阴性。空腹血糖14.1mmol/L，酮体阴性。下列哪项是最可能的诊断

- A. 糖尿病并发脑血管意外
- B. 糖尿病性神经病变
- C. 糖尿病性感觉神经病变
- D. 糖尿病性自主神经病变
- E. 糖尿病微血管病变

29. 患者，男，45岁。肥胖体形，无症状，健康查体时发现尿糖阳性。空腹血糖稍高，葡萄糖耐量减低。其诊断是

- A. 2型糖尿病
- B. 1型糖尿病
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 肾炎
- E. 肾病

30. 患者，女，36岁。颈前肿胀6个月，于医院就诊，诊断为“甲状腺功能亢进”。现烦躁易怒，胸闷，两胁胀满，善太息，心情抑郁时症状加重，腹胀便溏，舌苔白腻，脉弦滑。治疗应首选

- A. 二陈汤
- B. 天王补心丹
- C. 逍遥散合二陈汤

D. 丹栀逍遥散

E. 柴胡疏肝散

31. 患者头晕, 疲乏无力, 恶如呕吐。实验室检查: 血清钠 125mmol/L, 血清钾 4.5mmol/L, 尿比重 1.008。其诊断是

A. 高钾血症

B. 低钾血症

C. 高渗性失水

D. 低渗性失水

E. 等渗性失水

32. 患者男性, 42岁。结肠炎病史5年, 每日腹泻7~10次, 呈水样便, 夹有黏液, 近半个月乏力明显加重, 下肢尤甚。实验室检查: 血钠 140mmol/L, 血钾 2.3mmol/L。诊断为低钾血症, 给以补钾治疗, 应给以的补钾量应该是

A. 100mmol

B. 200mmol

C. 300mmol

D. 400mmol

E. 500mmol

33. 患者男性, 54岁。因慢性肾衰竭小便量少、下肢水肿服用利尿剂。今日患者出现头痛、乏力、心率增快, 呼吸加深加快。实验室检查: 血PH明显降低, 缓冲碱降低, 碱剩余负值增大, 血 PaCO₂ 高于正常。应考虑的诊断是

A. 代谢性酸中毒并发呼吸性碱中毒

B. 呼吸性碱中毒并发代谢性碱中毒

C. 代谢性酸中毒并发呼吸性酸中毒

D. 代谢性酸中毒合并代谢性碱中毒

E. 代谢性碱中毒合并呼吸性酸中毒

34. 患者, 男, 45岁。咳嗽、咳痰5年, 近3年每年持续咳嗽、咳痰3~4个月。肺部X线检查仅见肺纹理增粗。其诊断是

A. 肺结核

B. 支气管哮喘

C. 慢性支气管炎

D. 肺脓肿

E. 支气管扩张

35. 患者，男，68岁。肺心病多年，现症见喘息气粗，烦躁，胸满，咳嗽，痰黄，黏稠难咳，微恶寒，有汗不多，溲黄便干，口渴，舌边尖红苔黄，脉滑数。治疗应首选的方剂是

A. 苏子降气汤

B. 生脉散

C. 补肺汤

D. 越婢加半夏汤

E. 小青龙汤

36. 患者，男，67岁。既往慢性肺心病病史6年。现呼吸道感染原有症状、体征加重，因睡眠障碍服用镇静剂3天后，出现精神恍惚，烦躁不安。可能出现的并发症是

A. 消化道出血

B. 心律失常

C. 肺性脑病

D. 休克早期

E. 酸碱平衡失调

37. 男性，26岁。酗酒后出现上腹部持续疼痛8小时，阵发加剧，伴恶心呕吐。最可能的诊断为

A. 急性胃炎

B. 急性肠梗阻

C. 心肌梗死

D. 急性胰腺炎

E. 急性胆囊炎

38. 患者，女，48岁，公司聚餐后回到家中突发聚类腹痛，伴恶心、呕吐，于医院就诊。查体：上腹部压痛，伴腹胀和肠鸣音减少，无肌紧张和反跳痛。急查血淀粉酶700U。下列治疗措施错误的是

- A. 胃肠减压
- B. 禁食
- C. 手术治疗
- D. 抗生素
- E. 抑酸治疗

39. 患者女性，确诊肺炎 4 天，高热骤降，大汗肢冷，颜面苍白，呼吸急迫，四肢厥冷，唇甲青紫，神志恍惚，舌淡青紫，脉微欲绝。治疗应首选的方剂是

- A. 麻杏石甘汤
- B. 银翘散
- C. 清营汤
- D. 生脉散合四逆汤
- E. 麦门冬汤

40. 患者男性，发病初起，咳嗽，咳痰不爽，痰黏稠色黄，发热重，恶寒轻，无汗，口微渴，头痛，鼻塞，舌边尖红，苔薄微黄，脉浮数。治疗应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 生脉散
- C. 苇茎汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 百合固金汤

41. 患者女性，46 岁。患肺结核 1 年半，咳逆喘息少气，喘促气短，动则尤甚，咳痰色白，潮热，自汗，盗汗，面浮肢肿，心慌，唇紫肢冷，形寒，经少，舌质光淡隐紫少津，脉微细而数。治疗应首选的方剂是

- A. 月华丸
- B. 百合固金汤
- C. 六味地黄丸
- D. 补天大造丸
- E. 保真汤

42. 患者女性，63 岁。诊断肺癌 4 个月，咳嗽，痰多，气憋胸闷，胸胁疼痛，纳差便溏，身热尿黄，舌质暗，苔厚腻，脉滑数。其中医证型是

- A. 痰瘀互结证
- B. 气阴两虚证
- C. 阴虚毒热证
- D. 痰湿毒蕴证
- E. 气滞血瘀证

43. 患者，男，36岁。体检时发现蛋白尿阳性，24小时定量为1.3g，下肢轻度浮肿，血压150/96mmHg，血肌酐 $124\mu\text{mol/L}$ 。其诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾功能衰竭
- E. 慢性肾盂肾炎

44. 患者，男，45岁。慢性肾炎12年，现面浮肢肿，身热汗出，口干不欲饮，胸脘痞闷，腹部胀满，纳差，尿黄短少，便溏，舌红，苔黄腻，脉滑数。其中医治法是

- A. 益气养阴
- B. 活血化瘀
- C. 健脾化湿
- D. 清热利湿
- E. 温补脾肾

45. 患者小便不畅，少腹胀满疼痛，小便灼热刺痛，烦躁易怒，口苦口黏，胸胁苦满，舌质暗红，脉弦。其治法是

- A. 疏肝理气，清热通淋
- B. 清热利湿通淋
- C. 健脾补肾
- D. 泻火解毒
- E. 滋阴益肾，清热通淋

46. 患者，女，35岁。关节肿胀疼痛，痛有定处，晨僵，屈伸不利，遇寒痛剧，局部畏寒怕冷，舌苔薄白，脉沉紧。诊断为类风湿关节炎，治疗应首选

- A. 大秦艽汤
- B. 蠲痹汤
- C. 宣痹汤
- D. 双合汤
- E. 白虎加桂枝汤
47. 患者，女，30岁。其患类风湿关节炎1年，应用甲氨蝶呤治疗。下列说法正确的是
- A. 每周剂量为7.5~25mg，以口服为主，1日之内服完
- B. 本药不可静注或肌内注射
- C. 疗程一般为3个月
- D. 极少引起肝损害
- E. 本药所引起的胃肠道反应、骨髓抑制等
48. 患者女性，60岁。诊断为TIA。现症见：头晕目眩，头重如蒙，肢体麻木，胸脘痞闷，舌质暗，苔白腻，脉滑数。其中医治法是
- A. 平肝息风，育阴潜阳
- B. 补气养血，活血通络
- C. 化痰开窍，活血通络
- D. 豁痰化瘀，通经活络
- E. 涤痰开窍，活血化瘀
49. 患者平素头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口眼歪斜，舌强语謇，半身不遂，舌质红苔黄，脉弦。诊断为脑血栓形成，其证型是
- A. 风痰入络证
- B. 肝阳暴亢，风阳上扰证
- C. 痰热腑实证
- D. 气虚血瘀证
- E. 阴虚风动证
50. 患者，男，48岁。已诊断腔隙性脑梗死。现症：手足麻木，肌肤不仁，言语不利，口角流涎，舌质淡暗，苔薄白，脉浮弦。其中医治法是
- A. 化痰醒神，通络养血

- B. 益气养血，通络止痉
- C. 祛风通络，养血和营
- D. 祛风通络，化瘀养血
- E. 豁痰开窍，通络祛风

51. 患者男性，56岁。突发右手无力，言语不利，约半小时后昏迷。查体：浅昏迷，瞳孔等大，直径2mm，血压220/100mmHg，右侧肢体瘫痪，腱反射未引出，右侧Babinski征阳性。头颅CT：左基底核区可见高密度影。其最可能的诊断是

- A. 脑栓塞
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 脑出血
- D. 脑血栓形成
- E. TIA

52. 患者男性，59岁。高血压病史15年。现症见：生气后突然出现前额疼痛，呕吐，恶心，伴右侧肢体活动不利。查体：血压：180/100mmHg，体温：37.8℃，眼底出血。头颅CT：脑叶区见高密度影。则最可能的诊断是

- A. 额叶出血
- B. 顶叶出血
- C. 颞叶出血
- D. 枕叶出血
- E. 脑桥出血

53. 患者，女，78岁。诊断为帕金森病。现症见表情呆钝，肢体振辐大，动作迟缓，肢体拘挛，活动笨拙，头晕目眩。耳鸣健忘，急躁易怒，多梦，腰膝酸软。舌红苔少，脉弦细数。其中医辨证是

- A. 气血两虚证
- B. 肝肾阴虚证
- C. 风痰阻络证
- D. 血瘀动风证
- E. 阴阳两虚证

54. 患者，男，28岁。癫痫大发作。眩晕，两目干涩，心烦失眠，腰膝酸软，舌

红少苔，脉细数。治疗应首选

- A. 定痫丸
- B. 龙胆泻肝汤合涤痰汤
- C. 六君子汤合归脾汤
- D. 左归丸合天王补心丹
- E. 通窍活血汤

55. 患者，男，46岁，诊断为慢性肾衰竭，现头痛、乏力、心率加快、呼吸加深、胃纳不佳，血气分析检查血PH及HCO₃⁻、AB、SB下降，BE-5，根据以上表现可以推断患者属于

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 代谢性酸中毒
- C. 呼吸性碱中毒
- D. 代谢性碱中毒
- E. 混合型酸碱平衡紊乱

56. 患者女性，38岁，误服有机磷农药50ml，立即被其家人送往医院。该患者抢救成功的关键在于

- A. 早期应用解磷定
- B. 早期应用阿托品
- C. 解磷定与阿托品合用
- D. 彻底洗胃
- E. 静脉注射西地兰

57. 女性，62岁。冬季房屋内煤火取暖，次日晨被发现昏迷。查体：呼吸20次/分，心率97次/分，昏迷，口唇呈樱桃红色。最适宜的治疗是

- A. 静脉用抗生素
- B. 静脉用呼吸兴奋剂
- C. 静脉用甘露醇
- D. 高压氧治疗
- E. 机械通气

58. 患者女性，54岁，因急性中度一氧化碳中毒、意识障碍入院治疗，经吸氧、

支持及对症治疗后,患者意识恢复,好转出院,2周后患者突然出现失语、不能站立、偏瘫,大小便失禁。查体: T36.5℃, P85次/分, R16次/分, BP125/70mmHg, 双侧病理反射阳性。最可能的诊断是

- A. 药物中毒
- B. 急性脑出血
- C. 急性一氧化碳中毒迟发脑病
- D. 急性脑梗死
- E. 中枢神经系统感染

59. 患者, 男性, 40岁。5年前诊断为再生障碍性贫血, 症见: 形寒肢冷, 气短懒言, 面色苍白, 唇甲色淡, 大便稀溏, 舌体胖嫩, 舌质淡, 苔薄白, 脉细无力, 其中医治法是

- A. 补益气血, 补肾活血
- B. 补肾助阳, 益气养血
- C. 滋阴助阳, 益气补血
- D. 滋补肾阴, 活血补血
- E. 滋阴补肾, 益气养血

二、A3/A4型题

(60~63 共用题干)

患者女性, 40岁。诉发作性心悸1年, 近2个月来发作次数频繁, 胸闷烦躁, 失眠多梦, 口干口苦, 大便秘结, 舌质红, 舌苔黄腻, 脉弦滑, 今日突发心悸来院就诊, 血压90/60mmHg, 心电图: 心率为160次/min, QRS波规则, 逆行P波出现在QRS波之后。

60. 其最有可能的诊断为

- A. 心房扑动
- B. 快速房颤
- C. 室上性心动过速
- D. 室性心动过速
- E. 窦性心动过速

61. 其中医证型是

- A. 心神不宁
- B. 痰火扰心
- C. 心脉瘀阻
- D. 气阴两虚
- E. 心阳不振

62. 其中医治法是

- A. 清热化痰, 宁心安神
- B. 活血化瘀, 理气通络
- C. 温补心阳, 安神定悸
- D. 滋阴清火, 养心安神
- E. 补血养心, 益气安神

63. 若患者住院期间, 心悸反复发作, 发作时间延长, 血压明显降低, 药物治疗无效, 处理最为理想的是

- A. 安装抗过速起搏器
- B. 射频消融治疗
- C. 手术切割治疗
- D. 换瓣手术
- E. 球囊扩张治疗

(64~67 共用题干)

中年女性, 面部可见蝶形红斑, 反复发热伴关节痛 3 个月, 泡沫尿, 纳差, 四肢无力 1 个月, 消瘦 5kg, 四肢近端肌力 4 级, 血红蛋白 69g/L。

64. 其中医诊断是

- A. 蝶疮流注
- B. 痹证
- C. 虚劳
- D. 痿证
- E. 内伤发热

65. 患者近 2 个月来出现高度浮肿, 尿少, 血肌酐快速上升至 $445 \mu\text{mol/L}$ 。现症见: 面色不华, 神疲乏力, 畏寒肢冷, 舌胖色偏红, 苔薄白, 脉细弱。其中医证

型是

- A. 气营热盛
- B. 阴虚内热
- C. 热郁积饮
- D. 脾肾两虚
- E. 瘀热痹阻

66. 治疗应首选的方法是

- A. 清热解毒, 凉血化斑
- B. 滋肾填精, 健脾利水
- C. 养阴清热
- D. 清热凉血, 活血散瘀
- E. 疏肝清热, 凉血活血

67. 治疗应首选的方剂是

- A. 独活寄生汤
- B. 济生肾气丸
- C. 羌活胜湿汤
- D. 蠲痹汤
- E. 半夏白术天麻汤

(68~72 共用题干)

患者, 女, 49 岁。上腹胀满 5 年, 2 个月来胃脘隐痛, 喜温喜按, 食欲不振, 全身无力, 便溏, 舌质淡, 苔薄白, 脉沉细。X 线钡餐未见异常。胃镜活检: 炎性细胞浸润, 未见腺体萎缩。

68. 应诊断为

- A. 胃黏膜脱垂
- B. 早期胃癌
- C. 慢性萎缩性胃炎
- D. 慢性浅表性胃炎
- E. 胃神经症

69. 若患者腹胀、恶心呕吐明显, 应选用

- A. 雷尼替丁
- B. 维生素 B₁₂
- C. 多潘立酮
- D. 硫糖铝
- E. 阿莫西林

70. 中医治法为

- A. 健脾益气，温中和胃
- B. 清利湿热，醒脾化浊
- C. 疏肝理气，和胃止痛
- D. 养阴益胃，和中止痛
- E. 化瘀通络，和胃止痛

71. 中医治疗应首选的方剂是

- A. 四君子汤
- B. 益胃汤
- C. 柴胡疏肝散
- D. 黄芪建中汤
- E. 失笑散合丹参饮

72. 若患者泛吐清水较重，应加

- A. 附子、生姜
- B. 干姜、吴茱萸
- C. 干姜、肉桂
- D. 吴茱萸、陈皮
- E. 小茴香、丁香

(73~75 共用题干)

患者，男，28岁。消化道溃疡病史2年。今晨突然发作上腹部剧痛，腹痛持续，但无放射痛，伴有恶心、呕吐。查体：全腹压痛，反跳痛，以上腹部及右上腹为著，叩诊肝浊音界不清，肠鸣音减弱。

73. 为明确诊断，应先进行的检查是

- A. 白细胞计数和分类

B. 血清淀粉酶或尿淀粉酶测定

C. 腹部 X 线检查

D. 诊断性腹腔穿刺

E. 腹部 B 型超声波检查

74. 已证实膈下游离气体存在, 其最可能的原因是

A. 胆囊穿孔

B. 胃、十二指肠穿孔

C. 肝破裂

D. 膀胱破裂

E. 乙状结肠穿孔

75. 若疼痛进一步加重, 肠鸣音消失, 腹部移动性浊音阳性, 血白细胞数 $21 \times 10^9/L$, 此时应采取的措施是

A. 镇静镇痛

B. 胃肠减压, 应用抗生素

C. 补充水、电解质和营养

D. 穿刺引流

E. 急诊手术

(76~79 共用题干)

患者, 男, 40 岁。腹痛半年余, 诊为消化性溃疡。现症见胃脘灼热疼痛, 胸胁胀满, 泛酸, 口苦口干, 烦躁易怒, 大便秘结, 舌红, 苔黄, 脉弦数。

76. 其中医辨证是

A. 肝胃郁热证

B. 胃阴不足证

C. 胃络瘀阻证

D. 脾胃虚寒证

E. 肝胃不和证

77. 其中医治法是

A. 疏肝理气, 健脾和胃

B. 温中散寒, 健脾和胃

- C. 活血化瘀，通络和胃
D. 清胃泄热，疏肝理气
E. 健脾养阴，益胃止痛
78. 治疗应首选的方剂是
- A. 柴胡疏肝散合五磨饮子
B. 黄芪建中汤
C. 化肝煎合左金丸
D. 一贯煎合芍药甘草汤
E. 活络效灵丹合丹参饮
79. 若患者两胁胀痛甚，应加
- A. 郁金、川楝子
B. 川芎、五灵脂
C. 陈皮、青皮
D. 玫瑰花、乳香
E. 川芎、延胡索
- (80~82 共用题干)

患者有机磷杀虫剂中毒第三天，现已清醒，维持阿托品化状态，出现抬头困难、抬臂困难、呼吸困难，无流涎，双瞳孔 5mm 大小，肺部无干、湿啰音，监护示血氧饱和度下降。

80. 首选的抢救治疗手段是
- A. 加大阿托品用量
B. 气管插管，保持气道通畅，准备机械通气
C. 应用呼吸兴奋剂
D. 给予糖皮质激素治疗
E. 减少阿托品用量
81. 该患者经抢救后脱险，1 个月后发现四肢麻木，末梢感觉异常，有疼痛感。这时最有可能的诊断是
- A. 中间型综合征
B. 迟发性神经病

- C. 中毒反跳
- D. 阿托品中毒
- E. 中毒性脑病

82. 若患者为有机磷农药慢性中毒, 治疗错误的是

- A. 对症治疗
- B. 脱离接触 OPI
- C. 长期给予阿托品治疗
- D. 症状消失需 2~4 周
- E. 小剂量阿托品治疗

(83~87 共用题干)

患者, 男, 41 岁。3 天前受寒后出现恶寒, 发热, 咳嗽, 呼吸急促, 胸闷如室, 喉中有哮鸣声, 咯吐不爽, 痰稀薄色白, 面色晦滞, 口淡不渴, 面白肢冷, 舌苔白滑, 脉浮紧。有哮喘病史 20 年。

83. 应诊断为

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 急性支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 急性上呼吸道感染
- E. 支气管扩张症

84. 其辨证为

- A. 风寒犯肺证
- B. 阳虚水泛证
- C. 脾虚证
- D. 寒哮证
- E. 痰浊阻肺证

85. 本病的治法为

- A. 燥湿化痰, 降气止咳
- B. 温肺散寒, 化痰平喘
- C. 温肾健脾, 化饮利水

- D. 健脾化痰
- E. 疏风散寒, 宣肺止咳

86. 治疗应首选

- A. 射干麻黄汤
- B. 三拗汤合止嗽散
- C. 真武汤合五苓散
- D. 六君子汤
- E. 二陈汤合三子养亲汤

87. 若表寒明显, 寒热身疼, 可加

- A. 桂枝、生姜
- B. 麻黄、葶苈子
- C. 黄芪、紫苏子
- D. 干姜、桂枝
- E. 生姜、荆芥

(88~92 共用题干)

患者, 女, 35 岁。因寒战、发热、腰痛伴尿频、尿急、尿痛 1 天入院。现症见小便频数, 灼热刺痛, 色黄赤, 小腹拘急胀痛, 口苦, 大便秘结。查体: T39.5℃, 左侧肾区有叩击痛, 肋脊角压痛, 尿沉渣白细胞(+++), 可见白细胞管型。舌质红, 苔薄黄腻, 脉滑数。

88. 该患者最可能的诊断是

- A. 肾结核
- B. 急性膀胱炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 急性肾盂肾炎

89. 该患者为了进一步检查, 以便尽快选择有效药物治疗, 最简便、阳性率最高的试验是

- A. 尿细菌定量培养
- B. 尿培养

C. 内生肌酐清除率

D. X 线检查

E. 尿沉渣涂片镜检

90. 其中医证型为

A. 热毒炽盛

B. 肾阴不足, 湿热留恋证

C. 膀胱湿热

D. 肝胆郁热

E. 脾肾亏虚, 湿热屡犯

91. 其中医治法为

A. 泻火解毒

B. 清热利湿通淋

C. 疏肝理气, 清热通淋

D. 健脾补肾

E. 滋阴益肾, 清热通淋

92. 其中医治疗方剂为

A. 黄连解毒汤

B. 知柏地黄丸

C. 丹栀逍遥散

D. 八正散

E. 无比山药丸

(93~97 共用题干)

患者, 男, 43 岁。无明显诱因出现眼睑及下肢浮肿, 气喘, 乏力。血压 142/94mmHg。

现症见浮肿, 按之凹陷不易恢复, 腹胀纳少, 面色萎黄, 神疲乏力, 尿少色清,

大便溏, 舌质淡苔白腻, 脉沉弱。尿蛋白阳性, 24 小时尿蛋白定量 4.8g; 血浆

总蛋白 48g/L, 白蛋白 23g/L, 血清胆固醇 6.7mmol/L, 甘油三酯 5.9mmol/L。

93. 最可能的诊断是

A. 急性肾炎

B. 肾病综合征

- C. 慢性肾炎
- D. 慢性肾衰竭
- E. 尿路感染
94. 其中医证型是
- A. 肾阳衰微证
- B. 湿热内蕴证
- C. 风水相搏证
- D. 脾虚湿困证
- E. 湿毒浸淫证
95. 其中医治法是
- A. 温运脾阳, 利水消肿
- B. 温肾助阳, 化气行水
- C. 清热利湿, 利水消肿
- D. 疏风解表, 宣肺利水
- E. 宣肺解毒, 利湿消肿
96. 其中医治疗选择方剂为
- A. 越婢加术汤
- B. 麻黄连翘赤小豆汤
- C. 疏凿饮子
- D. 实脾饮
- E. 真武汤
97. 若患者服用糖皮质激素后尿蛋白无明显减少, 应选用的药物种类是
- A. ACEI
- B. ARB
- C. CCB
- D. 抗生素
- E. 细胞毒类

(98~100 共用题干)

患者女性, 23 岁。月经量增多 8 个月, 2 周来牙龈出血, 下肢皮肤散在出血点及

瘀斑，血红蛋白 78g/L，白细胞 $5.0 \times 10^9/L$ ，血小板计数 $48 \times 10^9/L$ 。临床诊断为特发性血小板减少性紫癜。

98. 该患者用糖皮质激素治疗，下列说法中正确的是

- A. 为特发性血小板减少性紫癜的首选治疗
- B. 为脾切除术做准备
- C. 通常与达那唑配合使用
- D. 主要用于近期分娩者
- E. 血小板升至正常后即可停药

99. 该患者激素治疗半年后，效果不佳，首先应考虑

- A. 加大糖皮质激素剂量继续使用
- B. 改用达那唑
- C. 抗纤溶治疗
- D. 血浆置换
- E. 脾切除

100. 若该患者治疗中出现严重出血，首选治疗是

- A. 西咪替丁
- B. 云南白药
- C. 大剂量丙种球蛋白
- D. 皮质激素
- E. 长春新碱

答案解析

一、A2 型题

1. 【正确答案】 E

【答案解析】 考虑患者为肺炎链球菌肺炎，应立即进行抗生素治疗，首选青霉素 G。退热剂会影响热型，不适宜使用，而采取物理降温的方法。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】 甲亢-气阴两虚证证候：颈前肿大，眼突，心悸失眠，手颤，消瘦，神疲乏力，气短汗多，口干咽燥，手足心热，纳差，大便溏薄，舌质红或淡红，舌苔少，脉细或细数无力。

3. 【正确答案】 D

【答案解析】 患者有肺心病合并慢性呼吸衰竭 20 余年的病史，现出现神志恍惚，躁动不安等肺性脑病等症状，且根据实验室检查了诊断出患者目前为 II 型呼吸衰竭，故目前最重要的治疗是改善通气，增加肺泡通气量。

4. 【正确答案】 A

【答案解析】 肺炎链球菌肺炎症状：寒战、发热，胸痛，咳嗽、咳痰，呼吸困难。体征：早期肺部无明显异常体征，仅有呼吸幅度减小、叩诊轻度浊音、听诊呼吸音减低和胸膜摩擦音。可见肺实变时叩诊呈浊音、听诊语颤增强和支气管呼吸音等典型体征。

5. 【正确答案】 C

【答案解析】 房颤心电图特点：①P 波消失，代之以大小不等、态不同、间隔不等的 f 波，频率为 350~600 次/min；②QRS 波、T 波形态为室上性，但 QRS 可增宽畸形（室内差异传导）；③心室率快而不规则，多在 100 次/min 以上。

6. 【正确答案】 E

【答案解析】 患者既往有房颤、高血压病史，未系统治疗，突然倒地伴失语，考虑为房颤的并发症血栓栓塞所致。

7. 【正确答案】A

【答案解析】快速性心律失常之心虚胆怯证

证候：心悸不宁，善惊易恐，坐卧不安，恶闻声响，失眠多梦，舌苔薄白，脉虚数或结代。

治法：镇惊定志，养心安神。

方药：安神定志丸加减。

8. 【正确答案】B

【答案解析】快速性心律失常之心血不足证

证候：心悸气短，活动尤甚，眩晕乏力，失眠健忘，面色无华，纳呆食少，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：补血养心，益气安神。

方药：归脾汤加减。

9. 【正确答案】D

【答案解析】慢性喘息型支气管炎的发病年龄较晚，咳嗽、咳痰症状较为突出，往往因咳嗽反复发作，迁延不愈而伴有喘息，且肺底部可听到湿性啰音。

10. 【正确答案】C

【答案解析】肺结核之气阴耗伤证

证候：咳嗽无力，气短声低，咳痰清稀色白量较多，偶或带血，或咯血，血色淡红，午后潮热，伴有畏风怕冷，自汗与盗汗并见，纳少神疲，便溏，面色（白光）白，舌质光淡，边有齿印，苔薄，脉细弱而数。

11. 【正确答案】C

【答案解析】心绞痛之气虚血瘀证

证候：胸痛隐隐，时轻时重，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌质淡暗，胖有齿痕，苔薄白，脉缓弱无力或结代。

治法：益气活血，通脉止痛。

方药：补阳还五汤加减。

12. 【正确答案】E

【答案解析】心绞痛之痰浊内阻证

证候：胸闷痛如窒，气短痰多，肢体沉重，形体肥胖，纳呆恶心，舌苔浊腻，脉

滑。

治法：通阳泄浊，豁痰开痹。

方药：瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤。

13. 【正确答案】D

【答案解析】室颤是心肌梗死早期，特别是入院前主要的死因。

14. 【正确答案】A

【答案解析】急性肾小球肾炎是以急性起病，不同程度的血尿、蛋白尿、水肿、高血压、少尿及一过性氮质血症为临床表现的综合征。

急性肾小球肾炎之风热犯肺，水邪内停证

证候：发热而不恶寒，或热重寒轻，咽喉疼痛，口干口渴，头面浮肿，尿少色赤，舌质红，苔薄黄，脉象浮数或细数。

治法：散风清热，宣肺行水。

方药：越婢加术汤加减。

15. 【正确答案】C

【答案解析】慢性肾衰竭之肝肾阴虚证

证候：头晕头痛，耳鸣眼花，两目干涩或视物模糊，口干咽燥，渴而喜饮或饮水不多，腰膝酸软，大便易干，尿少色黄，舌淡红少津，苔薄白或少苔，脉弦或细弦，常伴血压升高。

治法：滋肾平肝。

方药：杞菊地黄汤加减。

16. 【正确答案】B

【答案解析】心脏瓣膜病之气阴两虚证

证候：心悸气短，倦怠乏力，头晕目眩，面色无华，动则汗出，自汗或盗汗，夜寐不宁，口干，舌质红或淡红，苔薄白，脉细数无力或促、结代。

治法：益气养阴，宁心复脉。

方药：炙甘草汤加味。

17. 【正确答案】C

【答案解析】根据患者症状及辅助检查诊断为缺铁性贫血。口服铁剂后，先是外周血网织红细胞增多，高峰在开始服药后5~10天，后血红蛋白浓度上升，一般

2个月左右恢复正常。故选C答案。

18. 【正确答案】D

【答案解析】患者有慢性溶血的三大特征：贫血、黄疸、肝脾肿大，结合辅助检查，诊断为溶血性贫血。

19. 【正确答案】E

【答案解析】消化性溃疡——脾胃虚寒证证候：胃痛隐隐，喜温喜按，畏寒肢冷，泛吐清水，腹胀便溏，舌淡胖边有齿痕，苔白，脉迟缓。治法：温中散寒，健脾和胃。方药：黄芪建中汤加减。

20. 【正确答案】D

【答案解析】慢性胃炎——胃阴不足证证候：胃脘隐隐作痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治法：养阴益胃，和中止痛。方药：一贯煎合芍药甘草汤加减。

21. 【正确答案】A

【答案解析】急性穿孔最重要的检查是腹部X线透视。

22. 【正确答案】B

【答案解析】患者有上腹部隐痛史，饮酒后出现消化道出血，无肝病史，考虑是消化性溃疡引起的出血，对于溃疡所致出血，首先需要应用抑制胃酸分泌的药物，因为血凝块在 $\text{pH} < 5.0$ 的胃液中会迅速被消化，首选质子泵抑制剂，起到止血的作用。

23. 【正确答案】E

【答案解析】胃癌——肝胃不和证证候：胃脘痞满，时时作痛，窜及两胁，暖气频繁或进食发噎，舌质红，苔薄白或薄黄，脉弦。治法：疏肝和胃，降逆止痛。方药：柴胡疏肝散合旋覆代赭汤加减。

24. 【正确答案】C

【答案解析】胃癌X线钡餐检查：胃窦小弯侧黏膜纹理紊乱，胃壁僵硬，加上便潜血阳性，首先考虑胃癌可能性大。

25. 【正确答案】D

【答案解析】患者长期的肝炎病史，并发腹腔积液，考虑肝硬化。目前血钾偏低，针对腹水的治疗应首选保钾利尿剂。

26. 【正确答案】A

【答案解析】根据患者临床表现，考虑急性胰腺炎可能性大，首选血淀粉酶检测。血淀粉酶起病后 6 至 12 小时开始升高；尿淀粉酶升高较晚在发病后 12 至 14 小时开始升高；血清脂肪酶起病 24 至 72 小时开始上升。

27. 【正确答案】E

【答案解析】糖尿病——脉络瘀阻证

证候：面色晦暗，消瘦乏力，胸中闷痛，肢体麻木或刺痛，夜间加重，唇紫，舌暗或有瘀斑，或舌下青筋紫暗怒张，苔薄白或少苔，脉弦或沉涩。

治法：活血通络。

方药：血府逐瘀汤加减。

28. 【正确答案】B

【答案解析】糖尿病并发神经系统并发症：周围神经病变：最为常见，通常为对称性，下肢较上肢严重，病情缓慢。临床表现为肢端感觉异常，分布如袜子或手套状，伴麻木、针刺、热灼、疼痛，后期可出现运动神经受累，肌力减弱甚至肌肉萎缩和瘫痪。自主神经病变：也较常见，并可较早出现，影响胃肠、心血管、泌尿生殖系统功能。临床表现为瞳孔改变（缩小且不规则、光反射消失、调节反射存在），排汗异常（无汗、少汗或多汗），胃排空延迟（胃轻瘫）、腹泻（饭后或午夜）、便秘等，直立性低血压、持续心动过速、心搏间距延长等，以及残尿量增加、尿失禁、尿潴留、阳痿等。

29. 【正确答案】A

【答案解析】2 型糖尿病发病：可发生在任何年龄，但多见于成人，常在 40 岁以后起病；多数发病缓慢，症状相对较轻，半数以上无任何症状；不少患者因慢性并发症、伴发病或仅于健康检查时发现。患者体检情况符合 2 型糖尿病诊断。

30. 【正确答案】C

【答案解析】甲亢——气滞痰凝证证候：颈前肿胀，烦躁易怒，胸闷，两胁胀满，善太息，失眠，月经不调，腹胀便溏，舌质淡红，舌苔白腻，脉弦或弦滑。治法：疏肝理气，化痰散结。方药：逍遥散合二陈汤加减。

31. 【正确答案】D

【答案解析】低渗性失水：血钠 < 130 。尿比重低于正常，尿钠明显减少。MCV 增

大, 血细胞比容增高。

32. 【正确答案】 E

【答案解析】 重度缺钾: 血清钾在 2.0~2.5mmol/L 水平, 需补充钾盐 500mmol (相当于氯化钾 40g)。

33. 【正确答案】 C

【答案解析】 在代谢性酸中毒时 BB 减少, 在代谢性碱中毒时增加。BE 为负值时, 表示 BB 不足, 提示存在代谢性酸中毒。血 PaCO₂ 增高表示通气不足, 为呼吸性酸中毒; 降低表示过度换气, 为呼吸性碱中毒。

34. 【正确答案】 C

【答案解析】 慢性支气管炎: 缓慢起病, 病程长, 反复急性发作而病情加重。主要症状为咳嗽、咳痰。X 线表现早期可无异常。反复发作引起支气管壁增厚, 细支气管或肺泡间质炎症细胞浸润或纤维化, 表现为肺纹理增粗、紊乱, 呈网状或条索状、斑点状阴影, 以双下肺野明显。

35. 【正确答案】 D

【答案解析】 慢性肺源性心脏病之痰热郁肺证

证候: 喘息气粗, 烦躁, 胸满, 咳嗽, 痰黄或白, 黏稠难咯, 或身热, 微恶寒, 有汗不多, 溲黄便干, 口渴, 舌红, 舌苔黄或黄腻, 边尖红, 脉数或滑数。

治法: 清肺化痰, 降逆平喘。

方药: 越婢加半夏汤加减。

36. 【正确答案】 C

【答案解析】 根据患者慢性肺心病病史 6 年, 吸道感染原有症状、体征加重, 及现出现精神恍惚, 烦躁不安等神志症状, 可诊断患者出现的并发症为肺性脑病。

37. 【正确答案】 D

【答案解析】 酗酒后出现上腹部持续疼痛, 阵发加剧, 伴恶心呕吐, 多是急性胰腺炎。

38. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性胰腺炎手术治疗适应证: 为胰腺坏死合并感染; 胰腺脓肿; 胰腺假性囊肿; 胆道梗阻或感染; 疑有腹腔脏器穿孔或肠坏死者行剖腹探查术。考虑患者为轻型胰腺炎, 不符合手术指征。

39. 【正确答案】D

【答案解析】肺炎之阴竭阳脱证

证候：高热骤降，大汗肢冷，颜面苍白，呼吸急迫，四肢厥冷，唇甲青紫，神志恍惚，舌淡青紫，脉微欲绝。

治法：益气养阴，回阳固脱。

方药：生脉散合四逆汤加减。

40. 【正确答案】A

【答案解析】肺炎之邪犯肺卫证

证候：发病初起，咳嗽咳痰不爽，痰色白或黏稠色黄，发热重，恶寒轻，无汗或少汗，口微渴，头痛，鼻塞，舌边尖红，苔薄白或微黄，脉浮数。

治法：疏风清热，宣肺止咳。

方药：三拗汤或桑菊饮加减。

41. 【正确答案】D

【答案解析】肺结核之阴阳两虚证

证候：咳逆喘息少气，喘促气短，动则尤甚，咳痰色白，或夹血丝，血色暗淡，潮热，自汗，盗汗，声嘶或失音，面浮肢肿，心慌，唇紫肢冷，形寒或见五更泄泻，口舌生糜，大肉尽脱，男子滑精，阳痿，女子经少，经闭，舌质光淡隐紫少津，脉微细而数，或虚大无力。

治法：滋阴补阳。

方药：补天大造丸加减。

42. 【正确答案】D

【答案解析】肺癌之痰湿毒蕴证

证候：咳嗽，痰多，气憋胸闷，或胸胁疼痛，纳差便溏，身热尿黄，舌质暗或有瘀斑，苔厚腻，脉滑数。

43. 【正确答案】A

【答案解析】慢性肾小球肾炎是由多种原因引起的，不同病理类型组成的原发性肾小球的一组疾病。该组疾病起病方式各异、病情迁延、病变缓慢进展、病程绵长，并以蛋白尿、血尿、水肿及高血压为其基本临床表现。

44. 【正确答案】D

【答案解析】慢性肾小球肾炎之湿热证

证候：面浮肢肿，身热汗出，口干不欲饮，胸脘痞闷，腹部胀满，纳食不香，尿黄短少，便溏不爽，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿。

45. 【正确答案】A

【答案解析】尿路感染之肝胆郁热证

证候：小便不畅，少腹胀满疼痛，小便灼热刺痛，有时可见血尿，烦躁易怒，口苦口黏，或寒热往来，胸胁苦满，舌质暗红，可见瘀点，脉弦或弦细。

治法：疏肝理气，清热通淋。

46. 【正确答案】B

【答案解析】类风湿关节炎之风寒湿阻证

证候：肢体关节疼痛，屈伸不利，或呈游走性疼痛，或疼痛剧烈，痛处不移，或肢体关节重着，肿胀疼痛，肌肤麻木，阴雨天加重，舌苔薄白，脉弦紧或濡缓。

治法：祛风散寒，除湿通络。

方药：蠲痹汤加减。

47. 【正确答案】A

【答案解析】甲氨蝶呤：每周剂量为 7.5~25mg，以口服为主(1 日之内服完)，亦可静注或肌注。4~6 周起效，疗程至少半年。不良反应有肝损害、胃肠道反应、骨髓受抑制和口角糜烂等，停药后多能恢复。

48. 【正确答案】D

【答案解析】短暂性脑缺血发作之痰瘀互结，阻滞脉络证

证候：头晕目眩，头重如蒙，肢体麻木，胸脘痞闷，或猝然半身不遂，移时恢复如常，舌质暗，苔白腻或黄厚腻，脉滑数或涩。

治法：豁痰化瘀，通经活络。

方药：黄连温胆汤合桃红四物汤加减。

49. 【正确答案】B

【答案解析】脑血栓形成之肝阳暴亢，风火上扰证

证候：平素头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口眼歪斜，舌强语謇，或手足重滞，甚则半身不遂，或伴麻木等症，舌质红苔黄，脉弦。

治法: 平肝潜阳, 活血通络。

方药: 天麻钩藤饮加减。

50. 【正确答案】 C

【答案解析】 腔隙性脑梗死之脉络空虚, 风邪入中证

证候: 手足麻木, 肌肤不仁或突然口眼喎斜, 语言不利, 口角流涎, 甚则半身不遂; 或兼见恶寒发热, 肌体拘急, 关节酸痛; 舌苔薄白, 脉浮弦或弦细。

治法: 祛风通络, 养血和营。

方药: 大秦苳汤加减。

51. 【正确答案】 C

【答案解析】 典型脑出血的诊断要点: ①50 岁以上, 多有高血压病史, 在体力活动或情绪激动时突然起病, 发病迅速。②早期有意识障碍及头痛、呕吐等颅内压增高症状, 并有脑膜刺激征及偏瘫、失语等局灶症状。③头颅 CT 示高密度阴影。患者症状体征, 与脑出血诊断要点相符合。

52. 【正确答案】 A

【答案解析】 结合患者高血压病史, 头颅 CT: 脑叶区见高密度影。诊断为脑出血。额叶出血的表现: 前额痛、呕吐、痫性发作较多见; 对侧偏瘫、共同偏视、精神障碍; 优势半球出血时可出现运动性失语。故诊断为额叶出血。

53. 【正确答案】 B

【答案解析】 帕金森之肝肾阴虚证

证候: 表情呆板, 肢体震颤幅度很大, 动作迟缓, 肢体拘挛, 活动笨拙, 头晕目眩, 耳鸣健忘, 急躁易怒, 多梦, 腰膝酸软, 舌体瘦小, 舌质红, 苔少, 脉弦细数。

治法: 补肾养阴, 柔肝息风。

方药: 大定风珠加减。

54. 【正确答案】 D

【答案解析】 癫痫之心肾亏虚证

证候: 痫病频发, 神思恍惚, 心悸, 健忘失眠, 头晕目眩, 两目干涩, 面色晦暗, 耳轮焦枯不泽, 腰膝酸软, 大便干燥, 舌质淡红, 脉沉细而数。

治法: 补益心肾, 潜阳安神。

方药: 左归丸合天王补心丹加减。

55. 【正确答案】 B

【答案解析】 血 PH 及 HCO_3^- 、AB、SB 下降, BE 负值增加是代谢性酸中毒的典型表现。而且代谢性酸中毒的轻症表现是头痛、乏力、心率增快、呼吸加深、胃纳不佳。

56. 【正确答案】 D

【答案解析】 口服有机磷农药中毒患者清除毒物抢救的关键是及早彻底洗胃。

57. 【正确答案】 D

【答案解析】 诊断一氧化碳中毒, 治疗首选高压氧治疗, 正确答案 D。

58. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性一氧化碳中毒患者在意识障碍恢复后, 经过 2~60 天的“假愈期”, 可出现神经精神症状, 为急性一氧化碳中毒迟发脑病。

59. 【正确答案】 B

【答案解析】 再生障碍性贫血之肾阳亏虚证

证候: 形寒肢冷, 气短懒言, 面色苍白, 唇甲色淡, 大便稀溏, 面浮肢肿, 出血不明显, 舌体胖嫩, 舌质淡, 苔薄白, 脉细无力。

治法: 补肾助阳, 益气养血。

方药: 右归丸合当归补血汤加减。

二、A3/A4 型题

(60~63 共用题干)

60. 【正确答案】 C

【答案解析】 室上性心动过速

①心率快而规则, 阵发性室上性心动过速心率多在 160~220 次/min; ②P 波形态与窦性不同, 出现在 QRS 波群之后则为房室交界性心动过速; 当心率过快时, P 波往往与前面的 T 波重叠, 无法辨认, 故统称为室上性心动过速; ③QRS 波群形态通常为室上性, 亦可增宽、畸形; ④ST-T 波无变化, 发作中也可以倒置。

61. 【正确答案】 B

【答案解析】 快速性心律失常之痰火扰心证

证候: 心悸时发时止, 胸闷烦躁, 失眠多梦, 口干口苦, 大便秘结, 小便黄赤,

舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑。

治法：清热化痰，宁心安神。

方药：黄连温胆汤加减。

62. 【正确答案】A

【答案解析】快速性心律失常之痰火扰心证

证候：心悸时发时止，胸闷烦躁，失眠多梦，口干口苦，大便秘结，小便黄赤，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑。

治法：清热化痰，宁心安神。

方药：黄连温胆汤加减。

63. 【正确答案】B

【答案解析】根据我国 RFCA 治疗快速性心律失常指南，室上速频繁发作并且出现血流动力改变为射频消融适应证。

(64~67 共用题干)

64. 【正确答案】A

【答案解析】参照美国风湿病学会 1982 年的 SLE 分类标准：①颧部红斑；②盘状红斑；③光过敏；④口腔溃疡；⑤关节炎；⑥浆膜炎；⑦肾脏病变；⑧神经系统病变：癫痫发作或精神症状；⑨血液系统异常：溶血性贫血或血白细胞减少或淋巴细胞绝对值减少或血小板减少；⑩免疫学异常：狼疮细胞阳性或抗 dsDNA 或抗 Sm 抗体阳性或梅毒血清试验假阳性；抗核抗体阳性。

在上述 11 项中，如果有超过 4 项阳性，则可诊断为 SLE。

故诊断为系统性红斑狼疮，中医病名为蝶疮流注。

65. 【正确答案】D

【答案解析】系统性红斑狼疮之脾肾两虚证

证候：面色不华，但时有潮红，两手指甲亦无华色，神疲乏力，畏寒肢冷，时而午后烘热，口干，小便短少，两腿浮肿如泥，进而腰股俱肿，腹大如鼓，舌胖、舌偏红或偏淡均有，苔薄白或薄腻，脉弦细、细数、细弱。

治法：滋肾填精，健脾利水。

方药：济生肾气丸加减。

66. 【正确答案】B

【答案解析】系统性红斑狼疮之脾肾两虚证

证候：面色不华，但时有潮红，两手指甲亦无华色，神疲乏力，畏寒肢冷，时而午后烘热，口干，小便短少，两腿浮肿如泥，进而腰股俱肿，腹大如鼓，舌胖、舌偏红或偏淡均有，苔薄白或薄腻，脉弦细、细数、细弱。

治法：滋肾填精，健脾利水。

方药：济生肾气丸加减。

67. 【正确答案】B

【答案解析】系统性红斑狼疮之脾肾两虚证

证候：面色不华，但时有潮红，两手指甲亦无华色，神疲乏力，畏寒肢冷，时而午后烘热，口干，小便短少，两腿浮肿如泥，进而腰股俱肿，腹大如鼓，舌胖、舌偏红或偏淡均有，苔薄白或薄腻，脉弦细、细数、细弱。

治法：滋肾填精，健脾利水。

方药：济生肾气丸加减。

(68~72 共用题干)

68. 【正确答案】D

【答案解析】胃镜活检组织学检查非萎缩性胃炎以慢性炎症改变为主，萎缩性胃炎则在此基础上有不同程度的萎缩与化生，常用取材部位为胃窦小弯、大弯、胃角及胃体下部小弯。

69. 【正确答案】C

【答案解析】饱胀为主要症状者予胃动力药：如甲氧氯普胺（胃复安），吗丁啉，西沙必利。

70. 【正确答案】A

【答案解析】脾胃虚弱证证候胃脘隐痛，喜温喜按，食后胀满痞闷，纳呆，便溏，神疲乏力，舌质淡或有齿印，苔薄白，脉沉细。治法：健脾益气，温中和胃。方药：四君子汤加减。

71. 【正确答案】A

【答案解析】脾胃虚弱证证候胃脘隐痛，喜温喜按，食后胀满痞闷，纳呆，便溏，神疲乏力，舌质淡或有齿印，苔薄白，脉沉细。治法：健脾益气，温中和胃。方药：四君子汤加减。

72. 【正确答案】B

【答案解析】泛吐清水较重者，可加干姜、吴茱萸温胃化饮。

(73~75 共用题干)

73. 【正确答案】C

【答案解析】根据患者临床表现，考虑有消化道穿孔的可能，所以应进行腹部 X 线检查明确诊断。

74. 【正确答案】B

【答案解析】患者有消化道溃疡病史，并根据患者腹痛位置，考虑最可能的原因为胃十二指肠穿孔。

75. 【正确答案】E

【答案解析】急性穿孔首选治疗为外科手术。

(76~79 共用题干)

76. 【正确答案】A

【答案解析】消化性溃疡——肝胃郁热证证候：胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。治法：清胃泄热，疏肝理气。方药：化肝煎合左金丸加减。

77. 【正确答案】D

【答案解析】消化性溃疡——肝胃郁热证证候：胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。治法：清胃泄热，疏肝理气。方药：化肝煎合左金丸加减。

78. 【正确答案】C

【答案解析】消化性溃疡——肝胃郁热证证候：胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。治法：清胃泄热，疏肝理气。方药：化肝煎合左金丸加减。

79. 【正确答案】A

【答案解析】两胁胀痛甚者，加郁金、川楝子。

(80~82 共用题干)

80. 【正确答案】B

【答案解析】中间综合征为急性中毒后 24~96 小时，胆碱能危象基本消失且意

识清晰, 出现以屈颈肌和四肢近端肌肉, 第III、VII、IX、X对脑神经支配的肌肉、呼吸肌无力为主的临床表现。结合患者病程及目前表现, 考虑为中间综合征并且病情严重, 治疗首先建立人工气道, 进行机械通气。

81. 【正确答案】B

【答案解析】迟发性多发性神经病为急性重、中度中毒后2~3周, 胆碱能症状消失后出现的感觉、运动型多发性神经病。先出现腓肠肌酸痛及压痛, 数日后出现下肢无力, 远端最明显, 逐渐影响到下肢近端和上肢, 多伴有肢体远端手套、袜套式感觉减退。

82. 【正确答案】C

【答案解析】慢性中毒主要为对症治疗, 脱离接触OP1, 可短程、小剂量使用阿托品。症状、体征基本消失和胆碱酯酶活性恢复常约需2~4周。

(83~87 共用题干)

83. 【正确答案】C

【答案解析】支气管哮喘诊断标准

1. 反复发作喘息、气急、胸闷或咳嗽, 多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激以及病毒性上呼吸道感染、运动等有关。

2. 发作时在双肺可闻及散在或弥漫性、以呼气相为主的哮鸣音, 呼气相延长。

3. 上述症状和体征可经治疗缓解或自行缓解。

4. 除外其他疾病所引起的喘息、气急、胸闷和咳嗽。

5. 临床表现不典型者(如无明显喘息或体征), 应至少具备以下1项试验阳性:

①支气管激发试验或运动激发试验阳性; ②支气管舒张试验阳性, FEV_1 增加 $\geq 12\%$, 且 FEV_1 增加绝对值 $\geq 200\text{ml}$; ③呼气流量峰值(PEF)日内(或2周)变异率 $\geq 20\%$ 。

符合1~4条或4、5条者, 可以断为哮喘。

84. 【正确答案】D

【答案解析】支气管哮喘之寒哮证

证候: 呼吸急促, 喉中哮鸣有声, 胸膈满闷如塞, 咳不甚, 咯吐不爽, 痰稀薄色白, 面色晦滞。口不渴或渴真热饮, 天冷或受寒易发, 形寒畏冷, 初起多兼恶寒、发热、头痛等表证, 舌苔白滑, 脉弦紧或浮紧。

治法: 温肺散寒, 化痰平喘。

方药: 射干麻黄汤加减。表寒明显, 寒热身疼, 配桂枝、生姜辛散风寒; 痰涌气逆, 不得平卧, 加葶苈子、苏子泻肺降逆, 并酌加杏仁、白前、橘皮等化痰利气; 咳逆上气, 汗多, 加白芍以敛肺。

85. 【正确答案】B

【答案解析】支气管哮喘之寒哮证

证候: 呼吸急促, 喉中哮鸣有声, 胸膈满闷如塞, 咳不甚, 咯吐不爽, 痰稀薄色白, 面色晦滞。口不渴或渴真热饮, 天冷或受寒易发, 形寒畏冷, 初起多兼恶寒、发热、头痛等表证, 舌苔白滑, 脉弦紧或浮紧。

治法: 温肺散寒, 化痰平喘。

方药: 射干麻黄汤加减。表寒明显, 寒热身疼, 配桂枝、生姜辛散风寒; 痰涌气逆, 不得平卧, 加葶苈子、苏子泻肺降逆, 并酌加杏仁、白前、橘皮等化痰利气; 咳逆上气, 汗多, 加白芍以敛肺。

86. 【正确答案】A

【答案解析】支气管哮喘之寒哮证

证候: 呼吸急促, 喉中哮鸣有声, 胸膈满闷如塞, 咳不甚, 咯吐不爽, 痰稀薄色白, 面色晦滞。口不渴或渴真热饮, 天冷或受寒易发, 形寒畏冷, 初起多兼恶寒、发热、头痛等表证, 舌苔白滑, 脉弦紧或浮紧。

治法: 温肺散寒, 化痰平喘。

方药: 射干麻黄汤加减。表寒明显, 寒热身疼, 配桂枝、生姜辛散风寒; 痰涌气逆, 不得平卧, 加葶苈子、苏子泻肺降逆, 并酌加杏仁、白前、橘皮等化痰利气; 咳逆上气, 汗多, 加白芍以敛肺。

87. 【正确答案】A

【答案解析】支气管哮喘之寒哮证

证候: 呼吸急促, 喉中哮鸣有声, 胸膈满闷如塞, 咳不甚, 咯吐不爽, 痰稀薄色白, 面色晦滞。口不渴或渴真热饮, 天冷或受寒易发, 形寒畏冷, 初起多兼恶寒、发热、头痛等表证, 舌苔白滑, 脉弦紧或浮紧。

治法: 温肺散寒, 化痰平喘。

方药: 射干麻黄汤加减。表寒明显, 寒热身疼, 配桂枝、生姜辛散风寒; 痰涌气

逆,不得平卧,加葶苈子、苏子泻肺降逆,并酌加杏仁、白前、橘皮等化痰利气;咳逆上气,汗多,加白芍以敛肺。

(88~92 共用题干)

88. 【正确答案】 E

【答案解析】 上尿路感染(急性肾盂肾炎)常有发热、寒战,甚至出现毒血症症状,伴明显腰痛,输尿管点和/或肋脊点压痛、肾区叩击痛等。

89. 【正确答案】 E

【答案解析】 尿涂片细菌检查设备简单、操作方便,检出率达 80%~90%,可初步确定是杆菌或球菌、是革兰氏阴性还是革兰氏阳性细菌,对及时选择有效抗生素有重要参考价值。

90. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性肾盂肾炎之膀胱湿热证

证候:小便频数,灼热刺痛,色黄赤,小腹拘急胀痛,或腰痛拒按,或见恶寒发热,或见口苦,大便秘结,舌质红,苔薄黄腻,脉滑数。

治法:清热利湿通淋。

方药:八正散加减。

91. 【正确答案】 B

【答案解析】 急性肾盂肾炎之膀胱湿热证

证候:小便频数,灼热刺痛,色黄赤,小腹拘急胀痛,或腰痛拒按,或见恶寒发热,或见口苦,大便秘结,舌质红,苔薄黄腻,脉滑数。

治法:清热利湿通淋。

方药:八正散加减。

92. 【正确答案】 D

【答案解析】 急性肾盂肾炎之膀胱湿热证

证候:小便频数,灼热刺痛,色黄赤,小腹拘急胀痛,或腰痛拒按,或见恶寒发热,或见口苦,大便秘结,舌质红,苔薄黄腻,脉滑数。

治法:清热利湿通淋。

方药:八正散加减。

(93~97 共用题干)

93. 【正确答案】B

【答案解析】肾病综合征为一组常见于肾小球疾病的临床综合征。临床特征为:

①大量蛋白尿 ($\geq 3.5\text{g}/24\text{h}$); ②低白蛋白血症 ($\leq 30\text{g/L}$); ③水肿; ④高脂血症。

94. 【正确答案】D

【答案解析】肾病综合征之脾虚湿困证

证候: 浮肿, 按之凹陷不易恢复, 腹胀纳少, 面色萎黄, 神疲乏力, 尿少色清, 大便或溏, 舌质淡, 苔白腻或白滑, 脉沉缓或沉弱。

治法: 温运脾阳, 利水消肿。

方药: 实脾饮加减。

95. 【正确答案】A

【答案解析】肾病综合征之脾虚湿困证

证候: 浮肿, 按之凹陷不易恢复, 腹胀纳少, 面色萎黄, 神疲乏力, 尿少色清, 大便或溏, 舌质淡, 苔白腻或白滑, 脉沉缓或沉弱。

治法: 温运脾阳, 利水消肿。

方药: 实脾饮加减。

96. 【正确答案】D

【答案解析】肾病综合征之脾虚湿困证

证候: 浮肿, 按之凹陷不易恢复, 腹胀纳少, 面色萎黄, 神疲乏力, 尿少色清, 大便或溏, 舌质淡, 苔白腻或白滑, 脉沉缓或沉弱。

治法: 温运脾阳, 利水消肿。

方药: 实脾饮加减。

97. 【正确答案】E

【答案解析】细胞毒药物可用于“激素抵抗型”的患者, 协同激素治疗。若无激素禁忌, 一般不作为首选或单独治疗用药。

(98~100 共用题干)

98. 【正确答案】A

【答案解析】糖皮质激素是治疗特发性血小板减少性紫癜的首选药物。

99. 【正确答案】E

【答案解析】脾切除是治疗本病的有效方法之一。适应证：①正规糖皮质激素治疗 3~6 个月无效；②泼尼松维持量每日需大于 30mg；③有糖皮质激素使用禁忌证；④⁵¹Cr 扫描脾区放射指数增高。以脾动脉栓塞替代脾切除，亦有良效。

100. 【正确答案】C

【答案解析】急症处理：

常用方法：①血小板悬液输注；②静脉注射丙种球蛋白；③血浆置换；④大剂量甲泼尼龙。

适用于：①血小板低于 $20 \times 10^9/L$ 者；②出血严重、广泛者；③疑有或已发生颅内出血者；④近期将实施手术或分娩者。

