

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2019 年第 12 期

1. 【问题】基础代谢的正常范围值。

【解答】基础代谢率正常值为±10%；+20%~30%为轻度甲亢，+30%~60%为中度甲亢，+60%以上为重度甲亢。

基础代谢率也可用基础代谢率测定器测定，较为可靠。为简便起见，临床上常根据脉率和血压计算。计算公式为：基础代谢率=（脉率+脉压）-111。

2. 【问题】除了白蛋白输液不需要交叉配血血型外，还有哪种血液制品也是不需要的？

【解答】不需要进行血型鉴定和交叉配血实验的是人血白蛋白；输入血浆必须做血型鉴定但是不需要做交叉配血实验。

3. 【问题】软产道裂伤和子宫收缩乏力出血特点是什么？

【解答】软产道裂伤出血特点是出血发生在胎儿娩出后。软产道裂伤流出的血液能自凝，若裂伤损及小动脉，则血液呈鲜红色。

宫缩乏力出血特点是出现在胎盘剥离后，而胎盘未剥离前阴道不流血或仅有少量流血，胎盘剥离后因子宫收缩乏力使子宫出血过多，但血液凝固。产妇可出现失血性休克表现。检查腹部可见子宫软、轮廓不清，触不清宫底。

4. 【问题】某孕妇孕 36 周，产一女婴，出生体重 1600g，生后无青紫，问护士何时给孩子喂奶，护士的正确回答是

- A. 生后半小时内喂奶
- B. 生后半小时内喂 10%葡萄糖水 2ml/kg
- C. 生后 2~4h 喂 10%葡萄糖水 2ml/kg
- D. 生后 2~4h 喂奶
- E. 生后 8h 喂 10%葡萄糖水 2ml/kg

【解答】选择 C。出生体重在 1500g 以上而无青紫的早产儿，可生后 2~4 小时喂 10%葡萄糖水 2ml/kg，无呕吐者，可在生后 6~8 小时喂乳。

5. 【问题】血培养血液标本采集量应该是多少？

【解答】一般血培养取血 5ml；亚急性细菌性心内膜炎病人，应取血 10~15ml，以提高细菌培养阳性率。