

2019 年口腔执业助理医师：《答疑周刊》第 15 期

【口腔组织病理学】

根尖周肉芽肿内上皮大多数可能来源于

- A. Serres 上皮剩余
- B. Malassez 上皮剩余
- C. 口腔粘膜上皮
- D. 呼吸道上皮
- E. 牙周袋壁上皮

【正确答案】 B

【答案解析】 根尖肉芽肿内的另一个重要特征是有上皮存在，其上皮绝大多数来自牙周膜的 Malassez 上皮剩余。少数病例也可来自：①口腔上皮，见于有瘻管口和口腔相通的病例，上皮可经瘻道长入，另一情况是牙周病患者，上皮可由牙周袋或受累的根本叉上皮增生而来；②呼吸道上皮，见于病变和上颌窦相通时。

【口腔组织病理学】

根尖周肉芽肿的镜下表现错误的是

- A. 以淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞浸润根尖周组织并有肉芽组织形成为其特征
- B. 肉芽组织内可见血管内皮细胞可成纤维细胞增生
- C. 巨噬细胞可形成泡沫细胞
- D. 有胆固醇和含铁血黄素沉积
- E. 根尖部贮存的脓液被纤维结缔组织包绕

【正确答案】 E

【答案解析】 显微镜下观察，慢性根尖周炎以淋巴细胞、浆细胞和巨噬细胞浸润根尖周组织并有肉芽组织形成为其特征。肉芽组织内除慢性炎症细胞浸润外，可见血管内皮细胞和成纤维细胞增生，新生的毛细血管常衬以肿胀的内皮细胞。巨噬细胞由于吞噬脂质后可形成片状聚集的泡沫细胞。另有胆固醇晶体和含铁血黄素沉积。

【药理学】

不是缩宫素特点的是

- A. 能直接兴奋子宫平滑肌
- B. 对子宫体兴奋作用强
- C. 对子宫颈有松弛作用
- D. 对子宫作用敏感性不受女性激素的影响
- E. 大剂量引起子宫平滑肌强直性收缩

【正确答案】 D

【答案解析】 缩宫素对子宫作用敏感性收到女性激素的影响。

【药理学】

关于缩宫素药理作用不正确的叙述是

- A. 可减弱子宫节律性收缩
- B. 促进乳汁排泄
- C. 降压
- D. 加强子宫收缩力
- E. 缩宫素对子宫平滑肌的敏感性受性激素的影响

【正确答案】 A

【答案解析】 缩宫素可以直接兴奋子宫平滑肌，加强子宫平滑肌的收缩力和收缩频率。