

【内科学】

慢性肾炎患者尿蛋白 $<1\text{g/d}$ 时, 血压应控制在

A. $<130/85\text{mmHg}$

B. $<130/80\text{mmHg}$

C. $<160/95\text{mmHg}$

D. $<150/95\text{mmHg}$

E. $<140/90\text{mmHg}$

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

【医学教育网原创】慢性肾炎, 尿蛋白 $<1\text{g/d}$ 时, 血压应控制在 $<130/80\text{mmHg}$ 。尿蛋白 $\geq 1\text{g/d}$ 者, 血压应控制在 $<125/75\text{mmHg}$ 。高血压是加速病情进展的重要危险因素。应严格控制血压。首选具有肾脏保护作用的降压药如 ACEI 或 ARB, 一般需联合用药, 血压控制不达标时联合应用钙拮抗剂、 β 受体阻滞剂和利尿剂等。

故本题答案选 B。

【诊断学基础】

前壁心肌梗死特征性心电图改变出现的导联是

A. V1、I、aVF

B. II、III、aVF

C. V1~V3

D. V1~V5

E. V3~V5

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

【医学教育网原创】前壁心肌梗死特征性心电图改变出现的导联是 V3~V5。

注意特征性心电图定位诊断: 前间壁 V1~V3, 前壁 V3~V5, 广泛前壁 V1~V6, 下壁 II、III、aVF 高侧壁, I、aVL 正后壁。

故本题答案选 E。

 **【中医内科学】**
www.med66.com



痞满以下列何项症状为主症

A. 胃脘疼痛



B. 胃脘满闷



C. 胸脘痞闷



D. 脘闷不舒



E. 胸脘闷痛

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。



【医学教育网原创】痞满临床以胃脘痞塞, 满闷不舒为主症, 并有按之柔软, 压之不痛, 望无胀形的特点。注意痞满与胃痛的鉴别, 两者病位同在胃脘部, 且常相兼出现。然胃痛以疼痛为主, 胃痞以满闷不适为患, 可累及胸膈; 胃痛病势多急, 压之可痛, 而胃痞起病较缓, 压无痛感, 两者差别显著。



故本题答案选 B。

【传染病学】

关于 HIV 无症状感染期的描述, 下列哪项是正确的

A. 持续时间较长, 可达数年或更长




B. 血中一般检测不出 HIV



C. 抗-HIV 阴性

D. 无传染性



E. 常出现口腔毛状白斑



学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案选 A。

【医学教育网原创】无症状感染, 可由原发感染或急性感染症状消失后延伸而来, 持续时间一般为 6~8 年, 短可数月, 长可达 15 年。临床无明显症状, 但血中可检出病毒及抗体, 有传染性。注意艾滋病期的诊断。有流行病学史, 实验室检查 HIV 抗体阳性, 加下述各项中的任何一项即可诊断:

(1) 原因不明的不规则发热, 体温高于 38℃ 持续 1 个月以上。

(2) 慢性腹泻 (每日 >3 次) 持续 1 个月以上。

(3) 体重在 6 个月内下降 10% 以上。

(4) 反复发作的口腔念珠菌感染。

(5) 反复发作的单纯疱疹病毒、带状疱疹病毒感染。

(6) 卡氏肺孢子菌肺炎。

(7) 反复发生的细菌性肺炎。

(8) 活动性结核或非结核分枝杆菌病。

(9) 深部真菌感染。

(10) 中枢神经系统占位性病变。

(11) 中青年人出现痴呆。

(12) 活动性巨细胞病毒感染。

(13) 弓形体病。

(14) 马尔尼菲青霉菌感染。

(15) 反复发生的败血症。

(16) 皮肤黏膜或内脏的卡波西肉瘤、淋巴瘤。另外, CD4+T 淋巴细胞计数 <200 / μ l 也可帮助诊断。

故本题答案选 A。

【中医妇科学】

下列妇科病证中, 哪项与寒邪无关

- A. 痛经
- B. 月经后期
- C. 带下病
- D. 月经先期
- E. 不孕症

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题选 D。

【医学教育网原创】寒邪致病, 有外寒、内寒之分。外寒入侵冲任、子宫, 进而发生经行发热、经行身痛、痛经、月经后期、月经过少、闭经、产后身痛、不孕症等病证。内寒, 是机体阳气虚衰, 命火不足, 或阴寒之气不散, 故内寒的产生, 与肾脾阳虚关系最大。内寒致病常导致闭经、多囊卵巢综合征、月经后期、痛经、带下病、子肿、宫寒不孕。

故本题答案选 D。

医学教育网中医执业助理医师: 《答疑周刊》2019 年第 18 期 (word 版下载)