

【牙体牙髓病学】

创伤性牙隐裂治疗上应首先

- A. 开髓失活
- B. 全冠修复
- C. 备洞充填
- D. 调整咬合
- E. 拔除患牙

【正确答案】D

【答案解析】

对因治疗: 调除创伤性咬合力, 调磨过陡的牙尖; 均衡全口咬合力的负担; 诊治其他部位的牙齿疾病, 修复缺失牙等。

【牙体牙髓病学】

关于牙隐裂治疗原则最佳的选项是

- A. 对因治疗
- B. 对症治疗
- C. 防止劈裂
- D. 以上均正确
- E. 以上均不正确

【正确答案】D

【答案解析】

牙隐裂治疗原则:

①对因治疗: 调除创伤性咬合力, 调磨过陡的牙尖; 均衡全口咬合力的负担; 诊治其他部位的牙齿疾病, 修复缺失牙等。

②对症治疗: 出现并发症时进行相应治疗。

③防止劈裂: a. 在做牙髓治疗前, 应先对患牙予以降(牙合)处理, 并磨除牙冠裂纹后用复合树脂粘接; 或用钢丝结扎、带环或临时冠保护, 防止牙髓治疗过程中牙冠劈裂。b. 牙髓治疗过程应尽量一疗次完成, 缩短时间, 减少术中劈裂的风险。c. 牙髓治疗后, 行永久充填修复。

【口腔黏膜病学】

下面对于复发性阿弗他溃疡临床特点描述不正确的是

- A. 溃疡表现为孤立的、圆形或椭圆形的浅表性溃疡
- B. 病程一般为10~14天
- C. 呈周期性复发且有自限性

D. 先出现密集分布的针头大小的小水疱, 后破溃形成溃疡

E. 任何人种均可发生

【正确答案】D

【答案解析】

“先出现密集分布的针头大小的小水疱, 后破溃形成溃疡”此为原发性单纯疱疹的特点。

【口腔黏膜病学】

在复发性阿弗他溃疡全身治疗中, 正确使用肾上腺皮质激素类药物的方法是

A. 泼尼松 10~30mg/d, 分3次口服, 溃疡控制后逐渐减量

B. 泼尼松 60mg/d, 分3次口服, 控制病情后减量

C. 泼尼松 60~80mg/d, 分3次口服, 控制病情后减量

D. 泼尼松 80~100mg/d, 分3次口服, 控制病情后减量

E. 泼尼松 100~120mg/d, 分3次口服, 控制病情后减量

【正确答案】A

【答案解析】

复发性阿弗他溃疡: 泼尼松 10~30mg/d, 分3次口服, 溃疡控制后逐渐减量。