

【口腔组织病理学】

慢性根尖周肉芽肿在一定条件下可转化成根尖周囊肿,其囊肿的上皮来源是

- A. 经瘻道口长入的口腔黏膜的上皮或皮肤
- B. 呼吸道上皮
- C. 牙周袋壁上皮
- D. Malassez 上皮剩余
- E. Serres 上皮剩余

【正确答案】D

【答案解析】

根尖周囊肿是颌骨内常见的牙源性囊肿,属于炎症性囊肿,其上皮来源为 Malassez 上皮剩余增殖。所以根尖囊肿的上皮来源为 Malassez 上皮剩余。

【口腔组织病理学】

慢性根尖周炎中最多见的是

- A. 慢性根尖周脓肿
- B. 慢性根尖周肉芽肿
- C. 慢性根尖周囊肿
- D. 致密性骨炎
- E. 慢性牙槽脓肿

【正确答案】B

【答案解析】

慢性根尖周炎中最多见的为慢性根尖周肉芽肿,也是慢性根尖周炎的主要病变类型。

【口腔解剖生理学】

下颌运动的形式包括

- A. 开闭口运动
- B. 前伸后退运动
- C. 侧方运动
- D. B+C
- E. A+B+C

【正确答案】E

【答案解析】

下颌运动的形式下颌运动是一个三维运动,通常将该运动简化为开闭口运动、前伸后退运动和侧方运动三种基本形式来分析和描述。

【口腔解剖生理学】

下列有关闭口运动的力说法正确的是

- A. 牵引下颌向前上方运动
- B. 颞肌、咬肌及翼内肌收缩
- C. 稳定关节盘的作用
- D. 翼外肌上头在髁突回位
- E. 以上均正确

【正确答案】E

【答案解析】

闭口运动的力：颞肌、咬肌及翼内肌的收缩，牵引下颌向前上方运动，使下颌回到牙尖交错位，翼外肌上头在髁突回位、关节盘向前旋转中起稳定关节盘的作用。

