

2019年中西医执业医师-模拟试题（第三单元）

1. 癫痫持续状态完全控制后，定时定量肌注的药物一般是

- A. 苯妥英钠
- B. 丙戊酸
- C. 地西洋
- D. 苯巴比妥钠
- E. 异戊巴比妥钠

【正确答案】D

【答案解析】癫痫持续状态完全控制后，应定时定量维持用药。一般肌注苯巴比妥钠 0.2g，根据用药情况可 6~8 小时 1 次，连续 3~4 天；病人清醒后改口服抗癫痫药。

2. 胃癌的病机可概括为

- A. 实证
- B. 虚证
- C. 本虚标实
- D. 真实假虚
- E. 真虚假实

【正确答案】C

【答案解析】胃癌病位在胃，与肝、脾、肾等脏关系密切，病机总属本虚标实。

3. 上消化道出血出现周围循环衰竭时，提示出血量超过

- A. 500ml
- B. 600ml
- C. 800ml
- D. 1000ml
- E. 1200ml

【正确答案】D

【答案解析】短时间内出血量超过 1000ml，可出现周围循环衰竭表现。

4. 下列不属于急性肾衰竭的中医病因的是

- A. 热毒炽盛
- B. 肝胃不和
- C. 火毒壅滞
- D. 湿热蕴结
- E. 气脱津伤

【正确答案】B

【答案解析】急性肾衰竭的病因：（1）热毒炽盛：热毒入气入血，损伤肾络，气化失司，而见少尿、血尿或衄血。（2）火毒瘀滞：热入营血，闭窍扰神，迫妄妄行，热阻于肾，气化失司而少尿。（3）湿热蕴结：湿毒中阻，气机升降失常，内犯于肾，经络气血瘀阻，气化不行，而见少尿或尿闭。（4）气脱津伤。

5. 治疗急性白血病中医证型之痰热瘀阻证选用

- A. 黄连解毒汤合清营汤
- B. 温胆汤合桃红四物汤
- C. 知柏地黄丸合二至丸
- D. 五阴煎加味
- E. 葛根芩连汤加味

【正确答案】B

【答案解析】急性白血病之痰热瘀阻证。证候：腹部积块，颌下、腋下、颈部有痰核单个或成串，痰多，胸闷，头重，纳呆，发热，肢体困倦，心烦口苦，目眩，骨痛，胸部刺痛，口渴而不欲饮，舌质紫暗，或有瘀点、瘀斑，舌苔黄腻，脉滑数或沉细而涩。治法：清热化痰，活血散结。方药：温胆汤合桃红四物汤加减。

6. 动脉炎所导致的脑血栓形成的好发人群是

- A. 儿童
- B. 中老年人
- C. 孕妇
- D. 中青年
- E. 青少年

【正确答案】D

【答案解析】脑血栓形成：动脉炎所致者以中青年多见。

7. Alzheimer 病的临床症状中叙述不正确的是

- A. 记忆力障碍
- B. 认知功能障碍
- C. 行为异常
- D. 男性远多于女性
- E. 社交障碍

【正确答案】D

【答案解析】Alzheimer 病（AD）是老年人最常见的一种渐进性神经变性疾病。临床表现为进行性近记忆力障碍，认知功能障碍，行为异常和社交障碍，病情呈进行性加重，逐渐丧失独立生活能力。经年龄校正后男性与女性患病率相近。

8. 临床上以高热（体温通常高于 41℃）、无汗、昏迷为主要症状的是

- A. 中毒
- B. 休克
- C. 热射病
- D. 热痉挛
- E. 热衰竭

【正确答案】C

【答案解析】热射病是因高温引起体温调节中枢功能障碍，热平衡失调使体内热蓄积，临床上以高热（体温通常高于 41℃）、无汗、昏迷为主要症状。

9. β 受体阻滞剂的禁忌证不包括

- A. 心动过缓
- B. 液体潴留
- C. 支气管痉挛性疾病
- D. II 度及以上房室传导阻滞
- E. 已安装起搏器的房室传导阻滞

【正确答案】E

【答案解析】 β 受体阻滞剂禁忌证：支气管痉挛性疾病、心动过缓（心率 <60 次/分）、II 度及以上房室传导阻滞（除已安装起搏器）；明显液体潴留，需大量利尿剂的 CHF 患者。

10. 急性胃炎的最主要病因是

- A. 化学性损伤
- B. 急性应激
- C. 细菌感染
- D. 病毒感染
- E. 食入异物

【正确答案】B

【答案解析】急性应激是急性胃炎最主要病因。包括严重创伤、大手术、严重感染、大面积烧伤、脑血管意外、休克和过度紧张等。

11. 与肝硬化密切相关的脏腑是

- A. 脾肾
- B. 肺肾
- C. 肝胃
- D. 脾胃
- E. 心肾

【正确答案】A

【答案解析】肝硬化，病变脏腑在肝，与脾、肾密切相关；初起在肝脾，久则及肾。

12. 膀胱炎的多发人群是

- A. 儿童
- B. 孕妇
- C. 中老年人
- D. 青壮年男性
- E. 中青年女性

【正确答案】E

【答案解析】膀胱炎占尿路感染的 60% 以上。主要表现为尿频、尿急、尿痛、排尿困难、下腹部疼痛等，部分患者迅速出现排尿困难。一般无全身症状，少数患者可有腰痛、发热，体温多在 38°C 以下。多见于中青年妇女。

13. 下列关于慢性粒细胞白血病的实验室检查叙述不正确的是

- A. 骨髓增生明显至极度活跃，以粒细胞为主

- B. 巨核细胞增多或正常，后期减少
- C. 白细胞数明显增高，常超过 $20 \times 10^9/L$ ，可达 $100 \times 10^9/L$ 以上
- D. 晚期血小板渐减少，并出现贫血
- E. 血清乳酸脱氢酶减低

【正确答案】E

【答案解析】慢性粒细胞白血病的实验室检查：（1）血象：白细胞数明显增高，常超过 $20 \times 10^9/L$ ，可达 $100 \times 10^9/L$ 以上。血片中粒细胞显著增多，可见各阶段粒细胞，以中性中幼、晚幼和杆状核粒细胞居多，原始（I+II）细胞 $< 10\%$ ；嗜酸性及嗜碱性粒细胞增多，后者有助于诊断。血小板多在正常水平，部分患者增多；晚期血小板渐减少，并出现贫血。（2）骨髓：骨髓增生明显至极度活跃，以粒细胞为主，粒：红比例明显增高，其中中性中幼、晚幼及杆状核粒细胞明显增多，原始细胞少于 10%。嗜酸性和嗜碱性粒细胞增多。红细胞相对减少。巨核细胞增多或正常，后期减少。（3）血液生化：血清及尿中尿酸浓度增高。血清乳酸脱氢酶增高。

14. 下列不属于特发性血小板减少性紫癜的中医范畴的是

- A. 阴阳毒
- B. 虚劳
- C. 肌衄
- D. 葡萄疫
- E. 紫斑

【正确答案】B

【答案解析】特发性血小板减少性紫癜属中医“血证”、“阴阳毒”、“发斑”、“肌衄”、“葡萄疫”、“紫癜”、“紫斑”等范畴。

15. 与痛风密切相关的脏腑是

- A. 肺脾肾
- B. 肝脾肾
- C. 心肝肾
- D. 脾胃肾
- E. 心脾肾

【正确答案】B

【答案解析】痛风的病位在四肢关节，与肝脾肾相关。

16. 短暂性脑缺血发作的核心是

- A. 气虚
- B. 血瘀
- C. 痰凝
- D. 气滞
- E. 气脱

【正确答案】B

【答案解析】血瘀是短暂性脑缺血发作发生发展的核心，更有痰浊与瘀血互结而致病者，肝阳亦有夹痰、夹瘀而上扰者。

17. 脑栓塞的意识障碍特点是

- A. 持续时间长
- B. 持续时间短
- C. 休息时发生
- D. 运动时发生
- E. 无意识障碍

【正确答案】 B

【答案解析】 脑栓塞的意识障碍特点：50%~60%患者起病时有意识障碍，但持续时间短。

18. 临床上脑出血首选的检查方法是

- A. MRI 检查
- B. CT 检查
- C. 数字减影脑血管造影
- D. 脑脊液检查
- E. 出血量的估算

【正确答案】 B

【答案解析】 CT 检查是诊断脑出血安全有效的方法，为临床上脑出血疑似病例的首选检查。

19. 下列何种肺炎治疗时红霉素不作为常用药

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 军团菌肺炎
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 肺炎衣原体肺炎
- E. 葡萄球菌肺炎

【正确答案】 E

【答案解析】 葡萄球菌肺炎：由于金黄色葡萄球菌对青霉素 G 耐药菌株的增多，现多选用耐青霉素酶的半合成青霉素或头孢菌素。肺炎链球菌肺炎：首选青霉素 G。对青霉素过敏者，可用大环内酯类，如红霉素或罗红霉素，亦可用喹诺酮类药物口服或静脉滴注。军团菌肺炎：首选红霉素，但要注意消化系统的副作用。亦可与利福平联合应用，以减少细菌耐药。大环内酯类是治疗肺炎支原体感染的首选药物。肺炎衣原体肺炎：治疗与支原体肺炎相似，首选红霉素。

20. 重度和极重度慢性阻塞性肺病患者可应用的药物是

- A. 抗生素
- B. 祛痰药
- C. 糖皮质激素
- D. β_2 受体激动剂
- E. 肾上腺皮质激素

【正确答案】 C

【答案解析】 糖皮质激素：对重度和极重度患者（III级和IV级）、反复加重的患者，有研究显示长期吸入糖皮质激素与长效 β_2 肾上腺素受体激动剂联合制剂，可增加运动耐力、减少

急性加重发作频率、提高生活质量，甚至有些患者的肺功能得到改善。目前常用沙美特罗加氟替卡松、福莫特罗加布地奈德。

21. 治疗肺炎支原体肺炎首选

- A. 氟喹诺酮类
- B. 大环内酯类
- C. 氨基糖苷类
- D. 合成青霉素或头孢菌素
- E. 青霉素 G

【正确答案】 B

【答案解析】 考点：肺炎支原体肺炎的治疗。肺炎支原体肺炎具有自限性，多数患者不经治疗可自愈。病程早期可通过适当的抗生素治疗减轻症状、缩短病程。大环内酯类是治疗肺炎支原体感染的首选药物。

22. 休克的病理特点是

- A. 组织器官灌流减少
- B. 组织器官有效灌流量增加
- C. 有效循环血量代偿性增加
- D. 组织器官有效灌流量锐减与有效循环血量不足
- E. 有效循环血量不足

【正确答案】 D

【答案解析】 休克是由于各种致病因素引起有效循环血容量突然下降使全身各组织和重要器官灌注不足，从而导致一系列代谢紊乱、细胞受损及脏器功能障碍。

23. 甲亢的水肿特点是

- A. 胫前黏液性水肿
- B. 胫后黏液性水肿
- C. 下垂性水肿
- D. 向心性水肿
- E. 离心性水肿

【正确答案】 A

【答案解析】 甲亢：皮肤及肢端表现可见胫前黏液性水肿。

24. 与脑血栓形成所属的中医学范畴不同的是

- A. 脑栓塞
- B. 脑出血
- C. 脑血管疾病
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 短暂性脑缺血发作

【正确答案】 E

【答案解析】 短暂性脑缺血发作属于中医学的“中风”、“眩晕”、“厥证”等范畴。其余跟脑血栓形成都属于中医学的“中风”、“眩晕”、“头痛”、“厥证”等范畴。

25. 不能改善类风湿关节炎症状的药物是

- A. 吲哚美辛
- B. 萘普生
- C. 氨甲蝶呤
- D. 布洛芬
- E. 双氯芬酸

【正确答案】C

【答案解析】能改善关节炎症状的药物是非甾体抗炎药，常用的有布洛芬、萘普生、吲哚美辛、舒林酸、阿西美辛、双氯芬酸等。

26. 重型再障感染时常合并的疾病是

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 慢性胃炎
- C. 败血症
- D. 肺炎
- E. 肾炎

【正确答案】C

【答案解析】重型再障以呼吸道感染最常见，其次有消化道、泌尿生殖道及皮肤、黏膜感染等。感染菌种以革兰阴性杆菌、金黄色葡萄球菌和真菌为主，常合并败血症。

27. 病毒性心肌炎的中医相关脏腑是

- A. 心肝
- B. 肺肾
- C. 肺脾
- D. 脾肾
- E. 脾胃

【正确答案】C

【答案解析】病毒性心肌炎病位在心，与肺脾关系密切。

28. 下列疾病中，发作时可出现“三凹征”的是

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 细菌性肺炎
- C. 支气管哮喘
- D. 喘息型支气管炎
- E. 慢性肺源性心脏病

【正确答案】C

【答案解析】支气管哮喘的体征：发作时胸部呈过度充气状态，有“三凹征”，肺部有广泛的哮鸣音，呼气音延长；但在轻度哮喘或哮喘严重发作时，哮鸣音可不出现。心率增快、奇脉、胸腹反常运动和发绀常出现在严重哮喘患者中。

29. 缓慢性心律失常指的是有效心搏每分钟低于

- A. 20 次
- B. 30 次
- C. 40 次
- D. 50 次
- E. 60 次

【正确答案】E

【答案解析】缓慢性心律失常是指有效心搏每分钟低于 60 次的各种心律失常。

30. 下列关于肺炎链球菌肺炎的病理分期正确的是

- A. 水肿期、充血期、炎症期
- B. 充血期、水肿期、肝变期
- C. 充血期、红色肝变期、灰色肝变期、消散期
- D. 充血期、灰色肝变期、红色肝变期、消散期
- E. 充血期、水肿期、肝变期、消散期

【正确答案】C

【答案解析】肺炎链球菌肺炎的病理分期：充血期、红色肝变期、灰色肝变期、消散期。所以本题选择 C 项。

31. 下列叙述错误的是

- A. 主动脉瓣关闭不全视诊可见点头运动
- B. 主动脉瓣关闭不全触诊有水冲脉
- C. 主动脉瓣关闭不全叩诊心脏呈梨形
- D. 主动脉瓣关闭不全听诊第一心音减弱
- E. 主动脉瓣关闭不全的舒张期杂音出现在舒张早期

【正确答案】C

【答案解析】主动脉瓣关闭不全叩诊：心浊音界向左下扩大，心腰明显，呈靴形。

32. 下列不属于系统性红斑狼疮临床表现的是

- A. 活动期患者常伴有发热
- B. 鼻梁和双颧颊部呈蝶形分布的红斑是 SLE 特征性改变
- C. 患者常有对称性多关节疼痛、肿胀
- D. 狼疮肾炎是 SLE 最常见和严重的临床表现
- E. 重症 SLE 不伴有心功能不全

【正确答案】E

【答案解析】系统性红斑狼疮表现：（1）全身症状：活动期患者常伴有发热，以长期低、中度热多见。合并感染时可见持续高热。同时多伴有疲乏、不适等症状。（2）皮肤与黏膜：鼻梁和双颧颊部呈蝶形分布的红斑是 SLE 特征性改变；SLE 口或鼻黏膜溃疡常见。（3）关节和肌肉：患者常有对称性多关节疼痛、肿胀，通常不引起骨质破坏。激素治疗中的 SLE 病人出现髌关节区域或膝关节隐痛不适，需考虑激素引发的缺血性股骨头坏死。SLE 可出现肌痛和肌无力，少数可有肌酶谱的增高。（4）肾：狼疮肾炎是 SLE 最常见和严重的临床表现，可为无症状性蛋白尿和 / 或血尿、高血压，甚至肾病综合征、急进性肾炎综合征等，病情可逐渐进展，晚期发生尿毒症，个别患者首诊即为慢性肾衰竭。肾衰竭是 SLE 死亡的常见

原因。(5) 心血管：常出现心包炎、心肌炎、心律失常，重症 SLE 可伴有心功能不全，提示预后不良。

33. 幽门管溃疡的临床表现是

- A. 多为上腹正中或偏右节律性疼痛
- B. 多为剑突下正中或偏左节律性疼痛
- C. 上腹疼痛无典型节律性，呕吐多见
- D. 上腹持续性剧烈疼痛
- E. 右上腹节律性疼痛，夜间痛和背痛多见且突出

【正确答案】 C

【答案解析】 幽门管溃疡常伴胃酸过多，缺乏典型溃疡的周期性和节律性疼痛，餐后即出现剧烈疼痛，制酸剂疗效差，易出现呕吐或幽门梗阻，易穿孔或出血。

34. 肺结核肺阴亏损证选用的方药是

- A. 补肺汤
- B. 月华丸
- C. 保真汤
- D. 百合固金汤
- E. 补天大造丸

【正确答案】 B

【答案解析】 肺结核肺阴亏损证证候：干咳，咳声短促，咳少量白黏痰，或痰中有血丝或血点，色鲜红，胸部隐隐闷痛，低热，午后手足心热，皮肤干灼，口咽干燥，少量盗汗，舌边尖红，无苔或少苔，脉细数。治法：滋阴润肺。方药：月华丸加减。

35. 溃疡性结肠炎阴血亏虚证选用的治法是

- A. 清热利湿
- B. 健脾渗湿
- C. 疏肝健脾
- D. 健脾温肾止泻
- E. 滋阴养血，清热化湿

【正确答案】 E

【答案解析】 溃疡性结肠炎之阴血亏虚证。证候：大便秘结或少量脓血便，腹痛隐隐，午后发热，盗汗，五心烦热，头晕眼花，舌红少苔，脉细数。治法：滋阴养血，清热化湿。方药：驻车丸。

36. 右心衰竭时出现的体征不包括

- A. 腹水
- B. 肝脏肿大
- C. 紫绀
- D. 水肿
- E. Kussmaul 征

【正确答案】 E

【答案解析】右心衰竭的体征：周围性发绀，颈静脉怒张，心率增快，可出现心律失常，可闻及三尖瓣区舒张期杂音。肝大且有压痛，肝-颈静脉反流征阳性，下肢水肿，重者可有腹水。少数患者可出现肺水肿及全心衰竭的体征。Kussmaul 征主要见于缩窄性心包炎。

37. 能引起左心室前负荷增加的是

- A. 心包炎
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

【正确答案】E

【答案解析】前负荷增加主要是由于心脏瓣膜关闭不全，题干问的是左心室，所以此题答案选 E。

38. 有关高血压病的叙述，不正确的是

- A. 多于中年以后发病
- B. 起病隐袭，进展缓慢
- C. 以肝肾阴虚为本
- D. 长期高血压可致左心衰竭
- E. 以并发尿毒症死亡者最多

【正确答案】E

【答案解析】高血压多以并发心脑血管病变死亡多见。

39. 肝硬化腹水治疗，最基本的是

- A. 休息，限水，限钠
- B. 应用大量利尿剂
- C. 腹水浓缩回输
- D. 反复输新鲜血
- E. 多次抽放腹水，每次 4000ml 以上

【正确答案】A

【答案解析】肝硬化腹水的治疗：（1）限制钠水的摄入。（2）利尿剂 目前主张联合用药、小量开始、逐渐加量、间歇给药。用利尿剂以体重每天下降不超过 0.5kg 为宜。（3）提高血浆胶体渗透压。（4）抽放腹水。（5）腹水浓缩回输。（6）腹腔-颈静脉引流。（7）外科手术治疗 ①门静脉分流减压术；②胸导管-颈内静脉吻合术。

40. 下列关于慢性肾小球肾炎的叙述不正确的是

- A. 慢性肾炎可发于任何年龄，但以中青年为主，男性多见
- B. 慢性肾炎多数起病隐匿，进展缓慢，病程较长
- C. 蛋白尿，血尿，高血压，水肿
- D. 晚期无明显的肾功能减退
- E. 后期有不同程度的贫血

【正确答案】D

【答案解析】考点：慢性肾小球肾炎的发病特点。慢性肾小球肾炎患者可有肾功能减退症状出现。

41. 应用强的松治疗肾病综合征，成功的关键是

- A. 加用利尿剂
- B. 激素初用剂量大，疗程长，停药需慢
- C. 合用血管紧张素转换酶抑制剂类药物
- D. 合用抗生素
- E. 合用环磷酰胺

【正确答案】B

【答案解析】考点：激素的使用原则。激素的使用原则：起始足量，缓慢减药，长期维持。

42. 慢性肾衰竭中医证型之阴阳两虚证治宜选用

- A. 附子理中丸合五苓散
- B. 济生肾气丸合真武汤
- C. 全鹿丸
- D. 济川煎
- E. 六味地黄丸

【正确答案】C

【答案解析】慢性肾衰竭中医证型之阴阳两虚证治宜温扶元阳，补益真阴，选用金匱肾气丸或全鹿丸加减。

43. 支气管哮喘发作时 X 线表现是

- A. 肺纹理增多
- B. 可见两肺透亮度增加
- C. 患侧透亮度增强，肺纹理消失
- D. 左心大，肺瘀血征
- E. 肺纹理增多及炎症浸润影

【正确答案】B

【答案解析】考点：支气管哮喘的实验室检查。支气管哮喘患者胸部 X 线检查早期在哮喘发作时可见两肺透亮度增加，呈过度通气状态；在缓解期多无明显异常。如并发呼吸道感染，可见肺纹理增加及炎性浸润阴影。

44. 低钾血症的表现不包括

- A. 肌无力
- B. 频发室性期前收缩
- C. 血气分析 pH 低于正常
- D. 代谢性碱中毒
- E. 嗜睡

【正确答案】C

【答案解析】考点：水、电解质代谢和酸碱平衡失常。缺钾性低钾血症主要表现有：（1）骨骼肌表现（疲乏、软弱、乏力、腱反射减弱或消失、呼吸困难、吞咽困难等）；（2）消

化系统表现（恶心、呕吐、厌食、腹胀、便秘、肠蠕动减弱或消失、肠麻痹等）；（3）中枢神经系统表现（萎靡不振、反应迟钝、定向力障碍、嗜睡或昏迷）；（4）循环系统表现（心动过速，可有房性、室性期前收缩；低钾性心肌）。

45. 治疗心绞痛之心肾阳虚证选用的方剂是

- A. 安宫牛黄丸
- B. 参附汤
- C. 苏合香丸
- D. 清开灵(静脉滴注)
- E. 安神丸

【正确答案】B

【答案解析】心绞痛之心肾阳虚证治宜益气壮阳，温络止痛，选用参附汤合右归丸加减。

46. 糖尿病酮症酸中毒的临床特点是

- A. 呼吸浅慢，不规则
- B. 呼吸困难伴发绀
- C. 呼吸深快，呼气有烂苹果味
- D. 呼吸浅快，呼气有大蒜味
- E. 潮式呼吸

【正确答案】C

【答案解析】早期三多一少症状加重；酸中毒失代偿后，病情迅速恶化，疲乏、食欲减退、恶心呕吐，多尿、口干、头痛、嗜睡，呼吸深快，呼气中有烂苹果味（丙酮）；后期严重失水，尿量减少、眼眶下陷、皮肤黏膜干燥，血压下降、心率加快，四肢厥冷；晚期不同程度意识障碍，反射迟钝、消失，昏迷。感染等诱因引起的临床表现可被DKA的表现所掩盖。少数患者表现为腹痛，酷似急腹症。

47. 甲状腺功能亢进症气滞痰凝证选用的方剂是

- A. 逍遥散合二陈汤
- B. 天王补心丹
- C. 知柏地黄丸
- D. 生脉散
- E. 龙胆泻肝汤

【正确答案】A

【答案解析】考点：甲状腺功能亢进症。甲状腺功能亢进症气滞痰凝证，选用逍遥散合二陈汤加减；B项用治阴虚火旺证；C项不用于治疗甲亢；D项治甲亢气阴两虚证；E项治甲亢肝火旺盛证。

48. 白细胞减少症与粒细胞缺乏症中医证型之外感温热证的治疗方药是

- A. 归脾汤加减
- B. 黄芪建中汤合右归丸加减
- C. 生脉散加减
- D. 六味地黄丸加减

E. 犀角地黄汤合玉女煎加减

【正确答案】E

【答案解析】白细胞减少症与粒细胞缺乏症中医证型之外感温热证治宜清热解毒，滋阴凉血，选用犀角地黄汤合玉女煎加减。

49. 下列各项体征不在右心衰竭时出现的是

- A. 肝脏肿大
- B. 水肿
- C. 腹水
- D. 腹泻
- E. 紫绀

【正确答案】D

【答案解析】右心衰竭体征有周围性发绀，颈静脉怒张，心率增快，可出现心律失常，可闻及三尖瓣区舒张期杂音。肝大且有压痛，肝-颈静脉反流征阳性，下肢水肿，重者可有腹水。少数患者可出现肺水肿及全心衰竭的体征。

50. 慢性咳嗽、咳痰，喘息、胸闷，呼吸困难，伴桶状胸多属

- A. 慢性肺源性心脏病
- B. 肺结核
- C. 慢性阻塞性肺疾病
- D. 支气管哮喘
- E. 肺炎

【正确答案】C

【答案解析】慢性阻塞性肺疾病常见症状为慢性咳嗽、咳痰、气短或呼吸困难、喘息、胸闷，视诊可见桶状胸。

51. 关于肺结核的中医病因，说法不正确的是

- A. 瘵虫袭肺是发病不可缺少的外因
- B. 基本病理以阴虚为主，并可导致气阴两虚，甚则阴损及阳
- C. 肺癆的外因是“瘵虫”袭肺，内因为正气虚弱
- D. 正虚是发病的基础，是引起发病的主要内因
- E. 内外因素可以互为因果，但以“瘵虫”袭肺为发病关键

【正确答案】E

【答案解析】肺结核的中医病因病机：肺癆的致病因素主要有两个方面，一为外因感染，“瘵虫”袭肺；一为内伤体虚，气血不足，阴精耗损二者相互为因，“瘵虫”袭肺是发病不可缺少的外因，正虚是发病的基础，是引起发病的主要内因。本病病变部位主要在肺，与脾肾两脏的关系最为密切，同时也可涉及心肝。基本病理以阴虚为主，并可导致气阴两虚，甚则阴损及阳。

52. 心力衰竭的临床分型依据不包括

- A. 心力衰竭发生的时间
- B. 心室舒缩功能障碍的不同

- C. 心力衰竭发生的缓急
- D. 心排血量的高低
- E. 心力衰竭发生的部位

【正确答案】A

【答案解析】心力衰竭临床分型：（1）根据心力衰竭发生的缓急分为急性心力衰竭和慢性心力衰竭；（2）根据心力衰竭的主要部位分为左心衰竭、右心衰竭和全心衰竭；（3）根据心室舒缩功能障碍不同分为收缩性心力衰竭和舒张性心力衰竭；（4）根据心排血量的量分为低排血量性心力衰竭和高排血量性心力衰竭。

53. 下列不属类风湿关节炎的关节表现的是

- A. 晨僵
- B. 疼痛
- C. 肿胀
- D. 关节畸形
- E. 类风湿结节

【正确答案】E

【答案解析】类风湿关节炎的关节表现包括：晨僵、疼痛、肿胀、关节畸形、关节功能障碍。类风湿结节为类风湿关节炎的关节外表现。

54. 下列对癫痫持续发作有诊断意义的是

- A. 长期用药抽搐仍经常发作
- B. 全面性强直-阵挛发作频繁出现，间歇期仍意识不清
- C. 连续单纯部分发作
- D. 复杂部分性发作持续数天
- E. 两侧肢体间断抽搐

【正确答案】B

【答案解析】考点：癫痫持续状态的概念。

癫痫持续发作或癫痫状态，是指1次癫痫发作持续30分钟以上，或连续多次发作，发作期间意识或神经功能未恢复至正常水平，病人始终处于昏迷状态，随反复发作而间歇期越来越短，体温升高，昏迷加深。

55. 脑出血疑诊病例的首选检查是

- A. 脑脊液检查
- B. CT检查
- C. 脑血管造影检查
- D. MRI检查
- E. 以上均非

【正确答案】B

【答案解析】CT检查是诊断脑出血安全有效的方法，为临床上脑出血疑诊病例的首选检查；可显示水肿的部位、大小，是否有占位效应，是否破入脑室、蛛网膜下腔，周围脑组织受损情况，及有无梗阻性脑积水等，故对脑出血确诊和指导治疗均有肯定意义。

56. 感冒的主要发病季节是

- A. 夏秋
- B. 春夏
- C. 冬春
- D. 秋冬
- E. 春秋

【正确答案】C

【答案解析】考点：感冒的发病季节。感冒四季均可发生，尤以春冬两季为多。

57. 治疗湿热内蕴型肾病综合征的首选方剂是

- A. 实脾饮
- B. 真武汤
- C. 疏凿饮子
- D. 越婢加术汤
- E. 济生肾气丸

【正确答案】C

【答案解析】肾病综合征之湿热内蕴证证候：浮肿明显，肌肤绷急，腹大胀满，胸闷烦热，口苦，口干，大便干结，小便短赤，舌红苔黄腻，脉沉数或濡数。治法：清热利湿，利水消肿。方药：疏凿饮子加减。

58. 氰化物中毒呼出的气味为

- A. 酒味
- B. 蒜味
- C. 苯酚味
- D. 尿素味
- E. 苦杏仁味

【正确答案】E

【答案解析】蒜臭味：有机磷农药；苦杏仁味：氰化物。

59. 以下病因中，与肝硬化无明显关系的是

- A. 酒食不节
- B. 情志失调
- C. 感染血吸虫
- D. 黄疸、积聚日久
- E. 感受外邪

【正确答案】E

【答案解析】肝硬化：中医学认为，本病的形成多由酒食不节、情志失调、感染血吸虫、黄疸积聚等病迁延日久，引起肝、脾、肾亏损，气滞、血瘀、湿阻腹中所致。

60. 慢性心力衰竭中，用养心汤合补肺汤治疗的证型是

- A. 心肺气虚证
- B. 气阴亏虚证

- C. 气虚血瘀证
- D. 阳虚饮停证
- E. 心肾阳虚证

【正确答案】A

【答案解析】慢性心力衰竭心肺气虚证。证候：心悸，气短，肢倦乏力，动则加剧，神疲咳嗽，面色苍白，舌淡或边有齿痕，脉沉细或虚数。治法：补益心肺。方药：养心汤合补肺汤加减。

61. 国务院卫生行政部门建立重大、紧急疫情的

- A. 制定行政区域应急预案
- B. 预防控制体系
- C. 信息报告系统
- D. 监测与预警系统
- E. 制定全国突发事件应急预案

【正确答案】C

【答案解析】国家建立突发事件应急报告制度国务院卫生行政主管部门制定突发事件应急报告规范，建立重大、紧急疫情信息报告系统。

62. 由国务院发布的卫生行政管理方面的规范性文件称为

- A. 行政法
- B. 卫生法律
- C. 卫生规章
- D. 基本法律
- E. 卫生行政法规

【正确答案】E

【答案解析】卫生行政法规：卫生方面的行政法规发布有两种形式，一种是由国务院直接发布；另一种是经国务院批准，由卫生部单独或者与有关部门联合发布。

63. 药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符合的，属于

- A. 劣药
- B. 假药
- C. 仿制药品
- D. 特殊药品
- E. 残次药品

【正确答案】B

【答案解析】《药品管理法》中规定：“药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符合的，为假药”。

64. 下列哪项属于行政处罚

- A. 降级
- B. 撤职
- C. 罚款

- D. 赔偿损失
- E. 赔礼道歉

【正确答案】C

【答案解析】行政处罚的种类主要有警告、罚款、没收非法财物、没收违法所得、责令停产停业、暂扣或吊销有关许可证等。

65. 属于乙类传染病，但采取甲类传染病的预防和控制措施的是

- A. 鼠疫
- B. 霍乱
- C. 艾滋病
- D. 病毒性肝炎
- E. 人感染高致病性禽流感

【正确答案】E

【答案解析】对乙类传染病中传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感，采取本法所称甲类传染病的预防、控制措施。其他乙类传染病和突发原因不明的传染病需要采取本法所称甲类传染病的预防、控制措施的，由国务院卫生行政部门及时报经国务院批准后予以公布、实施。

66. 具有高等学校医学专业本科以上学历，需在执业医师指导下在医疗机构中试用期满几年方有资格参加执业医师考试

- A. 半年
- B. 1年
- C. 2年
- D. 3年
- E. 5年

【正确答案】B

【答案解析】具有下列条件之一的，可以参加执业医师资格考试：（1）具有高等学校医学专业本科以上学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的；（2）取得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历，在医疗、预防、保健机构中工作满二年的；（3）具有中等专业学校医学专业学历，在医疗、预防、保健机构中工作满五年的；（4）以师承方式学习传统医学满三年或者经多年实践医术确有专长的，经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐。

67. 患者，男，25岁，午后潮热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，苔少，脉细数。该患者所选方药是

- A. 清骨散
- B. 归脾汤
- C. 补中益气汤
- D. 金匱肾气丸
- E. 丹梔逍遥散

【正确答案】A

【答案解析】根据患者的症状可以判断属于内伤发热的阴虚发热证。阴虚发热证。证候：午后潮热，或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，或有裂纹，苔少甚至无苔，脉细数。治法：滋阴清热。方药：清骨散加减。

68. 患者，男，30岁，吐血鲜红，口苦目赤，胸胁胀痛，心烦易怒，有黄疸，舌红苔黄，脉弦数。应选用的方药是

- A. 泻心汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 归脾汤
- D. 独参汤
- E. 四味回阳饮

【正确答案】B

【答案解析】患者属于上消化道出血的肝火犯胃证。证候：吐血鲜红或紫暗，口苦目赤，胸胁胀痛，心烦易怒，或有黄疸，舌红苔黄，脉弦数。治法：泻肝清胃，降逆止血。方药：龙胆泻肝汤加减。

69. 患者，女，50岁，日渐消瘦，胸部压痛剧烈，咳嗽而且是刺激性干咳，声音嘶哑，大致可推断患者属于

- A. 支原体肺炎
- B. 军团菌肺炎
- C. 肺结核
- D. 原发性支气管肺癌
- E. 克雷白杆菌肺炎

【正确答案】D

【答案解析】根据患者的症状，日渐消瘦，胸部压痛剧烈，刺激性咳嗽等都属于原发性支气管肺癌的症状，所以本题选择D项。

70. 患者，女，50岁，有高血压病史，头晕头痛，困倦乏力，胸闷，腹胀痞满，少食多寐，呕吐痰涎，肢体沉重，舌胖苔腻，脉濡滑，该患者应选用的方药是

- A. 血府逐瘀汤
- B. 天麻钩藤饮
- C. 杞菊地黄丸
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 济生肾气丸

【正确答案】D

【答案解析】患者属于高血压病痰湿内盛证。证候：头晕头痛，头重如裹，困倦乏力，胸闷，腹胀痞满，少食多寐，呕吐痰涎，肢体沉重，舌胖苔腻，脉濡滑。治法：祛痰降浊。方药：半夏白术天麻汤加减。

71. 患者，男，26岁，突发咳嗽，咳痰黄稠，进而咳铁锈色痰，呼吸气促，高热不退，胸膈痞满，按之疼痛，口渴烦躁，小便黄赤，大便干燥，舌红苔黄，脉洪数。诊断为肺炎链球菌肺炎。其中医治法是

- A. 解表散寒，清泄里热
- B. 疏风清热，宣肺止咳
- C. 清热化痰，宽胸止咳
- D. 清热解毒，化痰开窍
- E. 益气养阴，润肺化痰

【正确答案】C

【答案解析】患者突发咳嗽，咳痰黄稠，呼吸气促，高热不退，口渴烦躁，小便黄赤，大便干燥，舌红苔黄，症状提示患者为痰热壅肺型肺炎，故治法以清热化痰，宽胸止咳。

72. 张某，女，45岁，因胃脘痞闷不适3月就诊，患者近3月来经常脘腹痞闷，重时满闷如塞，但不疼痛，饮食减少，恶心嗳气，大便不爽，喜长叹息，有时心烦易怒，胸胁胀满，每因生气恼怒而使症状加重，苔薄白，脉弦。治宜选用

- A. 保和丸加减
- B. 补中益气汤加减
- C. 泻心汤合连朴饮加减
- D. 二陈汤加减
- E. 越鞠丸合枳术丸加减

【正确答案】E

【答案解析】实痞肝胃不和证。证候：脘腹痞闷，胸胁胀满，心烦易怒，善太息，呕恶嗳气，或吐苦水，大便不爽，舌质淡红，苔薄白，脉弦。治法：疏肝解郁，和胃消痞。方药：越鞠丸合枳术丸加减。

73. 患者，男，42岁，诊断为鼓胀之阳虚水盛证，选用的治法为

- A. 温补脾肾，化气利水
- B. 活血化瘀，行气利水
- C. 清热利湿，攻下逐水
- D. 温中健脾，行气利水
- E. 疏肝理气，运脾利湿

【正确答案】A

【答案解析】鼓胀之阳虚水盛证，证候：腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色苍黄，或呈（白光）白，脘闷纳呆，神倦怯寒，肢冷浮肿，小便短少不利，舌体胖，质紫，苔淡白，脉沉细无力。治法：温补脾肾，化气利水。方药：附子理苓汤或济生肾气丸加减。

74. 患者男性，58岁。心前区压榨样疼痛12小时，伴冷汗、气促，不能平卧，血压90/75mmHg，心率140次/分，心尖区舒张期奔马律，两肺布满湿啰音，心电图示急性前壁心梗。治疗应首选的措施是

- A. 抗生素
- B. 糖皮质激素
- C. 硝酸甘油
- D. 补足血容量
- E. 西地兰

【正确答案】E

【答案解析】西地兰为快速强心药，能加强心肌收缩，减慢心率与传导，是治疗急性心梗的抢救药物。

75. 患者，女，43岁。小便不畅，少腹胀满疼痛，小便灼热刺痛，有时可见血尿，烦躁易怒，口苦口黏，胸胁苦满，舌质暗红，可见瘀点，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 八正散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 无比山药丸
- D. 知柏地黄丸
- E. 补中益气汤

【正确答案】B

【答案解析】根据患者的症状可以判断是淋证的肝胆郁热证，治宜疏肝理气，清热通淋。选用丹栀逍遥散合石苇散加减。

76. 患者，女性，32岁，患功能性子宫出血多年，就诊时面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，毛发干脱，爪甲脆脆，舌淡胖，苔薄，脉濡细。血常规检查血红蛋白98g/L，血清铁浓度为7.9 $\mu\text{mol/L}$ ，骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失，铁粒幼红细胞为12%。应首先考虑的病证结合诊断是

- A. 缺铁性贫血，心脾两虚证
- B. 再生障碍性贫血，脾胃虚弱证
- C. 缺铁性贫血，脾胃虚弱证
- D. 肾性贫血，脾肾阳虚证
- E. 再生障碍性贫血，脾肾阳虚证

【正确答案】A

【答案解析】根据题干可以判断患者为缺铁性贫血，心脾两虚证，治宜益气补血，养心安神。选用归脾汤或八珍汤加减。

77. 男性患者，38岁，胃热隐痛，口舌干燥，五心烦热，渴欲含漱，嘈杂干呕，大便干燥，舌红无苔，舌裂纹少津，脉细数，治宜选用

- A. 柴胡疏肝散加减
- B. 一贯煎合芍药甘草汤加减
- C. 保和丸加减
- D. 黄芪建中汤
- E. 失笑散合丹参饮加减

【正确答案】B

【答案解析】根据患者的症状可以判断属于急性胃炎的胃阴不足证，所以本题选择B项。

78. 女性患者，63岁，糖尿病史7年，服格列本脲血糖控制在8.6~9.6 mmol/L 之间。近3天发热，尿频、尿痛、尿急，昨天出现昏迷，查空腹血糖22.0 mmol/L ，血尿素氮7.08 mmol/L ，尿糖+++，尿酮++。应诊断为

- A. 乳酸中毒昏迷
- B. 低血糖昏迷

- C. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- D. 糖尿病酮症酸中毒
- E. 脑血管意外

【正确答案】D

【答案解析】结合题干分析，患者空腹血糖高，尿糖尿酮体阳性，且出现昏迷，考虑为糖尿病酮症酸中毒。

79. 患者，男，56岁。风湿性心脏病20年。现喘促气急，痰涎上涌，咳嗽，咯粉红色泡沫痰，颜面灰白，口唇青紫，汗出肢冷，烦躁不安，舌质暗红，苔白腻，脉细促。治疗方剂是
- A. 真武汤合葶苈大枣泻肺汤
 - B. 独参汤合桃仁红花煎
 - C. 参附汤合五苓散
 - D. 炙甘草汤
 - E. 参附汤

【正确答案】A

【答案解析】患者为风湿性心脏病之阳虚水泛证，治宜温肾助阳、泻肺行水，选用真武汤合葶苈大枣泻肺汤加減。

80. 男性患者，31岁。热病后突然出现肢体软弱无力，皮肤枯燥，心烦口渴，咳呛少痰，咽干不利，小便黄少，大便干燥，舌质红，苔黄，脉细数。其中医治法是
- A. 补益肝肾，滋阴清热
 - B. 清热润燥，补益肝肾
 - C. 清热利湿，通利筋脉
 - D. 清热润燥，养肺生津
 - E. 补脾益气，健运升清

【正确答案】D

【答案解析】该患者为痿证之肺热津伤，筋失濡润证，治宜清热润燥、养肺生津，选用清燥救肺汤加減。

81. 患者，女，22岁。半个月前出现发热，热势或低或高，常在劳累后发作，倦怠乏力，气短懒言，自汗，易于感冒，食少便溏，舌质淡，苔薄白，脉细弱。治疗应选用的方剂是
- A. 丹栀逍遥散
 - B. 归脾汤
 - C. 清骨散
 - D. 金匱肾气丸
 - E. 补中益气汤

【正确答案】E

【答案解析】经分析患者为内伤发热之气虚发热证，治宜益气健脾，甘温除热，选用补中益气汤加減。

82. 患者，男，35岁。体检时发现蛋白尿，24小时定量为1.5g，下肢轻度浮肿，血压150/95mmHg，血肌酐未见明显增高。最可能的诊断是

- A. 肾病综合征
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 慢性肾功能衰竭

【正确答案】D

【答案解析】考点：慢性肾小球肾炎的诊断：1.起病缓慢，病情迁延，临床表现可轻可重，或时轻时重。随着病情发展，可有肾功能减退、贫血、电解质紊乱等情况的出现。2.有水肿、高血压、蛋白尿、血尿及管型尿等表现中的一种（如血尿或蛋白尿）或数种。临床表现多种多样，有时可伴有肾病综合征或重度高血压。③病程中可有肾炎急性发作，常因感染（如呼吸道感染）诱发，发作时有类似急性肾炎的表现。可自动缓解或病情加重。

83. 患者，男，30岁，煤气中毒，经过积极抢救后苏醒，2天后又出现神志不清，右侧肢体偏瘫，体温、血压正常，两肺呼吸音粗。进一步治疗首选为

- A. 维生素E输注
- B. 脑营养物质
- C. 高压氧舱
- D. 地塞米松输注
- E. 甘露醇输注

【正确答案】C

【答案解析】高压氧治疗可增加脑组织供氧，清除自由基水平，提高脑组织氧张力，并具有抗脑水肿、提高红细胞变形能力、控制血小板聚集率、降低血黏度和减弱脑血栓形成等作用。

84. 患者，男，58岁，腰部弛痛，痛处伴有热感，暑湿阴雨天加重，活动后或可减轻，小便短赤，苔黄腻，脉濡数。其中医证型是

- A. 肾阴虚腰痛证
- B. 肾阳虚腰痛证
- C. 寒湿腰痛证
- D. 瘀血腰痛证
- E. 湿热腰痛证

【正确答案】E

【答案解析】患者为腰痛之湿热腰痛证，治宜清热利湿，舒筋止痛，选用四妙丸加减。

85. 患者，男，56岁，眩晕，头痛，兼见健忘，失眠，心悸，精神不振，耳鸣耳聋，面唇紫暗，舌暗有瘀斑，脉涩，选用的治法为

- A. 平肝潜阳，清火息风
- B. 补益气血，调养心脾
- C. 滋养肝肾，益精填髓
- D. 化痰祛湿，健脾和胃
- E. 祛瘀生新，活血通窍

【正确答案】E

【答案解析】眩晕瘀血阻窍证证候：眩晕，头痛，兼见健忘，失眠，心悸，精神不振，耳鸣耳聋，面唇紫暗，舌暗有瘀斑，脉涩或细涩。治法：祛瘀生新，活血通窍。方药：通窍活血汤加减。

86. 患者，男，40岁，心悸、胸闷、头晕、乏力，心电图显示为室上性心动过速。现症见心悸时发时止，胸闷烦躁，失眠多梦，口干口苦，大便秘结，小便黄赤，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑。考虑是

- A. 心神不宁证
- B. 气血不足证
- C. 阴虚火旺证
- D. 气阴两虚证
- E. 痰火扰心证

【正确答案】E

【答案解析】根据患者的表现，考虑为心悸之痰火扰心证。证候：心悸时发时止，胸闷烦躁，失眠多梦，口干口苦，大便秘结，小便黄赤，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑。治法：清热化痰，宁心安神。方药：黄连温胆汤加减。

87. 患者，男，62岁，胃脘嘈杂灼热，痞满吞酸，食后痛胀，口干喜冷饮，五心烦热，便结尿赤，舌质红绛，舌苔黄糙，脉细数。X线钡餐检查：胃小弯部有凸入胃腔内的充盈缺损。应用制酸药物症状不缓解。对该患者采用的中医治法为

- A. 理气化痰，消食散结
- B. 疏肝和胃，降逆止痛
- C. 温中散寒，健脾益气
- D. 清热和胃，养阴润燥
- E. 理气活血，软坚消积

【正确答案】D

【答案解析】根据患者的症状以及实验室检查可知，该患者为胃癌之胃热伤阴证，治法：清热和胃，养阴润燥；方药：玉女煎加减。

88. 患者男性，56岁，心脏骤停后出现心室颤动，给予2次除颤加CPR及肾上腺素之后仍然是室颤，应首选的治疗药物是

- A. 安定
- B. 阿托品
- C. 洋地黄
- D. 利多卡因
- E. 胺碘酮

【正确答案】D

【答案解析】给予2~3次除颤加CPR及肾上腺素之后仍然是室颤/无脉室速，给予利多卡因，1~1.5mg/kg静脉注射，如无效可每3~5分钟重复1次，总剂量可达到3mg/kg。

89. 患者，男，48岁。西医诊断为原发性支气管肺癌，现症见胸背部隐隐作痛，咳声低弱，神疲乏力，五心烦热，自汗盗汗；舌质红，苔少，脉沉细数。根据患者症状此病辨证为（）

- A. 气滞血瘀证
- B. 脾虚痰湿证
- C. 阴虚内热证
- D. 热毒炽盛证
- E. 气阴两虚证

【正确答案】 E

【答案解析】 原发性支气管肺癌之气阴两虚证。证候：胸背部隐隐作痛，咳声低弱，神疲乏力，五心烦热，自汗盗汗；舌质红，苔少，脉沉细数。治法：益气养阴，清肺解毒。方药：沙参麦冬汤加减，或四君子汤合清燥救肺汤化裁。

90. 患者，男，48岁。西医诊断为原发性支气管肺癌，现症见胸背部隐隐作痛，咳声低弱，神疲乏力，五心烦热，自汗盗汗；舌质红，苔少，脉沉细数。治疗时采用的治法为

- A. 清热泻火，解毒散肿
- B. 益气养阴，清肺解毒
- C. 健脾除湿，化痰散结
- D. 养阴清热，软坚散结
- E. 行气化痰，软坚散结

【正确答案】 B

【答案解析】 原发性支气管肺癌之气阴两虚证。证候：胸背部隐隐作痛，咳声低弱，神疲乏力，五心烦热，自汗盗汗；舌质红，苔少，脉沉细数。治法：益气养阴，清肺解毒。方药：沙参麦冬汤加减，或四君子汤合清燥救肺汤化裁。

91. 患者，男，48岁。西医诊断为原发性支气管肺癌，现症见胸背部隐隐作痛，咳声低弱，神疲乏力，五心烦热，自汗盗汗；舌质红，苔少，脉沉细数。选用的方药为

- A. 沙参麦冬汤
- B. 白虎承气汤
- C. 百合固金汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 六君子汤

【正确答案】 A

【答案解析】 原发性支气管肺癌之气阴两虚证。证候：胸背部隐隐作痛，咳声低弱，神疲乏力，五心烦热，自汗盗汗；舌质红，苔少，脉沉细数。治法：益气养阴，清肺解毒。方药：沙参麦冬汤加减，或四君子汤合清燥救肺汤化裁。

92. 某男，诊断为肺结核，症见咳呛气急，痰少黏稠，时时咳血，血色鲜红，午后潮热，五心烦热，骨蒸颧红，盗汗量多，心烦失眠，性急善怒，肋肋掣痛，形日渐消瘦，舌红绛而干，苔黄，脉细数。患者症状此病辨证为

- A. 肺阴亏损证
- B. 阴虚火旺证
- C. 热毒蕴结证
- D. 气阴耗伤证
- E. 湿热瘀阻证

【正确答案】B

【答案解析】肺结核之阴虚火旺证。证候：咳呛气急，痰少黏稠或吐少量黄痰，时时咳血，血色鲜红，午后潮热，五心烦热，骨蒸颧红，盗汗量多，心烦失眠，性急善怒，肋肋掣痛，男子梦遗失精，女子月经不调，形体日渐消瘦，舌红绛而干，苔黄或剥，脉细数。治法：滋阴降火。方药：百合固金汤合秦艽鳖甲散加减。

93. 某男，诊断为肺结核，症见咳呛气急，痰少黏稠，时时咳血，血色鲜红，午后潮热，五心烦热，骨蒸颧红，盗汗量多，心烦失眠，性急善怒，肋肋掣痛，形日渐消瘦，舌红绛而干，苔黄，脉细数。治法宜选

- A. 滋阴降火
- B. 益气养阴
- C. 滋阴补阳
- D. 滋阴润肺
- E. 化痰止咳

【正确答案】A

【答案解析】肺结核之阴虚火旺证。证候：咳呛气急，痰少黏稠或吐少量黄痰，时时咳血，血色鲜红，午后潮热，五心烦热，骨蒸颧红，盗汗量多，心烦失眠，性急善怒，肋肋掣痛，男子梦遗失精，女子月经不调，形体日渐消瘦，舌红绛而干，苔黄或剥，脉细数。治法：滋阴降火。方药：百合固金汤合秦艽鳖甲散加减。

94. 某男，诊断为肺结核，症见咳呛气急，痰少黏稠，时时咳血，血色鲜红，午后潮热，五心烦热，骨蒸颧红，盗汗量多，心烦失眠，性急善怒，肋肋掣痛，形日渐消瘦，舌红绛而干，苔黄，脉细数。治疗采用的代表方为

- A. 百合固金汤
- B. 月华丸
- C. 参苓白术散
- D. 保真汤
- E. 百合固金汤合秦艽鳖甲散

【正确答案】E

【答案解析】肺结核之阴虚火旺证。证候：咳呛气急，痰少黏稠或吐少量黄痰，时时咳血，血色鲜红，午后潮热，五心烦热，骨蒸颧红，盗汗量多，心烦失眠，性急善怒，肋肋掣痛，男子梦遗失精，女子月经不调，形体日渐消瘦，舌红绛而干，苔黄或剥，脉细数。治法：滋阴降火。方药：百合固金汤合秦艽鳖甲散加减。

95. 患者，女，素有哮喘，与同事争吵时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如室，但喉中痰鸣不著，或无痰声。平素常多忧思抑郁，失眠，心悸。苔薄，脉弦。诊断为喘证。根据患者症状此病辨证为

- A. 风寒壅肺证
- B. 表寒肺热证
- C. 痰热郁肺证
- D. 痰浊阻肺证
- E. 肺气郁痹证

【正确答案】E

【答案解析】患者为喘证之肺气郁痹证。证候：每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如室，但喉中痰鸣不著，或无痰声。平素常多忧思抑郁，失眠，心悸。苔薄，脉弦。治法：开郁降气平喘。方药：五磨饮子加减。

96. 患者，女，素有哮喘，与同事争吵时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如室，但喉中痰鸣不著，或无痰声。平素常多忧思抑郁，失眠，心悸。苔薄，脉弦。诊断为喘证。其中医治法是

- A. 开郁降气平喘
- B. 祛痰降逆，宣肺平喘
- C. 清热化痰，宣肺平喘
- D. 宣肺散寒
- E. 解表清里，化痰平喘

【正确答案】A

【答案解析】患者为喘证之肺气郁痹证。证候：每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如室，但喉中痰鸣不著，或无痰声。平素常多忧思抑郁，失眠，心悸。苔薄，脉弦。治法：开郁降气平喘。方药：五磨饮子加减。

97. 患者，女，素有哮喘，与同事争吵时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如室，但喉中痰鸣不著，或无痰声。平素常多忧思抑郁，失眠，心悸。苔薄，脉弦。诊断为喘证。应选用的方药是

- A. 麻杏石甘汤加减
- B. 桑白皮汤加减
- C. 麻黄汤合华盖散加减
- D. 二陈汤合三子养亲汤加减
- E. 五磨饮子加减

【正确答案】E

【答案解析】患者为喘证之肺气郁痹证。证候：每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如室，但喉中痰鸣不著，或无痰声。平素常多忧思抑郁，失眠，心悸。苔薄，脉弦。治法：开郁降气平喘。方药：五磨饮子加减。

98. 患者顾某，患粒细胞缺乏症，1周前外感后发热，服用退烧药无明显好转。现发热不退，口渴欲饮，面赤咽痛，头晕乏力，舌质红绛，苔黄，脉滑数。根据患者症状此病辨证为

- A. 寒凝血脉证
- B. 血瘀络证
- C. 脾肾阳虚证
- D. 外感温热证
- E. 湿热瘀阻证

【正确答案】D

【答案解析】患者患粒细胞缺乏症，应为外感温热证。证候：发热不退，口渴欲饮，面赤咽痛，头晕乏力，舌质红绛，苔黄，脉滑数或细数。治法：清热解毒，滋阴凉血。方药：犀角地黄汤合玉女煎加减。

99. 患者顾某，患粒细胞缺乏症，1周前外感后发热，服用退烧药无明显好转。现发热不退，口渴欲饮，面赤咽痛，头晕乏力，舌质红绛，苔黄，脉滑数。治疗时采用的治法为

- A. 清热养血，利湿止痛
- B. 活血化瘀，通络止痛
- C. 益气养阴，养血通经
- D. 清热解毒，滋阴凉血
- E. 温阳通脉，祛寒化湿

【正确答案】D

【答案解析】患者患粒细胞缺乏症，应为外感温热证。证候：发热不退，口渴欲饮，面赤咽痛，头晕乏力，舌质红绛，苔黄，脉滑数或细数。治法：清热解毒，滋阴凉血。方药：犀角地黄汤合玉女煎加减。

100. 患者顾某，患粒细胞缺乏症，1周前外感后发热，服用退烧药无明显好转。现发热不退，口渴欲饮，面赤咽痛，头晕乏力，舌质红绛，苔黄，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 黄芪建中汤
- B. 麻黄汤
- C. 银翘散
- D. 生脉散
- E. 犀角地黄汤

【正确答案】E

【答案解析】患者患粒细胞缺乏症，应为外感温热证。证候：发热不退，口渴欲饮，面赤咽痛，头晕乏力，舌质红绛，苔黄，脉滑数或细数。治法：清热解毒，滋阴凉血。方药：犀角地黄汤合玉女煎加减。

101. 缺铁性贫血患者，女，36岁。表现为面色萎黄，口唇色淡，爪甲无泽，神疲乏力，食少便溏，恶心呕吐，舌质淡，苔薄腻，脉细弱。中医治法是

- A. 益气补血，养心安神
- B. 健脾和胃，益气养血
- C. 温补脾肾
- D. 杀虫消积
- E. 补益气血

【正确答案】B

【答案解析】属脾胃虚弱证。证候：面色萎黄，口唇色淡，爪甲无泽，神疲乏力，食少便溏，恶心呕吐，舌质淡，苔薄腻，脉细弱。治法：健脾和胃，益气养血。方药：香砂六君子汤合当归补血汤加减。

102. 缺铁性贫血患者，女，36岁。表现为面色萎黄，口唇色淡，爪甲无泽，神疲乏力，食少便溏，恶心呕吐，舌质淡，苔薄腻，脉细弱。首选方药是

- A. 香砂六君子汤合当归补血汤
- B. 归脾汤
- C. 八珍汤

- D. 无比山药丸
E. 化虫丸合八珍汤

【正确答案】A

【答案解析】属脾胃虚弱证；证候：面色萎黄，口唇色淡，爪甲无泽，神疲乏力，食少便溏，恶心呕吐，舌质淡，苔薄腻，脉细弱。治法：健脾和胃，益气养血。方药：香砂六君子汤合当归补血汤加减。

103. 缺铁性贫血患者，女，36岁。表现为面色萎黄，口唇色淡，爪甲无泽，神疲乏力，食少便溏，恶心呕吐，舌质淡，苔薄腻，脉细弱。若日久失治，表现为面色苍白，形寒肢冷，腰膝酸软，神倦耳鸣，唇甲淡白，大便溏薄，小便清长，舌质淡，脉沉细。此时当首选的方剂是

- A. 八珍汤合无比山药丸
B. 归脾汤
C. 八珍汤
D. 化虫丸
E. 当归补血汤

【正确答案】A

【答案解析】脾肾阳虚证。证候：面色苍白，形寒肢冷，腰膝酸软，神倦耳鸣，唇甲淡白，或周身浮肿，甚则腹水，大便溏薄，小便清长，男子阳痿，女子经闭，舌质淡或有齿痕，脉沉细。治法：温补脾肾。方药：八珍汤合无比山药丸加减。

104. 患者，女，37岁。近日面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，舌淡胖，苔薄，脉濡细。查血常规提示缺铁性贫血。中医辨证是

- A. 脾胃虚弱证
B. 心脾两虚证
C. 脾肾阳虚证
D. 心气虚证
E. 心血亏虚证

【正确答案】B

【答案解析】心脾两虚证。证候：面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，毛发干脱，爪甲脆脆，舌淡胖，苔薄，脉濡细。治法：益气补血，养心安神。方药：归脾汤或八珍汤加减。

105. 患者，女，37岁。近日面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，舌淡胖，苔薄，脉濡细。查血常规提示缺铁性贫血。

中医治法是

- A. 益气补血，养心安神
B. 温补脾肾
C. 健脾和胃，益气养血
D. 补肾助阳，益气养血
E. 补益气血

【正确答案】A

【答案解析】心脾两虚证。证候：面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，毛发干脱，爪甲脆脆，舌淡胖，苔薄，脉濡细。治法：益气补血，养心安神。方药：归脾汤或八珍汤加减。

106. 患者，女，37岁。近日面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，舌淡胖，苔薄，脉濡细。查血常规提示缺铁性贫血。

治疗首选的方剂是

- A. 八珍汤合无比山药丸
- B. 归脾汤
- C. 参苓白术散
- D. 化虫丸
- E. 当归补血汤

【正确答案】B

【答案解析】心脾两虚证。证候：面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，毛发干脱，爪甲脆脆，舌淡胖，苔薄，脉濡细。治法：益气补血，养心安神。方药：归脾汤或八珍汤加减。

107. 患者，男，50岁。因消瘦、口渴、乏力2月来诊。空腹血糖9.6mmol/l，尿糖阴性。现小便频数，浑浊如膏，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，舌淡苔白，脉沉细无力。

其可能的诊断是

- A. 糖尿病
- B. 甲亢
- C. 甲减
- D. 肾性糖尿病
- E. 血脂异常

【正确答案】A

【答案解析】属糖尿病（消渴）阴阳两虚证。证候：小便频数，浑浊如膏，甚则饮一溲一，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，阳痿不举，舌淡苔白，脉沉细无力。治法：滋阴温阳，补肾固涩。方药：金匱肾气丸加减。

108. 患者，男，50岁。因消瘦、口渴、乏力2月来诊。空腹血糖9.6mmol/l，尿糖阴性。现小便频数，浑浊如膏，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，舌淡苔白，脉沉细无力。中医治法是

- A. 清热润肺，生津止渴
- B. 清胃泻火，养阴增液
- C. 益气健脾，生津止渴
- D. 滋阴温阳，补肾固涩
- E. 滋阴固肾

【正确答案】D

【答案解析】属糖尿病（消渴）阴阳两虚证。证候：小便频数，浑浊如膏，甚则饮一溲一，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，阳痿不举，舌淡苔白，脉沉细无力。治法：滋阴温阳，补肾固涩。方药：金匮肾气丸加减。

109. 患者，男，50岁。因消瘦、口渴、乏力2月来诊。空腹血糖9.6mmol/l，尿糖阴性。现小便频数，浑浊如膏，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，舌淡苔白，脉沉细无力。首选治疗方剂是

- A. 金匮肾气丸
- B. 平胃散合桃红四物汤
- C. 七味白术散
- D. 六味地黄丸
- E. 玉女煎

【正确答案】A

【答案解析】属糖尿病（消渴）阴阳两虚证。证候：小便频数，浑浊如膏，甚则饮一溲一，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，阳痿不举，舌淡苔白，脉沉细无力。治法：滋阴温阳，补肾固涩。方药：金匮肾气丸加减。

110. 属痿证之湿热浸淫，气血不运证的是

- A. 肢体痿软无力，逐渐加重，食少，便溏，腹胀，面浮不华
- B. 热病后突然出现肢体软弱无力，皮肤枯燥，心烦口渴
- C. 四肢痿软无力，伴颜面红斑赤肿，烦躁不宁
- D. 四肢痿软，身体困重，足胫热气上腾
- E. 下肢痿软无力，腰脊酸软，不能久立

【正确答案】D

【答案解析】湿热浸淫，气血不运证。证候：四肢痿软，身体困重，或麻木、微肿，尤以下肢多见，或足胫热气上腾，或有发热，胸痞脘闷，小便短赤涩痛，苔黄腻，脉细数。治法：清热利湿，通利筋脉。方药：加味二妙散加减。

111. 属痿证之脾胃亏虚，精微不运证的是

- A. 肢体痿软无力，逐渐加重，食少，便溏，腹胀，面浮不华
- B. 热病后突然出现肢体软弱无力，皮肤枯燥，心烦口渴
- C. 四肢痿软无力，伴颜面红斑赤肿，烦躁不宁
- D. 四肢痿软，身体困重，足胫热气上腾
- E. 下肢痿软无力，腰脊酸软，不能久立

【正确答案】A

【答案解析】痿证脾胃亏虚，精微不运证。证候：肢体痿软无力，逐渐加重，食少，便溏，腹胀，面浮不华，气短，神疲乏力，苔薄白，脉细。治法：补脾益气，健运升清。方药：参苓白术散加减。

112. 肾病综合征应常用的免疫调节剂是

- A. 环孢素
- B. 泼尼松

- C. 环磷酰胺
- D. 麦考酚吗乙酯
- E. 双嘧达莫

【正确答案】B

【答案解析】泼尼松是肾病综合征常用的免疫调节剂；环磷酰胺国内外最常用的细胞毒药物。主要副作用为骨髓抑制及中毒性肝损害，并可出现性腺抑制（尤其男性）、脱发、胃肠道反应及出血性膀胱炎。

113. 肾病综合征激素抵抗型最常用的细胞毒药物是

- A. 环孢素
- B. 泼尼松
- C. 环磷酰胺
- D. 麦考酚吗乙酯
- E. 双嘧达莫

【正确答案】C

【答案解析】细胞毒药物可用于激素抵抗型的患者，环磷酰胺是国内外最常用的细胞毒药物。主要副作用为骨髓抑制及中毒性肝损害，并可出现性腺抑制（尤其男性）、脱发、胃肠道反应及出血性膀胱炎。

114. 目前原发性肝癌的主要诊断指标是

- A. 甲胎蛋白
- B. 肝动脉造影
- C. 肝穿刺活检
- D. 磁共振检查
- E. B超检查

【正确答案】A

【答案解析】甲胎蛋白（AFP）目前仍是原发性肝癌特异性的标记物和主要诊断指标，现已广泛用于肝细胞癌的普查、诊断、疗效判断和预测复发。

115. 目前肝癌筛查的首选检查方法是

- A. 甲胎蛋白
- B. 肝动脉造影
- C. 肝穿刺活检
- D. 磁共振检查
- E. B超检查

【正确答案】E

【答案解析】B型超声显像是目前肝癌筛查的首选检查方法。

116. 久病尿血，甚或兼见齿衄、肌衄，食少，体倦乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉细弱属

- A. 脾不统血证
- B. 肾气不固证

- C. 血热妄行证
- D. 阴虚火旺证
- E. 气不摄血证

【正确答案】A

【答案解析】久病尿血，甚或兼见齿衄、肌衄，食少，体倦乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉细弱为尿血之脾不统血证，治宜补中健脾，益气摄血，选用归脾汤加减。

117. 反复发生肌衄，久病不愈，神疲乏力，头晕目眩，面色苍白或萎黄，食欲不振，舌质淡，脉细弱属

- A. 脾不统血证
- B. 肾气不固证
- C. 血热妄行证
- D. 阴虚火旺证
- E. 气不摄血证

【正确答案】E

【答案解析】反复发生肌衄，久病不愈，神疲乏力，头晕目眩，面色苍白或萎黄，食欲不振，舌质淡，脉细弱属紫斑之气不摄血证，治宜补气摄血，选用归脾汤加减。

118. 治疗阳虚发热选用

- A. 补中益气汤
- B. 金匮肾气丸
- C. 丹栀逍遥散
- D. 黄连温胆汤
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】B

【答案解析】阳虚发热治宜温补阳气，引火归原，选用金匮肾气丸加减。

119. 治疗气郁发热选用

- A. 补中益气汤
- B. 金匮肾气丸
- C. 丹栀逍遥散
- D. 黄连温胆汤
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】C

【答案解析】气郁发热治宜疏肝理气，解郁泄热，选用丹栀逍遥散加减。

120. 治疗慢性肾衰竭之脾肾气虚证，选用的治法是

- A. 滋肾平肝
- B. 温补脾肾
- C. 补气健脾益肾
- D. 益气养阴，健脾补肾
- E. 温扶元阳，补益真阴

【正确答案】C

【答案解析】慢性肾衰竭之脾肾气虚证治宜补气健脾益肾，选用六君子汤加减。

121. 治疗慢性肾衰竭之脾肾阳虚证，选用的治法是

- A. 滋肾平肝
- B. 温补脾肾
- C. 补气健脾益肾
- D. 益气养阴，健脾补肾
- E. 温扶元阳，补益真阴

【正确答案】B

【答案解析】慢性肾衰竭之脾肾阳虚证治宜温补脾肾，选用济生肾气丸加减。

122. 经皮肤吸收的急性有机磷杀虫药中毒，中毒症状出现的时间是

- A. 24~48 小时
- B. 2~6 小时
- C. 1~4 分钟
- D. 10~120 分钟
- E. 14~24 分钟

【正确答案】B

【答案解析】皮肤吸收中毒，一般在接触 2~6 小时后出现症状。

123. 口服有机磷杀虫药，中毒症状出现的时间是

- A. 24~48 小时
- B. 2~6 小时
- C. 1~4 分钟
- D. 10~120 分钟
- E. 14~24 分钟

【正确答案】D

【答案解析】有机磷杀虫药口服中毒多在 10 分钟至 2 小时发病；呼吸道吸入约 30 分钟内发病。

124. 喘证正虚喘脱证的治法宜选用

- A. 解表清里，化痰平喘
- B. 清热化痰，宣肺平喘
- C. 痰浊阻肺，宣肺平喘
- D. 扶阳固脱，镇摄肾气
- E. 补肾纳气

【正确答案】D

【答案解析】正虚喘脱证。证候：喘逆剧甚，张口抬肩，鼻扇气促，端坐不能平卧，稍动则咳喘欲绝，或有痰鸣，心慌动悸，烦躁不安，面青唇紫，汗出如珠，肢冷，脉浮大无根，或见歇止，或模糊不清。治法：扶阳固脱，镇摄肾气。方药：参附汤送服黑锡丹。

125. 喘证肾虚不纳证的治法宜选用

- A. 解表清里，化痰平喘
- B. 清热化痰，宣肺平喘
- C. 痰浊阻肺，宣肺平喘
- D. 扶阳固脱，镇摄肾气
- E. 补肾纳气

【正确答案】E

【答案解析】肾虚不纳证。证候：喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，形瘦神惫，浮肿，汗出肢冷，面青唇紫，舌淡苔白或黑而润滑，脉微细或沉弱；或见喘咳，面红烦躁，口咽干燥，足冷，汗出如油，舌红少津，脉细数。治法：补肾纳气。方药：金匮肾气丸合参蛤散加减。

126. 精神抑郁，情绪不宁，胸胁胀满疼痛，脘腹胀满，咽中如物梗塞，苔腻。多属

- A. 气郁
- B. 血郁
- C. 痰郁
- D. 火郁
- E. 湿郁

【正确答案】C

【答案解析】痰郁多见精神抑郁，胸部闷塞，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，吞之不下，咯之不出，苔白腻，脉弦滑。

127. 精神抑郁，情急躁易怒，胸胁胀满，口苦而干，舌质红，苔黄。多属

- A. 气郁
- B. 血郁
- C. 痰郁
- D. 火郁
- E. 湿郁

【正确答案】D

【答案解析】火郁多见性情急躁易怒，胸胁胀满，口苦而干，或头痛，目赤，耳鸣，或嘈杂吞酸，大便秘结，舌质红，苔黄，脉弦数。

128. 患者发热，热势多为低热，头晕眼花，体倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。辨证应属

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 血虚发热证
- D. 阳虚发热证
- E. 气郁发热证

【正确答案】C

【答案解析】血虚发热证。证候：发热，热势多为低热，头晕眼花，体倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。治法：益气养血。方药：归脾汤加减。

129. 患者午后潮热，或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，或有裂纹，苔少甚至无苔，脉细数。辨证应属

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 血虚发热证
- D. 阳虚发热证
- E. 气郁发热证

【正确答案】A

【答案解析】阴虚发热证。证候：午后潮热，或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，或有裂纹，苔少甚至无苔，脉细数。治法：滋阴清热。方药：清骨散加减。

130. 过敏性紫癜性肾炎的表现是

- A. 好发于青年女性，发热，皮疹，关节痛，面部蝶形红斑
- B. 好发于青少年，皮肤紫癜，关节痛，腹痛，黑便，皮疹出现后1~4周左右出现血尿
- C. 糖尿病10年，蛋白尿
- D. 大量蛋白尿，低蛋白血症，水肿
- E. 慢性肝炎，伴蛋白尿

【正确答案】B

【答案解析】过敏性紫癜性肾炎：好发于青少年，有典型的皮肤紫癜，可伴有关节痛、腹痛及黑便，多在皮疹出现后1~4周出现血尿和/或蛋白尿。

131. 肾病综合征的表现是

- A. 好发于青年女性，发热，皮疹，关节痛，面部蝶形红斑
- B. 好发于青少年，皮肤紫癜，关节痛，腹痛，黑便，皮疹出现后1~4周左右出现血尿
- C. 糖尿病10年，蛋白尿
- D. 大量蛋白尿，低蛋白血症，水肿
- E. 慢性肝炎，伴蛋白尿

【正确答案】D

【答案解析】肾病综合征临床特征为：①大量蛋白尿（ $\geq 3.5\text{g}/24\text{h}$ ）；②低蛋白血症（ $\leq 30\text{g}/\text{L}$ ）；③水肿；④高脂血症。其中“大量蛋白尿”和“低蛋白血症”为NS的最基本的特征。

132. 消化性溃疡的直接征象是

- A. 痉挛性切迹
- B. 上腹疼痛
- C. 龛影
- D. 胃黏膜僵直
- E. 钡剂潴留

【正确答案】C

【答案解析】X线发现龛影是消化性溃疡的直接征象，有确诊价值。

133. 消化性溃疡的间接征象是

- A. 痉挛性切迹
- B. 上腹疼痛
- C. 龛影
- D. 胃黏膜僵直
- E. 钡剂潴留

【正确答案】A

【答案解析】胃大弯侧痉挛性切迹是溃疡的间接征象，仅提示可能有溃疡。

134. 瘦病阴虚火旺证，治疗应首选的方剂是

- A. 生脉散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 天王补心丹
- D. 加味逍遥散
- E. 安神定志丸

【正确答案】C

【答案解析】瘦病阴虚火旺证治宜滋阴降火，消瘦散结选用天王补心丹加减。

135. 瘦病气阴两虚证，治疗应首选的方剂是

- A. 生脉散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 天王补心丹
- D. 加味逍遥散
- E. 安神定志丸

【正确答案】A

【答案解析】瘦病气阴两虚证治宜益气养阴，消瘦散结，选用生脉散加味。

136. 震颤之气血两虚证的治法是

- A. 益气养血，息风通络
- B. 补肾养阴，柔肝息风
- C. 行气化痰，息风通络
- D. 活血化瘀，息风通络
- E. 阴阳双补，兼以息风

【正确答案】A

【答案解析】震颤之气血两虚证治宜益气养血，息风通络，选用八珍汤合天麻钩藤饮加减。

137. 震颤之肝肾阴虚证的治法是

- A. 益气养血，息风通络
- B. 补肾养阴，柔肝息风

- C. 行气化痰，息风通络
- D. 活血化瘀，息风通络
- E. 阴阳双补，兼以息风

【正确答案】B

【答案解析】震颤之肝肾阴虚证治宜补肾养阴，柔肝息风，选用大定风珠加减。

138. 尿路感染之脾肾亏虚、湿热屡犯证，治疗应选用

- A. 无比山药丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 小蓟饮子
- D. 八正散
- E. 丹栀逍遥散

【正确答案】A

【答案解析】尿路感染之脾肾亏虚、湿热屡犯证治宜健脾补肾，选用无比山药丸加减。

139. 尿路感染之肾阴不足、湿热留恋证，治疗应选用

- A. 无比山药丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 小蓟饮子
- D. 八正散
- E. 丹栀逍遥散

【正确答案】B

【答案解析】尿路感染之肾阴不足、湿热留恋证治宜滋阴益肾、清热通淋，选用知柏地黄丸加减。

140. 胁痛肝郁气滞证选用的方剂是

- A. 四神丸
- B. 一贯煎
- C. 藿香正气散
- D. 葛根芩连汤
- E. 柴胡疏肝散

【正确答案】E

【答案解析】胁痛肝郁气滞证治宜疏肝理气，选用柴胡疏肝散加减。

141. 胁痛肝络失养证选用的方剂是

- A. 四神丸
- B. 一贯煎
- C. 藿香正气散
- D. 葛根芩连汤
- E. 柴胡疏肝散

【正确答案】B

【答案解析】胁痛肝络失养证治宜养阴柔肝，选用一贯煎加减。

142. I型呼衰患者吸氧浓度应

- A. >30%
- B. <30%
- C. >35%
- D. <35%
- E. >40%

【正确答案】C

【答案解析】I型呼衰应给予较高浓度(>35%，但一般不超过40%)吸氧，使氧分压提高到7.98kPa(60mmHg)，或动脉血氧饱和度(SaO₂)在90%以上。

143. II型呼衰患者吸氧浓度应

- A. >30%
- B. <30%
- C. >35%
- D. <35%
- E. >40%

【正确答案】D

【答案解析】II型呼衰的患者应给予持续低浓度(<35%)给氧。

144. 慢性肺源性心脏病痰浊壅肺证可见

- A. 痰稠难咯
- B. 咯痰黏腻
- C. 神志恍惚
- D. 面唇青紫
- E. 声低气怯

【正确答案】B

【答案解析】慢性肺源性心脏病痰浊壅肺证证候：咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫样，短气喘息，稍劳即著，脘痞纳少，倦怠乏力，舌质偏淡，苔薄腻或浊腻，脉滑。

145. 慢性肺源性心脏病痰热郁肺证可见

- A. 痰稠难咯
- B. 咯痰黏腻
- C. 神志恍惚
- D. 面唇青紫
- E. 声低气怯

【正确答案】A

【答案解析】痰热郁肺证证候：喘息气粗，烦躁，胸满，咳嗽，痰黄或白，黏稠难咯，或身热，微恶寒，有汗不多，溲黄便干，口渴，舌红，舌苔黄或黄腻，边尖红，脉数或滑数。

146. 脑血栓形成坏死期是指

- A. 1~6 小时
- B. 6~24 小时
- C. 24~48 小时
- D. 3 天~3 周
- E. 3~4 周后

【正确答案】C

【答案解析】脑血栓形成的病理分期：超早期（1~6 小时）；急性期（6~24 小时）；坏死期（24~48 小时）；软化期（3 天~3 周）；恢复期（3~4 周后）。

147. 脑血栓形成软化期是指

- A. 1~6 小时
- B. 6~24 小时
- C. 24~48 小时
- D. 3 天~3 周
- E. 3~4 周后

【正确答案】D

【答案解析】脑血栓形成的病理分期：超早期（1~6 小时）；急性期（6~24 小时）；坏死期（24~48 小时）；软化期（3 天~3 周）；恢复期（3~4 周后）。

148. 治疗泄泻肾阳虚衰证选用

- A. 保和丸
- B. 四神丸
- C. 痛泻要方
- D. 葛根芩连汤
- E. 藿香正气散

【正确答案】B

【答案解析】泄泻肾阳虚衰证治宜温肾健脾，固涩止泻；方药选用四神丸加减。

149. 治疗泄泻肝气乘脾证选用

- A. 保和丸
- B. 四神丸
- C. 痛泻要方
- D. 葛根芩连汤
- E. 藿香正气散

【正确答案】C

【答案解析】泄泻肝气乘脾证治宜抑肝扶脾；方药选用痛泻要方加减。

150. 省级地方医学会负责组织

- A. 处理医疗事故工作
- B. 首次医疗事故技术鉴定工作
- C. 再次医疗事故技术鉴定工作

D. 申请再次鉴定

E. 医疗事故赔偿

【正确答案】C

【答案解析】《医疗事故处理条例》第二十一条规定：“设区的市级地方医学会和省、自治区、直辖市直接管辖的县（市）地方医学会负责组织首次医疗事故技术鉴定工作。省、自治区、直辖市地方医学会负责组织再次鉴定工作。”

医学教育网

www.med66.com