

医学教育网中级主管护师：《答疑周刊》2020 年第 5 期

1. 【问题】骨髓造血和肝脏造血都是胚胎 4 到 5 个月吗？

【解答】胚胎期造血：

①中胚叶造血期：从胚胎第 3 周起，在卵黄囊上形成许多血岛，其间的细胞分化为原始的血细胞，至胚胎第 6 周后造血开始减退。

②肝（脾）造血期：胚胎第 6~8 周时出现活动的造血组织，并成为胎儿中期的主要造血部位，胚胎 4~5 个月时达高峰，6 个月以后逐渐减退，至生后 4~5 天完全停止造血。脾脏在胚胎第 8 周开始造血，5 个月后逐渐停止造红细胞和粒细胞，仅保留造淋巴细胞功能。

③骨髓造血期：胚胎第 6 周开始出现骨髓，但至第 4~5 个月才开始造血活动，生后成为唯一的造血场所。

2. 【问题】PDCA 各代表什么？

【解答】PDCA 循环的护理管理的基本方法。

P 代表计划，即检查质量状况，找出存在问题，查出产生质量问题的原因，针对主要原因制订具体实施计划。

D 代表实施，即贯彻和实施预定的计划和措施。

C 代表检查，即检查预定目标执行情况。

A 代表处理，即总结经验教训，存在问题转入下一个管理循环中。

3. 【问题】高血压危象与高血压脑病的区别？

【解答】请您区分两者的表现：

(1)高血压危象：在高血压病程中，血压在短时间内剧升，收缩压达 260mmHg，舒张压 120mmHg 以上，出现头痛、烦躁、眩晕、心悸、气急、恶心、呕吐、视力模糊等征象。其发生机制是交感神经兴奋性增加导致儿茶酚胺分泌过多。

(2)高血压脑病：是指血压急剧升高的同时伴有中枢神经功能障碍如严重头痛、呕吐、神志改变，重者意识模糊、抽搐、昏迷。其发生机制可能为过高的血压导致脑灌注过多，出现脑水肿所致。

4. 【问题】常见的麻醉前用药都有哪些？

【解答】以下是麻醉前的用药：合理的术前用药可以减轻病人精神负担、完善麻醉效果。应根据病人的全身情况、特殊病情、所用麻醉药、麻醉方法以及手术方案加以合理选择。

(1)镇静催眠药：如地西洋、氯羟地西洋、硝基地西洋。

- (2) 镇痛药：如吗啡、哌替啶。其他镇痛药：喷他佐辛、芬太尼。
- (3) 抗胆碱能药：如阿托品、东莨菪碱等。
- (4) 抗组胺药：常用有异丙嗪、阿利马嗪，常与哌替啶、阿托品配伍使用，效果较好

5. 【问题】不同流产的临床表现？

【解答】

类型	先兆流产	难免流产	不全流产	完全流产
流血	少	中→多	多	逐渐停止
腹痛	无或轻	加重	减轻	无
组织排除	无	无	部分排除	完全排除
宫口	闭	扩张	扩张或组织堵塞	闭
子宫大小	与孕周相符	与孕周相符或略小	小于孕周	正常或略大
B超	胚胎存活	胚胎死亡	残留组织	正常宫腔
处理	可保胎	尽早刮宫	立即刮宫	不必处理