

【牙周病学】

关于(牙合)创伤下列哪一项是正确的

- A. 单纯(牙合)创伤会加重牙周炎症
- B. 单纯(牙合)创伤会造成骨下袋
- C. 治疗牙周炎消除(牙合)创伤是第一位的
- D. (牙合)创伤会增加牙的松动度, 所以动度增加是诊断(牙合)创伤的唯一指征
- E. 自限性牙松动, 没有炎症时不造成牙周组织破坏

【正确答案】 E

【答案解析】 (牙合)创伤与牙周炎的关系: ①单纯、短期的(牙合)创伤不会引起牙周袋, 也不会引起或加重牙龈的炎症; ②(牙合)创伤会增加牙的动度, 但动度增加并不一定是诊断(牙合)创伤的唯一指征, 因为牙周膜增宽和牙松动可能是以往(牙合)创伤的结果; ③当长期的(牙合)创伤伴随严重的牙周炎或明显的局部刺激因素时, 它会加重牙周袋和牙槽骨吸收, 这种加重作用的真正机制尚不明了; ④自限性牙松动在没有牙龈炎症的情况下, 不造成牙周组织的破坏。在牙周炎的治疗中, 消除炎症是第一位的; 在正畸治疗前必须先治疗已有的牙龈炎症。

【牙周病学】

关于生物学宽度的叙述正确的是

- A. 龈沟底与牙槽嵴顶之间的恒定距离约 2mm
- B. 龈沟底与牙槽嵴顶之间的距离约 2mm, 其改变可反映牙周状况
- C. 牙周炎时牙槽骨水平吸收, 生物学宽度增大
- D. 牙周萎缩时生物学宽度变小
- E. 随年龄增长上皮附着根向迁移, 生物学宽度变小

【正确答案】 A

【答案解析】 通常将龈沟底与牙槽嵴顶之间的恒定距离称为生物学宽度, 包括结合上皮和牙槽嵴顶上方的结缔组织, 约 2mm。随着年龄的增大或在病变情况下, 上皮附着向根方迁移, 牙槽嵴顶亦随之下降, 沟(袋)底与牙槽嵴顶间的生物学宽度保持不变。

【口腔黏膜病学】

关于 Bednar 溃疡、Riga-Fede 溃疡形成过程及治疗方法描述正确的是

- A. 溃疡未愈合时可用汤匙喂养
- B. Riga-Fede 溃疡好发于上腭翼钩处双侧黏膜
- C. Bednar 溃疡常见于舌系带、舌腹部发生溃疡
- D. Bednar 溃疡发生时应磨钝乳切牙嵴, 避免刺激
- E. 不宜使用过硬的橡皮奶头人工喂养, 避免引发 Riga-Fede 溃疡

【正确答案】 A

【答案解析】 在婴儿上腭翼钩处双侧黏膜, 有时因用过硬的橡皮奶头人工喂养, 经常在该处摩擦, 容易发生溃疡, 称 Bednar 溃疡。若有乳切牙萌出后切缘较锐, 吸奶时间长, 舌系带、舌腹与牙切嵴摩擦也会发生溃疡, 初起时仅局部充血, 继之出现小溃疡, 不断刺激的结果不但溃疡扩大, 疼痛加重甚至可见组织增生, 称 Riga-Fede 溃疡。此时需磨钝乳切牙嵴, 溃疡未愈合时可用汤匙喂养。更换橡皮奶嘴。

【口腔黏膜病学】

下面对于复发性阿弗他溃疡临床特点描述不正确的是

- A. 溃疡表现为孤立的、圆形或椭圆形的浅表性溃疡
- B. 病程一般为 7~14 天
- C. 呈周期性复发且有自限性
- D. 先出现密集分布的针头大小的小水疱, 后破溃形成溃疡
- E. 好发于中青年

【正确答案】 D

【答案解析】 “先出现密集分布的针头大小的小水疱, 后破溃形成溃疡” 此为原发性单纯疱疹的特点。