



临床助理医师考试：《答疑周刊》2020 年第 10 期

【其他相关】

1. 男，8 岁。足部刺伤 1 小时，已接受计划性混合疫苗注射，为预防破伤风，最重要的正确的处置是

A. 刺伤部切开不予缝合

B. 注射 TAT 750U

C. 注射 TAT 1500U

D. 注射 TAT 3000U

E. 注射破伤风类毒素 0.5ml

【正确答案】E

【答案解析】患儿之前接受过疫苗注射，只需要注射破伤风类毒素即可。

2. 女，35 岁。左手示指末节肿胀、疼痛 3 天。3 天前洗鱼时被鱼刺扎伤左手示指末节。起病时指尖有针刺样疼痛，轻度肿胀，继而肿胀明显加重，有剧烈的跳痛。查体：T 37.9℃，左示指末节肿胀明显，指腹张力明显增高，触痛明显。血常规：WBC $13.0 \times 10^9/L$ ，N 0.89。如行手术治疗，正确的操作是

A. 脓腔较大可做对口引流

B. 在末节指腹正中作纵切口

C. 切口远侧应超过甲沟的 1/2

D. 切口近侧应超过指节横纹

E. 切口要作成鱼口形

【正确答案】A

3. 手术后早期恶心、呕吐常见的原因是

A. 颅内压增高

B. 麻醉反应

C. 术后腹胀

D. 肠梗阻

E. 低血钾

【正确答案】B



【答案解析】因手术均需麻醉，术后早期出现的共同表现往往与麻醉有关。本题未强调系哪类手术，同时又强调术后早期，因此应考虑出现恶心、呕吐反应最可能与麻醉相关，系麻醉反应。

4. 若对急性心肌梗死患者行其他疾病的择期手术，最早应在心肌梗死后

- A. 6个月
- B. 1个月
- C. 3个月
- D. 2个月
- E. 2周

【正确答案】A

【答案解析】急性心肌梗死病人6个月内不宜做择期手术。

5. 手术病人从术前12小时禁食。4小时禁水是为了

- A. 减少术后感染
- B. 防止术后腹胀
- C. 防止吻合口瘘
- D. 防止术后伤口裂开
- E. 防止麻醉或手术中呕吐

【正确答案】E

【答案解析】手术病人从术前12小时禁食。4小时禁水是为了防止麻醉或手术中呕吐而引起窒息或吸入性肺炎，必要时甚至可以做胃肠减压。

6. 关于戴无菌手套，脱污染手套，下述描述哪项是错误的

- A. 戴无菌手套时，注意勿触及手套外面
- B. 脱污染手套时，手套外而不能触及皮肤
- C. 常规洗手后，如用干手套，先穿手术衣后戴手套
- D. 常规洗手后，如用湿手套，先戴手套后穿手术衣
- E. 常规洗手后，如用干手套，先戴手套后穿手术衣

【正确答案】E

【答案解析】干无菌手套外面为干净的面，里面不是干净的面。而手术衣外面是干净的，里面不是干净的。如果先戴手套，后穿手术衣，手套的外面必然要接触

手术衣的里面，则会造成手套的污染，因此必须先穿手术衣，后戴手套。

带干手套的方法：

先穿无菌手术衣，用手套袋内无菌滑石粉包轻轻敷擦双手，使之光滑。用左手自手套袋内捏两只手套的翻折部提出手套，使两只手套拇指相对向。先用右手插入右手手套内，再将戴好手套的右手 2~5 指插入左手手套的翻折部分，让左手插入左手手套中，然后将手套翻折部翻回套压住手术衣袖口。用无菌盐水冲净手套外面的滑石粉。在手术开始前应将双手举于胸前，切勿任意下垂或高举。

临床助理医师考试《答疑周刊》2020 年第 10 期

〔医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任〕

