

【牙周病学】

四环素进入机体后,对骨组织亲和力大,服药后,龈沟液中的浓度比血液者高,其倍数为

- A. 2倍
- B. 2~4倍
- C. 2~10倍
- D. 4倍
- E. 4~8倍

【正确答案】 C

【答案解析】 药物在体内分布:分布广,可存在于多种组织、器官和体液中,尤其对骨组织亲和力强,在龈沟液中的浓度为血药浓度的2~10倍。

【牙周病学】

关于牙周病支持治疗即维护期,哪一项不正确

- A. 维护治疗与愈后密切相关
- B. 一般每3~6个月复查一次
- C. 复查间隔根据患者具体情况而定
- D. 维护治疗只针对口腔卫生差的人
- E. 复查时应进行牙周全面检查

【正确答案】 D

【答案解析】 牙周支持治疗,也称维护期,这是正规的牙周系统性治疗计划中不可缺少的部分,它是牙周疗效得以长期保持的先决条件。在第一阶段治疗结束后,无论是否需要手术和修复治疗,维护期即应开始,其内容包括以下方面:定期复查:根据患者剩余牙的病情以及菌斑控制的好坏,确定复查的间隔期。治疗刚结束时,复查应稍密集些,如1~2个月,以了解疗效保持情况。若病情稳定后,可酌情延长间隔期。复查时间应根据每位患者的情况而确定。一般每3~6个月复查一次,约1年拍X线片,监测和比较牙槽骨的变化。复查内容:检查患者菌斑控制情况及软垢、牙石量,牙龈炎症(探诊后有无出血)及牙周袋深度、附着水平,牙槽骨高度、密度及形态,咬合情况及功能、牙松动度,危险因素(如吸烟、全身疾病)的控制情况等。

【口腔黏膜病学】

白斑的诊断

- A. 可根据临床检查做出
- B. 可根据血液化验获得
- C. 可根据家族病史确认
- D. 必须有病理检查证实

E. 必须由间接免疫荧光检查做出

【正确答案】 D

【答案解析】 白斑的诊断须根据临床表现和组织病理学检查方可确诊。组织病理检查结果可为单纯性增生和异常增生。

【口腔黏膜病学】

口腔扁平苔藓好发部位依次是

- A. 舌、牙龈、唇
- B. 舌、唇、颊黏膜
- C. 前庭沟、软腭、舌、牙龈
- D. 颊黏膜及前庭沟，其次为舌、唇、牙龈
- E. 颊黏膜及上唇、舌、口底、硬腭、前庭沟

【正确答案】 D

【答案解析】 口腔扁平苔藓多见于颊黏膜及前庭沟，其次为舌、唇、牙龈。