

自主招聘
临床专业模拟卷 题目

一、单选题（A 型题）

1. 下列关于牙齿说法错误的是
 - A. 儿童在 6 岁左右萌出第一颗恒牙
 - B. 5~10 岁阶段乳牙逐个被同位恒牙替换
 - C. 12 岁萌出第二恒磨牙
 - D. 生后 4~10 个月乳牙开始萌出
2. 下列心电图表现在川崎病中不可看见的是
 - A. 广泛 ST 段抬高和低电压
 - B. T 波倒置
 - C. 异常 Q 波
 - D. P 波消失
3. 女孩，1 岁，无不适。未接种过卡介苗，与父母生活在一起，其父患活动性肺结核，并时有咯血。胸部 X 线片无明显异常。PPD 试验（+）。宜采取的措施是
 - A. 预防性抗结核治疗
 - B. 继续观察，暂不处理
 - C. 隔离观察
 - D. 痰培养
4. 以下不属于肠套叠灌肠禁忌症的是
 - A. 病程超过 24 小时
 - B. 高度腹胀
 - C. 套叠头部已达脾曲
 - D. 多次复发疑有器质性病变者
5. 下列不属于室间隔缺损的种类为
 - A. 膜周型
 - B. 肌部型
 - C. 双动脉下型
 - D. 双动脉上型

- C. 肝硬化
D. 原发性肝癌
13. 呕吐大量隔夜宿食可见于
A. 急性胃炎
B. 慢性胃炎
C. 幽门梗阻
D. 急性肝炎
14. 为了解患者近 2~3 个月内的整体血糖控制情况，医生应首选的检查是
A. 口服糖耐量试验
B. 糖化血红蛋白
C. 胰岛素释放试验
D. 24 小时尿量定量测定
15. 患者，女性，18 岁。烦渴、多尿 5 年，不规律应用胰岛素治疗，食欲缺乏、呕吐 3 天。体检：T 36.5℃，呼吸深大有异味。血糖 22mmol/L，尿糖（++++），酮体（+++）。患者血气分析最可能的结果是
A. 代谢性碱中毒
B. 代谢性酸中毒
C. 呼吸性酸中毒
D. 呼吸性碱中毒
16. 胸骨左缘第 2 肋间闻及收缩期和舒张期连续性机械样杂音，应考虑下列哪项疾病
A. 主动脉夹层
B. 二尖瓣关闭不全
C. 动脉导管未闭
D. 房间隔缺损
17. 下列哪项心电图改变可考虑急性下壁心肌梗死
A. $V_1 \sim V_6$ 导联 ST 段抬高 0.2mV
B. I、aVL 导联 ST 段下降 0.1mV
C. II、III、aVF 导联 ST 段抬高 0.2mV
D. aVR 导联 ST 段抬高 0.1mV
18. 下列哪项心电图表现对室性心动过速最具诊断意义
A. $QRS > 0.20s$
B. 心室率 > 250 次/分
C. 电轴右偏
D. 心室夺获或室性融合波

19. 男，30 岁。反复上腹痛 6 年，为空腹及夜间发作，加重伴呕吐宿食 2 周。该患者可能存在的主要电解质紊乱是
- A. 高血钙
B. 低血钾
C. 低血镁
D. 高血钾
20. 对甲状腺结节的诊断，首先进行的辅助检查是
- A. 放射性核素扫描
B. 甲状腺 B 超
C. 穿刺细胞学
D. 颈部 MRI
21. 中年妇女乳头鲜红色血性溢液应首先考虑
- A. 乳管内乳头状瘤
B. 乳腺囊性增生症
C. 乳腺纤维腺瘤
D. 乳腺癌
22. 急性硬脑膜外血肿患者出现的中间清醒期的长短主要取决于
- A. 出血的来源
B. 血肿形成的速度
C. 血肿部位
D. 原发性颅脑损伤的程度
23. 男，28 岁。左胸外伤后 1 小时，胸痛、呼吸困难。查体：BP 120/80mmHg，心率 100 次/分。左前外侧胸壁皮下瘀血，局部约 6cm×6cm 的区域反常呼吸运动。目前明确的诊断是
- A. 气胸
B. 血胸
C. 肋骨骨折
D. 支气管断裂
24. 以下肝炎病毒中，基因组属于 DNA 的是
- A. HAV
B. HBV
C. HCV
D. HDV
25. 典型伤寒的病程大概持续多长时间
- A. 1 到 2 周
B. 2 到 3 周

C. 3 到 4 周

D. 4 到 5 周

26. 流行性出血热病变最明显的脏器是

A. 心

B. 肾

C. 脑垂体

D. 肝

二、多选题（X 题型）

1. 下列哪些是多囊卵巢综合征的诊断标准

A. 卵巢呈多囊样改变

B. 多毛、痤疮等高雄激素血症的临床表现

C. 持续无排卵或偶发排卵

D. 高雄激素血症

2. 可以诊断为早孕的项目为

A. 阴道及宫颈软，紫蓝色

B. 黑格征阳性

C. 黄体酮试验阳性

D. 尿 hCG 阳性

3. 黄体功能不足的发病机制包括

A. LH 不足

B. 卵巢功能衰退

C. 卵泡期 FSH 缺乏

D. 孕激素分泌减少

4. 女，30 岁，妊娠 37 周，阴道流液 2 小时，无规律宫缩，查体：胎心率正常，胎位正常。与胎膜早破有关的是

A. 生殖道病原微生物上行性感染

B. 双胎妊娠

C. 头盆不称

D. 高龄初产

5. 女性，25 岁，妊娠 26 周，白带增多，出现臭味增多 2 天，查体：阴道分泌物稀薄均质，白带常规线索细胞阳性。诊断为妊娠合并细菌性阴道病，关于细菌性阴道病的叙述正确的是

- A. 应给予积极治疗
 - B. 厌氧菌繁殖产生胺类物质，使分泌物增多并有臭味
 - C. 妊娠期患此病可能导致胎膜早破、早产等
 - D. 该病为混合菌感染，以乳杆菌为主
6. 体格检查既是诊断疾病的必要步骤，也是积累临床经验的过程。体格检查时应注意的事项有
- A. 检查前医师不必洗手或用消毒液擦手，检查后应洗手
 - B. 应以患者为中心，关心、体贴、理解患者
 - C. 检查患者前，应有礼貌地对患者做自我介绍，并说明体格检查的原因、目的和要求
 - D. 检查环境温度要适宜，检查患者时光线适当
7. 关于甲状腺乳头状癌特点的描述，正确的是
- A. 多见于老年人
 - B. 常见于男性
 - C. 恶性程度低
 - D. 呈多中心倾向
8. 乳房脓肿切开引流处理正确的是
- A. 可以作对口引流
 - B. 应作放射状切开
 - C. 切开乳管充分引流
 - D. 乳晕下脓肿应沿乳晕边缘作弧形切口
9. 下列能引起特异性感染的是
- A. 破伤风杆菌
 - B. 结核杆菌
 - C. β 溶血性链球菌
 - D. 真菌
10. 下列最容易并发骨筋膜室综合征的部位是
- A. 肩关节
 - B. 小腿

- C. 前臂
D. 髋关节
11. 耻骨骨折可能会出现
A. 血尿
B. 会阴部瘀斑
C. 骨盆分离试验阳性
D. 骨盆挤压试验阳性
12. 下列与肝癌的发生关系密切的是
A. 黄曲霉素污染的食物
B. 酒精性肝病
C. 肝硬化
D. 病毒性肝炎
13. 缺乏叶酸或维生素 B₁₂ 发生巨幼细胞贫血的主要机制中，下列说法中正确的是
A. 维生素 B₁₂ 或叶酸缺乏均引起四氢叶酸减少 DNA 合成减少
B. 红细胞的分裂和增殖时间延长，红细胞生成速度减慢
C. 巨幼红细胞在骨髓内和外周血内易遭受破坏
D. 细胞核发育落后于细胞质
14. 急性肾损伤的主要临床表现是
A. 贫血
B. 水、电解质和酸碱平衡紊乱
C. 血肌酐和尿素氮升高
D. 全身各系统并发症
15. 关于婴儿生理性贫血发生的原因，下列说法中正确的是
A. 骨髓暂时性造血功能降低
B. 红细胞生成素减少
C. 先天储铁不足
D. 婴儿生长发育迅速，血循环量迅速增加
16. 重症肌无力眼肌型的临床表现是
A. 瞳孔正常
B. 上睑下垂

- C. 直接对光反射正常
D. 直接对光反射消失
17. 贫血面容见于各种原因所导致的贫血，常见的表现有
A. 面色苍白
B. 鼻翼扇动
C. 唇舌色淡
D. 表情疲惫
18. 关于胸外按压的方法，下列说法正确的是
A. 按压深度至少为胸部前后径的三分之一
B. 按压频率是 100~120 次/分
C. 胸外按压的中断应小于 10 秒
D. 青春期儿童按压深度大约为 8cm
19. 溺水的预后描述中正确的是
A. 溺水时间越长预后越差
B. 血糖浓度越高，预后越好
C. 复苏时间越长预后越差
D. pH 越低预后越差
20. 男孩，8 岁。2 天前因“感冒”诱发咳嗽，口服糖皮质激素无缓解。3 岁至 8 岁类似喘息发作 10 余次，曾查肺功能明显降低，支气管舒张试验阳性。查体：呼吸困难，大汗淋漓，不能平卧，面色青灰，三凹征，双肺呼吸音降低，无哮鸣音，心音较低钝。此时适合的治疗是
A. 补液，纠正酸中毒
B. 使用吸入型糖皮质激素
C. 必要时辅以机械通气
D. 氧疗
21. 下列可引起维生素 D 缺乏性佝偻病的是
A. 长期奶糕喂养
B. 患儿偏食
C. 患儿消化吸收障碍
D. 单纯母乳或牛奶喂养
22. 按计划免疫接种程序，半岁以内需要接种的疫苗包括
A. 卡介苗
B. 百-白-破混合疫苗

- C. 麻疹疫苗
D. 乙肝疫苗
23. 以下属于艾滋病的传播途径的有
- A. 性接触传播
B. 血型传染
C. 母婴垂直传播
D. 接触传播
24. 肾综合症出血热的临床表现，主要分为五期，包括以下哪几种
- A. 发热期
B. 低血压休克期
C. 无尿期
D. 多尿期
25. 下列属于传染源的是
- A. 显性感染
B. 隐性感染
C. 易感者
D. 病原携带状态

三、判断题

1. 乳房萌发是女性第二性征的最初特征
对 错
2. 子宫峡部在临产前开始伸展，临产后成为软产道的一部分
对 错
3. 早期流产多见于胚胎异常
对 错
4. 妊娠期高血压、子痫前期患者可期待治疗至 39 周终止妊娠
对 错
5. 过期妊娠的胎儿都是巨大儿
对 错

6. 小儿上呼吸道感染最常见的病原体是呼吸道合胞病毒。
对 错
7. 适宜卡介苗（BCG）接种的主要对象是新生儿以及结核菌素试验阴性的儿童。
对 错
8. 蛋白质-能量营养不良患儿皮下脂肪逐渐减少的顺序是腹部→躯干→臀部→四肢→面颊。
对 错
9. 出生后即有且终生存在的神经反射是膝腱反射。
对 错
10. 心肺复苏的正确顺序为 A-B-C。
对 错
11. 急性阑尾炎患者，未及时就诊，出现右下腹包块，有压痛，最可能的情况是阑尾坏疽穿孔。
对 错
12. 急性胰腺炎所致腹痛的常见放射痛部位是左肩和左腰背部。
对 错
13. 患者有慢性膀胱刺激症状，伴排尿困难及尿流中断，改变体位后可继续排尿，应首先考虑膀胱结石。
对 错

14. 损伤性骨化最常见于膝关节。

对 错

15. 骨与关节结核发病率最高的部位是脊柱。

对 错

16. 过清音音调较清音低，音响较清音强，属于正常成人不会出现的一种病态叩击音。

对 错

17. 杵状指见于发绀型先天性心脏病、亚急性感染性心内炎。

对 错

18. 冠心病病人发生左心衰竭，其心尖区闻及舒张期奔马律。

对 错

19. 急性呼吸窘迫综合征是一种非心源性肺水肿。

对 错

20. 阻塞性黄疸病人其尿胆原、尿胆素均为阴性。

对 错

21. 慢性粒细胞白血病周围血中性粒细胞碱性磷酸酶活性是增高的。

对 错

22. 糖尿病病人尿酮体为阳性即可诊断为酮症酸中毒。

对 错

23. 当患者进入恢复期后，已经稳定退热一段时间，由于体内残存病原体再度繁殖而使临床表现再度出现的情形称为再燃。

对

错

24. 前驱期是从起病至临床，症状明显开始的时期，通常是非特异性的。

对

错