

临床助理医师考试:《答疑周刊》2020年第45期

【风湿免疫性疾病】

1. 不同类型的结缔组织病与不同的抗体相关, 下列配对错误的是

- A. 抗 Sm 抗体为 SLE 的标记性抗体
- B. 抗 SSA 与干燥综合征相关
- C. 抗 Scl-70 抗体与系统性硬化病相关
- D. 抗 Jo-1 抗体与肌炎/皮肌炎相关
- E. 抗双链 DNA 抗体与类风湿关节炎相关

【正确答案】E

【答案解析】抗双链 DNA 抗体与系统性红斑狼疮相关。

2. 女, 30 岁。面部皮疹、发热 1 个月, 水肿 1 周。查体: T 37.8℃, BP 160/100mmHg。颜面可见充血性皮疹, 腹部移动性浊音(+), 双下肢中度凹陷性水肿。血常规: Hb 96g/L, WBC $3.1 \times 10^9/L$, Plt $67 \times 10^9/L$ 。尿沉渣镜检 RBC 满视野, WBC 8~10/HP。尿蛋白定量 4.2g/24h。肾功能正常, 血 C3 下降。

(1) 首先考虑的诊断是

- A. 原发性小血管炎肾损害
- B. 乙型肝炎病毒相关性肾炎
- C. 狼疮肾炎
- D. 过敏性紫癜性肾炎
- E. 急性肾小球肾炎

【正确答案】C

【答案解析】面部皮疹, 发热, 全血细胞减少, 尿蛋白增多, 血红蛋白尿, 判断为狼疮肾炎。

(2) 为明确诊断, 最有价值的实验室检查是

- A. 血 IgA 及 IgE
- B. 血抗中性粒细胞胞浆抗体
- C. 血抗链球菌溶血素“O”
- D. 乙肝病毒标志物
- E. 血抗核抗体及抗双链 DNA 抗体

【正确答案】E

【答案解析】系统性红斑狼疮最有价值检查是抗核抗体谱。

3. 男, 25 岁, 右膝关节和左足跟肿痛 4 周, 曾有下半夜腰痛病史 4 年。查体: 右膝肿胀压痛, 浮髌征阳性, 左侧 4 字征阳性, 左侧骶髂关节压痛, 左侧足跟肿胀压痛。

(1) 对诊断最有价值的检查是

- A. 类风湿因子
- B. 骶髂关节 X 线片
- C. 抗 CCP 抗体
- D. 右膝关节 X 片
- E. HLA-B27

【正确答案】B, 注意不选 E。

【答案解析】强直性脊柱炎对诊断最有价值的是骶髂关节 X 线

(2) 化验回报: 类风湿因子和抗 CCP 抗体阴性, HLA-B27 阳性, 右膝关节 X 片正常, 骶髂关节 X 片显示双侧髂骨边缘虫蚀样破坏, 可采取的治疗措施是

- A. 碳酸氢钠+苯溴马隆
- B. 柳氮磺吡啶+关节内注射倍他米松
- C. 氨基葡萄糖+双醋瑞因
- D. 青霉素+甲氨蝶呤
- E. 青霉素+阿奇霉素

【正确答案】B

双醋瑞因——超纲, 白介素 (IL) -1 抑制剂, 诱导软骨生成、止痛、抗炎及退热——改善骨关节炎患者关节功能。

【答案解析】强直性脊柱炎一线药物非甾体类抗炎药, 然后是免疫抑制剂和激素。

4. 男, 25 岁。腰背部疼痛 8 年, 晨起明显, 活动后减轻。近 1 个月腰痛加重, 活动受限。查体: 腰椎前屈、后伸受限, Schober 试验 (+), 双侧“4”字试验 (+)。

(1) 最可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎

- B. 痛风关节炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 反应性关节炎
- E. 强直性脊柱炎

【正确答案】E

【答案解析】年轻男性，腰背部疼痛，Schober 试验（+），诊断强直性脊柱炎。

(2) 对确诊最有价值的检查是

- A. 血沉
- B. 骶髂关节 X 线片
- C. 血常规
- D. HLA-B27
- E. 类风湿因子

【正确答案】B

【答案解析】强直性脊柱炎对诊断最有价值的是骶髂关节 X 线。

5. 男，31 岁。双侧臀区交替性疼痛 9 年余，间断腰痛 6 年，疼痛主要发生在夜间，伴有晨僵。近 3 周症状加重，有夜间痛醒现象。查体：腰部活动受限，右侧“4”字试验阳性。实验室检查：红细胞沉降率 24mm/h，HLA-B27（+）。

(1) 最可能的诊断是

- A. 腰椎间盘突出症
- B. 类风湿关节炎
- C. 腰椎肿瘤
- D. 腰椎管狭窄症
- E. 强直性脊柱炎

【正确答案】E

【答案解析】男性，31 岁，腰痛，夜间痛，有晨僵，HLA-B27（+）判断强直性脊柱炎。

(2) 最恰当的治疗是

- A. 骨科牵引
- B. 骨科手术

- C. 口服甲氨蝶呤
- D. 休息、理疗
- E. 口服非甾体抗炎药

【正确答案】E。争议答案——C。年轻患者，疼痛晨僵——NSAIDs 是一线药物。

【答案解析】强直性脊柱炎一线药物非甾体类抗炎药。然后是免疫抑制剂和激素。

6. 女，50 岁，对称性多关节肿痛 3 年，晨僵 2 小时，实验室检查：RF 阳性，双手 X 线片示近端指间关节面虫蚀样改变，关节间隙狭窄。

(1) 应首先考虑的诊断是

- A. 反应性关节炎
- B. 强直性脊柱炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 骨关节炎
- E. 痛风关节炎

【正确答案】C

【答案解析】女性，50 岁，对称性多关节肿痛，晨僵 2 小时，RF 阳性，判断为类风湿性关节炎。

(2) 可用于治疗该患者的药物是

- A. 维拉帕米
- B. 头孢菌素
- C. 青霉素
- D. 维生素 C
- E. 来氟米特

【正确答案】E，还有沙利度胺、柳氮磺吡啶……。

【答案解析】来氟米特、沙利度胺、柳氮磺吡啶等药物可治疗类风湿性关节炎。