

主管护师：《答疑周刊》2020 年第 43 期

1. 【问题】高渗性、低渗性、等渗性脱水的区别？

【解答】

类型	高渗性脱水	低渗性脱水	等渗性脱水
病因	水摄入不足或丧失过多	体液丧失而单纯补水	水和钠等比例丧失而未补充
发病原理	细胞外液高渗，细胞内液丧失为主	细胞外液低渗，细胞外液丧失为主	细胞外液等渗，以后高渗，细胞内外液均有丧失
主要表现和影响	口渴，尿少，脑细胞脱水	脱水体征，循环容量减少/休克，脑细胞水肿	不渴，尿少，脱水体征，休克
血清钠	>150mmol/L	<135mmol/L	135mmol/L~150mmol/L
治疗	补充水分为主，补充 5%葡萄糖溶液或 0.45%低渗盐水	补充 5%葡萄糖盐溶液或少量 3%氯化钠溶液	补充平衡盐溶液

2. 【问题】痔疮各个分期的区别？

【解答】

分期	表现	记忆方法
I 期	排便时无痛性出血，痔块不脱出肛门外	有便血，无脱出
II 期	便血加重，严重时呈喷射状，排便时痔块脱出，但便后能自行回纳	有便血，脱出后自行回纳
III 期	便血量减少，痔块脱出不能自行回纳，需用手托回	便血少，脱出后需手托回

IV期	痔块长期脱出于肛门外或回纳后又即脱出	痔块长期脱出
-----	--------------------	--------

3. 【问题】常见几种类型肺癌的区别？



【解答】

分类	好发人群	类型	转移情况	特点
鳞癌	50 岁以上的男性，最常见	大多源于较大的支气管，常为中心型	先经淋巴转移，血性转移发生较晚	生长较慢，病程较长，对放化疗较敏感
小细胞癌	多见于 40 岁左右的男性	一般源于较大支气管，多为中心型	较早出现淋巴和血性转移	恶性度高，生长快，对放化疗虽较敏感，但预后较差
腺癌	年龄较小，女性相对多见	多源于较小的支气管上皮，多为周围型	少数在早期即发生血性转移，淋巴转移则较晚发生	一般生长较慢
大细胞癌		多为中心型	常在发生脑转移后才被发现	生长速度快，分化程度低，预后很差

4. 【问题】新生儿生理性黄疸和病理性黄疸的区别？



【解答】

不同点	生理性黄疸	病理性黄疸
出现时间	足月儿 2~3 天，早产儿 3~5 天	生后 24 小时内
程度	足月儿 < 221 μmol/L，早产儿 < 257 μmol/L	足月儿 > 221 μmol/L 或早产儿 > 257 μmol/L 或每日上升 > 85 μmol/L

消退时间	足月儿<2周；早产儿 3~4周	足月儿>2周，早产儿 >4周
退而复现	无	有

