

内科学题目

一、A1

1. 下列哪项是慢性阻塞性肺疾病的典型症状是

- A. 喘息和胸闷
- B. 食欲减退
- C. 慢性咳嗽
- D. 咳痰
- E. 气短及呼吸困难

2. 肋脊点和肋腰点压痛可见于

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 尿道炎
- C. 输尿管结石
- D. 输卵管炎
- E. 膀胱炎

3. 食管胃底静脉曲张破裂大出血，药物止血首选

- A. 西咪替丁
- B. 硝酸甘油
- C. 卡巴克洛
- D. 酚磺乙胺
- E. 垂体后叶素

4. 胃溃疡最主要的症状是

- A. 恶心，呕吐
- B. 呕吐，黑粪
- C. 上腹疼痛
- D. 食欲减退
- E. 嗝气，反酸

5. 某患者出现中毒反应，出现流泪流涎，呼出气体为蒜臭味，伴有痉挛抽搐，牙关紧闭，首先考虑其中毒为

- A. 有机磷杀虫药中毒
- B. 阿托品中毒
- C. 吗啡中毒
- D. 甲醇中毒
- E. 一氧化碳中毒

6. 诊断早期胃癌最重要的手段是

- A. 胃液分析
- B. 癌胚抗原测定
- C. X 线钡餐检查
- D. 胃镜检查
- E. 大便隐血试验

7. 中度休克时有效循环血容量减少在

- A. 10%以内
- B. 10%~15
- C. 15%~20%
- D. 20%~30%
- E. 30%以上

8. 下列哪项是慢性肾炎治疗的目标

- A. 消除蛋白尿
- B. 消除血尿
- C. 治疗贫血
- D. 消除管型尿
- E. 防止或延缓肾功能进行性恶化

9. 突发胸闷，带哮鸣音的呼气性呼吸困难，咳嗽。两肺满布哮鸣音。首先考虑的诊断是

- A. 急性支气管炎
- B. 支气管哮喘
- C. 慢性支气管炎喘息型
- D. 心源性哮喘
- E. 气胸

10. 慢性左心衰竭患者的体征中，最有诊断价值的是

- A. 心脏扩大
- B. 舒张期奔马律
- C. 第一心音低钝
- D. 肺动脉瓣区第二心音亢进
- E. 心率增快

11. 下列各项，属慢性心力衰竭基本病因的是

- A. 情绪激动
- B. 心脏负荷过重
- C. 感染
- D. 心律失常
- E. 体力活动

12. 诊断慢性胃炎最可靠的方法是

- A. 血清胃泌素测定
- B. 大便隐血试验
- C. X线钡餐检查
- D. 胃液分析
- E. 胃镜加活检

13. 治疗早期胃癌最好的方法是

- A. 联合化疗

- B. 免疫治疗
- C. 手术治疗
- D. 放射治疗
- E. 综合治疗

14. 下列各项, 属肝硬化内分泌失调引起的表现是

- A. 贫血
- B. 不规则低热
- C. 夜盲
- D. 出血倾向
- E. 肝掌、蜘蛛痣

15. 肝硬化最常见的并发症是

- A. 自发性腹膜炎
- B. 肝肺综合征
- C. 急性上消化道出血
- D. 肝性脑病
- E. 肝肾综合征

16. 肝硬化并发肝性脑病时, 饮食治疗的原则是

- A. 限制或禁食蛋白
- B. 低糖饮食
- C. 高优质蛋白饮食
- D. 低盐、低脂饮食
- E. 高糖饮食

17. 诊断原发性肝癌最特异性的标记物是

- A. AFP
- B. AST
- C. ALT
- D. DCP
- E. LPH

18. 原发性肝癌最有效的治疗方法是

- A. 手术治疗
- B. 介入性治疗
- C. 放射性治疗
- D. 局部消融治疗
- E. 分子靶向治疗

19. 慢性肺心病肺动脉高压 X 线的表现是

- A. 双肺透亮度增高
- B. 右心房肥大
- C. 双肺纹理增多

- D. 右心室肥厚
- E. 右下肺动脉干扩张

20. 支气管哮喘典型发作的表现是

- A. 伴哮鸣音的呼吸困难, 粉红色泡沫痰
- B. 发作 24 小时以上伴咯血
- C. 吸气性呼吸困难
- D. 伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难
- E. 伴哮鸣音的混合性呼吸困难

21. 肺炎链球菌肺炎最突出的表现是

- A. 肌痛
- B. 寒战、高热
- C. 咳嗽、咳铁锈色样痰
- D. 发热、咽痛
- E. 胸痛、呼吸困难

22. 社区获得性肺炎的主要致病菌为

- A. 肺炎链球菌
- B. 衣原体
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 克雷白杆菌

23. 下列哪项是慢性阻塞性肺疾病最主要的病因是

- A. 感染
- B. 氧化应激
- C. 吸烟
- D. 职业粉尘
- E. 空气污染

24. 肺心病心功能失代偿期多表现为

- A. 全心衰竭
- B. 肺水肿
- C. 以右心衰竭为主
- D. 低氧血症
- E. 二氧化碳潴留

25. 支气管哮喘呼吸困难的类型是

- A. 吸气性
- B. 呼气性
- C. 混合性
- D. 阵发性
- E. 腹式呼吸消失

26. 慢性左心衰竭的临床表现，不正确的是

- A. 心源性哮喘
- B. 肝颈静脉反流征阳性
- C. 劳力性呼吸困难
- D. 夜间阵发性呼吸困难
- E. 反复咯血

27. 对诊断心肌梗死最有意义的是

- A. 血清碱性磷酸酶
- B. 肌酸磷酸激酶
- C. 淀粉酶
- D. 血清转氨酶
- E. γ 谷氨酰基转肽酶

28. 消化性溃疡最主要的症状是

- A. 呕血、黑粪
- B. 食欲减退
- C. 恶心、呕吐
- D. 嗝气、反酸
- E. 上腹疼痛

29. 胃癌最常见，最早的转移方式是

- A. 种植转移
- B. 上行转移
- C. 直接蔓延
- D. 淋巴转移
- E. 血行转移

30. 治疗慢性肾炎高血压应首选的降压药是

- A. 仅受体阻滞剂
- B. D 受体阻滞剂
- C. 利尿剂
- D. 钙拮抗剂
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂

31. 下列各项，诊断尿路感染最有意义的是

- A. 尿培养菌落计数 >10 万/ml
- B. 肾区叩击痛
- C. 畏寒、高热、白细胞增高
- D. 尿中大量红细胞
- E. 尿中白细胞 >5 个/HP

32. 口服铁剂治疗有效，网织红细胞开始升高的时间是

- A. 3~6 个月

- B. 6 个月以上
- C. 5~10 天
- D. 2 周后
- E. 2 个月

33. 继发性再障的首位病因是

- A. 病毒感染
- B. 放射线
- C. X 线
- D. 药物
- E. 以上均非

34. 治疗慢性再生障碍性贫血的首选药物是

- A. 一叶萩碱
- B. 抗胸腺球蛋白
- C. 强的松龙
- D. BPO
- E. 丙酸睾酮

35. 不属于甲状腺功能亢进症临床表现的为

- A. 肝大
- B. 心动过缓
- C. 甲状腺肿大
- D. 情绪激动
- E. 周围血管体征

36. 诊断甲亢的首选指标是

- A. TT_3 、 TT_4 测定
- B. FT_3 、 FT_4 测定
- C. 基础代谢率
- D. 甲状腺摄 ^{131}I 率
- E. TRH 兴奋试验

37. 胰岛素治疗糖尿病最常见的不良反应是

- A. 过敏反应
- B. 胰岛素抗药性
- C. 低血糖反应
- D. 皮疹
- E. 肝功能损害

38. 肝硬化晚期最常见的死亡原因是

- A. 自发性腹膜炎
- B. 肝肺综合征
- C. 急性上消化道出血

- D. 肝性脑病
- E. 肝肾综合征

39. 救治急性一氧化碳中毒最有效的措施是

- A. 输注新鲜全血
- B. 输注浓缩红细胞悬液
- C. 应用呼吸兴奋剂
- D. 进行机械通气
- E. 高压氧治疗

40. 慢性肺心病的首要死亡原因是

- A. 消化道出血
- B. 肺性脑病
- C. 酸碱失衡
- D. 电解质紊乱
- E. 心律失常

41. 原发性肝癌最常见的表现是

- A. 进行性肝肿大
- B. 脾肿大、黄疸
- C. 肝区疼痛
- D. 食欲不振
- E. 恶心呕吐

42. 不属肝硬化代偿期表现的是

- A. 脾脏轻度肿大
- B. 肝功能轻度异常
- C. 乏力、食欲减退
- D. 食管胃底静脉曲张
- E. 肝脏质地坚实或偏硬

43. 作为胃癌普查时首选的筛选试验是

- A. 钡餐透视
- B. 胃液分析
- C. 胃镜及活检
- D. 粪便隐血实验
- E. Hp 检测

44. 急性心肌梗死最多见的心律失常是

- A. 束支传导阻滞
- B. 心房颤动
- C. 房性早搏
- D. 室性心律失常
- E. 房室传导阻滞

45. 我国高血压病患者最主要并发症是

- A. 肾脏损害
- B. 高血压性心脏病
- C. 脑出血与脑梗死
- D. 冠心病
- E. 主动脉夹层

46. 下列表现, 提示哮喘病情危急的是

- A. 口唇发绀
- B. 胸廓饱满, 叩诊呈过清音
- C. 端坐呼吸
- D. 两肺哮鸣音减弱或消失
- E. 奇脉

47. 肺炎链球菌肺炎的典型体征是

- A. 呼吸困难体征
- B. 感染的全身体征
- C. 急性病容
- D. 肺实变体征
- E. 休克体征

48. 肺癌压迫喉返神经引起的表现是

- A. 胸闷气急
- B. 刺激性干咳
- C. 声音嘶哑
- D. 偏瘫
- E. 哮鸣音

49. 慢性心力衰竭肺淤血的表现中, 提示病情危重的表现是

- A. 端坐呼吸
- B. 心源性哮喘
- C. 运动后呼吸困难
- D. 劳力性呼吸困难
- E. 夜间阵发性呼吸困难

50. 属 β 受体阻滞剂类的抗高血压药物是

- A. 氯沙坦
- B. 卡托普利
- C. 苯胺唑啉
- D. 哌唑嗪
- E. 美托洛尔

51. 心绞痛发作的典型部位是

- A. 胸骨下段后

- B. 剑突下
- C. 胸骨上中段之后
- D. 心尖部
- E. 心前区向颈咽部放射

52. 最有助于消化性溃疡诊断的症状是

- A. 节律性上腹痛
- B. 进食后腹胀
- C. 恶心、呕吐
- D. 反酸、嗝气
- E. 反复呕吐宿食

53. 高血压诊断标准是在未使用降压药物的情况下，非同日 3 次测量血压

- A. 收缩压 ≥ 120 mmHg 和 / 或舒张压 ≥ 80 mmHg
- B. 收缩压 ≥ 130 mmHg 和 / 或舒张压 ≥ 85 mmHg
- C. 收缩压 ≥ 140 mmHg 和 / 或舒张压 ≥ 90 mmHg
- D. 收缩压 ≥ 160 mmHg
- E. 舒张压 ≥ 95 mmHg

54. 下壁心肌梗死的特征性心电图改变出现在下列哪些导联

- A. V_1 、III、aVF
- B. I、III、aVF
- C. V_3 、III、aVF
- D. II、III、aVF
- E. V_1 、III、aVF

55. 肝硬化门静脉高压的表现是

- A. 腹水
- B. 肝大
- C. 营养障碍
- D. 出血倾向
- E. 肝掌

56. 引起尿路感染的最常见致病菌为

- A. 副大肠杆菌
- B. 产气杆菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 克雷白杆菌
- E. 变形杆菌

57. 成年人缺铁性贫血最主要的病因是

- A. 需铁量增加
- B. 铁利用障碍
- C. 铁摄入不足

- D. 慢性失血
- E. 铁吸收障碍

58. 急性白血病常见的首发表现是

- A. 关节疼痛
- B. 脾肿大
- C. 发热及感染
- D. 贫血、出血
- E. 淋巴结肿大

59. 糖尿病中最常见最严重的急性并发症为

- A. 酮症酸中毒
- B. 低血糖昏迷
- C. 心血管病变
- D. 非特异性感染
- E. 肺结核

60. 甲状腺功能亢进症患者，由甲状腺素分泌过多而引起的临床表现是

- A. 眼裂增宽，凝视
- B. 甲状腺肿大
- C. 怕热，多汗，多食而消瘦
- D. 畏寒
- E. 突眼

61. 1 型糖尿病的临床表现是

- A. 对胰岛素不敏感
- B. 起病缓，症状轻
- C. 肥胖者多见
- D. 中老年多见
- E. 明显的三多一少症状

62. 类风湿关节炎最早出现的关节表现为

- A. 畸形
- B. 晨僵
- C. 疼痛
- D. 肿胀
- E. 活动障碍

63. 大脑中动脉闭塞的脑梗死主要表现为

- A. 球麻痹
- B. 眩晕
- C. 三偏征
- D. 共济失调
- E. 吞咽困难

64. 各种原因引起的休克，共同点为

- A. 四肢湿冷
- B. 脉搏加速
- C. 血压下降
- D. 有效循环血量的急剧减少
- E. 皮肤苍白

二、A2

1. 老年患者，多年吸烟史，近 2 个月来咳嗽、体重下降、发热、痰中持续带血，首先考虑的诊断是

- A. 支气管扩张症
- B. 继发性肺结核
- C. 原发性支气管肺癌
- D. 急性肺脓肿
- E. 肺炎链球菌肺炎

2. 患者慢性肺心病病史 6 年，近 1 个月来食欲不振、腹胀、恶心、呕吐、肝区痛，查体肝肿大、双下肢水肿、颈静脉怒张，最可能的诊断是

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 全心衰竭
- D. 急性肺水肿
- E. 慢性肾衰竭

3. 患者 57 岁，高血压病史 23 年，高血压性心脏病史 3 年，近半个月血压控制不理想，劳累后出现气短、呼吸困难，伴咳嗽、咳痰、心悸、交替脉等表现，应考虑出现的并发症是

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 全心衰竭
- D. 急性肺水肿
- E. 肾衰竭

4. 女性，37 岁，风湿性心脏病病史，因并发心力衰竭服用地高辛和利尿剂治疗，症状减轻，近 2 日无明显诱因出现食欲不振、恶心，心电图示频发室早，可能性最大的情况是

- A. 病情加重
- B. 发生洋地黄中毒
- C. 伴发消化道疾病
- D. 药物的不良反应
- E. 洋地黄用量不足

5. 男性，65 岁，冠心病病史 6 年，体力活动后突然胸骨后疼痛，有压迫感、胸闷，被迫停止原来活动，持续 3~5 分钟疼痛自行缓解。其胸痛最可能的诊断是

- A. 肋间神经痛
- B. 急性心肌梗死

- C. 胆绞痛
- D. 胃食管反流
- E. 心绞痛

6. 女性，60 岁，心前区疼痛 6 小时入院，心电图 II、III、aVF 导联出现异常 Q 波伴 ST 段抬高，心肌酶 CK 明显升高，最可能的诊断是

- A. 右室心肌梗死
- B. 急性下壁心肌梗死
- C. 心内膜下心肌梗死
- D. 心绞痛
- E. 急性前壁心肌梗死

7. 男性，50 岁，1 个月来上腹胀满不适，餐后 3 小时左右加重，明显反酸、恶心、呕吐，查体：腹部可见蠕动波，触之有震水音，可能的诊断是

- A. 十二指肠球部溃疡并幽门梗阻
- B. 胃体溃疡并幽门梗阻
- C. 慢性胃体炎并幽门梗阻
- D. 慢性胃窦炎并幽门梗阻
- E. 胃角溃疡并幽门梗阻

8. 男性，42 岁，胃溃疡病史 12 年，近 2 个月上腹痛失去原规律性，伴反酸、嗝气，内科治疗疗效不满意，急需检查的是

- A. 钡餐检查
- B. B 超检查
- C. 胃酸测定
- D. 便隐血试验
- E. 胃镜+活检检查

9. 患者十二指肠溃疡病史 8 年，饮酒后突发上腹剧痛，查体呈板状腹，拟诊为急性穿孔，确诊最重要的检查是

- A. 腹部 X 线透视
- B. 钡餐透视
- C. 血常规
- D. 粪便隐血试验
- E. 腹腔穿刺

10. 男性，40 岁，慢性肝炎病史 14 年，近来腹胀、消瘦。查体：巩膜黄染，右上腹部触到拳头大、质硬、表面不光滑包块，最可能的诊断是

- A. 原发性肝癌
- B. 转移性肝癌
- C. 慢性活动性肝炎
- D. 肝脓肿
- E. 肝硬化

11. 女性，54 岁，腹部 B 超检查发现肝占位性病变，查肝功能正常。最有助于诊断或排除原发性肝癌的是

- A. 7-GT
- B. AFP
- C. AST
- D. ALT
- E. LPH

12. 男性，43 岁，CT 检查发现左外叶肝癌直径 6cm，无手术禁忌证，首选治疗方案是

- A. 全身化学治疗
- B. 肿瘤局部放射治疗
- C. 手术切除
- D. 介入治疗
- E. 分子靶向治疗

13. 男性，50 岁，既往体健，查体时发现肝右季肋下 2cm，质硬无压痛，脾可触及，ALT 正常范围，肝穿刺病理：假小叶形成，诊断是

- A. 慢性活动性肝病
- B. 慢性持续性肝炎
- C. 代偿期肝硬化
- D. 肝脓肿
- E. 肝纤维化

14. 女性，30 岁，尿痛、尿频、尿急 2 天，伴发热、腰痛、恶心、呕吐，血压 120/80mmHg，尿常规检查有红、白细胞及白细胞管型，其诊断可能是

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 急性肾炎
- E. 慢性肾炎

15. 患者，男，80 岁，高血压病 15 年，未治疗，有痛风病史，查体：血压 165/70 mmHg，心率 60 次/分。实验室检查：血肌酐 $137 \mu\text{mol/L}$ 。最适宜的降压方案是

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂+ β 受体阻滞剂
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂+噻嗪类利尿剂
- C. 血管紧张素 II 受体阻滞剂+钙通道阻滞剂
- D. 钙通道阻滞剂+噻嗪类利尿剂
- E. 血管紧张素 II 受体阻滞剂+ β 受体阻滞剂

16. 患者，男，60 岁。十二指肠球部溃疡病史。近期反复呕吐，气味酸臭，可见隔夜宿食。查体：腹部可见胃型，听诊可闻及振水音。首先考虑的诊断是

- A. 十二指肠溃疡穿孔
- B. 幽门梗阻
- C. 幽门管溃疡

- D. 贲门失弛缓症
- E. 胃癌

17. 患者，男，25岁。发热伴牙龈出血2周。血常规：白细胞 $19.8 \times 10^9/L$ ，红细胞 $3.18 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $80g/L$ ，血小板 $32 \times 10^9/L$ ；骨髓象：骨髓增生明显活跃，原始细胞占51%。当前最重要的治疗措施是

- A. 干细胞移植
- B. 免疫治疗
- C. 化疗
- D. 放疗
- E. 输注全血

18. 患者，男，33岁。1型糖尿病病史，10天前因肺部感染食欲欠佳，自行停用胰岛素治疗4日，出现极度口渴伴恶心、呕吐1日。实验室检查：血酮体(+)。首要的治疗措施是

- A. 立即静脉补液
- B. 控制感染
- C. 纠正酸中毒
- D. 应用胰岛素
- E. 纠正电解质紊乱

19. 患者，女，55岁。高血压病史20年，情绪激动后突发剧烈头痛伴呕吐2小时。查体：左侧偏瘫，左侧肢体针刺觉减退。确诊应首选的检查是

- A. 头颅CT
- B. 脑血管造影
- C. 脑脊液检查
- D. 脑电图
- E. 脑血流图

20. 男，68岁。反复咳嗽、咳痰20年，气短10年，喘息加重2天。吸烟30年，每日约1包。查体：神志清楚，呼吸急促，端坐位，口唇发绀，桶状胸，左下肺呼吸音明显减弱，右肺可闻及哮鸣音和湿啰音。WBC $6.3 \times 10^9/L$ ，N 0.65。为进一步诊治，首选的检查是

- A. 心电图
- B. 痰培养
- C. 肺功能
- D. 胸部X线片
- E. 血气分析

21. 患者，男，46岁，从事每天日常活动即出现心悸、气短症状，休息后即缓解。其心功能分级应为

- A. 心功能IV级
- B. 心功能III级
- C. 心功能I级
- D. 心功能II级
- E. 选项都不是

22. 男性患者，慢性肺心病病史 5 年，受凉后出现咳嗽次数增加、痰量增多，伴气喘加重、下肢浮肿，其关键性的治疗措施是

- A. 解痉平喘
- B. 控制肺部感染
- C. 吸氧
- D. 应用利尿剂
- E. 使用洋地黄

23. 女性，26 岁，支气管哮喘病史 13 年，今晨上班途中因吸入汽车尾气突然发作，以喘憋、呼吸困难为主，伴心悸、乏力，遂急诊，为控制发作应首选的药物是

- A. 溴化异丙托品气雾剂
- B. 泼尼松口服
- C. 沙丁胺醇气雾剂
- D. 色甘酸钠
- E. 茶碱缓释片

24. 患者慢性肺心病病史 6 年，近 1 个月来食欲不振、腹胀、恶心、呕吐、肝区痛，查体肝肿大、双下肢水肿、颈静脉怒张，最可能的诊断是

- A. 全心衰竭
- B. 左心衰竭
- C. 右心衰竭
- D. 急性肺水肿
- E. 慢性肾衰竭

25. 患者男性，42 岁。慢性心衰病史 18 年，2 年来腹胀、乏力、双下肢水肿。查体：肝病面容，颈部数枚蜘蛛痣，巩膜黄染，心肺听诊无异常，腹膨隆，肝大肋下 3cm，质硬，无触痛。胃镜显示胃底静脉曲张。可能的诊断是

- A. 肝炎
- B. 脂肪肝
- C. 肝硬化
- D. 肝囊肿
- E. 肝脓肿

26. 男性，45 岁。右肋痛 3 个月，微热，巩膜轻度黄染，肝于吸气时肋下 1.0cm，质中等，右膈外侧抬高。B 超：肝内大小不等的结节样回声。边缘不整齐，HBsAg (+)，甲胎蛋白为 400 $\mu\text{g/L}$ ，最大可能的诊断是

- A. 乙型肝炎
- B. 肝硬化
- C. 阿米巴肝脓肿
- D. 原发性肝癌
- E. 淤胆性肝炎

27. 患者女性，68 岁。夜间阵发性呼吸困难 1 个月余，喘憋不能平卧 2 天，无咳嗽、咳痰，有陈旧性心肌梗死病史，查体：BP 130/90mmHg，心率 98 次/分，无颈静脉怒张，双肺底可闻及细湿啰音，双下肢无水肿。导致该患者喘憋最可能的原因是

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 支气管哮喘
- D. 心肌炎
- E. 肺炎

28. 风心病患者，突发呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，血压 120/80mmHg，心率 140 次/分，心律绝对不齐。首选药物是

- A. 普罗帕酮(心律平)
- B. 利多卡因
- C. 毛花苷 C(西地兰)
- D. 尼可刹米
- E. 胺碘酮

29. 患者男，61 岁。患有高血压，同时伴有 2 型糖尿病，尿蛋白 (+)，降压药物最佳选择为

- A. 利尿剂
- B. 钙拮抗剂
- C. ACEI
- D. α 受体阻滞剂
- E. β 受体阻滞剂

三、A3/A4

1. 患者，男，55 岁。有乙型肝炎病史 20 余年，今晨突然呕吐大量暗红色鲜血。1 月前常规体检血常规示 WBC $3.2 \times 10^9/L$ ，Hb 106g/L，PLT $247 \times 10^9/L$ ；肝功能指标示总胆红素 $27 \mu\text{mol/L}$ ，ALT 59U/L，AST 47U/L，白蛋白 29g/L。查体：血压 70/40mmHg，脉搏 122 次/分，神志恍惚，面色苍白，四肢湿冷。

1) 应首先考虑的诊断是

- A. 食道癌合并上消化道出血
- B. 消化性溃疡合并上消化道出血
- C. 肝硬化食管胃底静脉曲张破裂
- D. 急性糜烂出血性胃炎
- E. 胃癌合并上消化道出血

2) 当前首要的治疗措施是

- A. 急诊手术
- B. 内镜止血
- C. 气囊压迫止血
- D. 补充血容量
- E. 静脉注射质子泵抑制剂

3) 应首选的静脉止血药是

- A. H₂ 受体拮抗剂
- B. 垂体后叶素
- C. 质子泵抑制剂
- D. 止血环酸
- E. 维生素 K

2. 男性, 30 岁, 反复发作性咳嗽、喘息 5 年, 再发加重 2 小时。查体见大汗淋漓, 口唇发绀, 端坐呼吸, 双肺呼吸音明显减低, 未闻及干湿啰音, 心率 130 次/分, 可触及奇脉。

1) 该患者最可能的诊断是

- A. 支气管哮喘
- B. 支原体肺炎
- C. 心源性哮喘
- D. 原发性支气管肺癌
- E. 喘息性慢性支气管炎

2) 为明确诊断首选下列哪种检查

- A. 胸部 CT
- B. 心脏超声
- C. 支气管舒张试验
- D. 纤维支气管镜
- E. 胸部 X 片

3) 为进一步判断病情程度最有价值的检查是

- A. 胸部 X 片
- B. 痰脱落细胞学检查
- C. 动脉血气分析
- D. PEF 占预计值的百分率
- E. 皮肤过敏原试验

3. 患者男性, 30 岁, 冒雨赶路后突发寒战、高热、胸痛、咳嗽、咳铁锈色痰并伴有肺实变体征。

1) 考虑最可能的诊断是

- A. 胸膜炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 流行性感胃
- D. 支气管肺炎
- E. 急性肺脓肿

2) 最有助于确诊的检查是

- A. 白细胞计数
- B. X 线透视
- C. 痰病原学检查
- D. 纤维支气管镜

E. 血沉

3) 治疗应首选的药物

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 甲硝唑
- D. 氧氟沙星
- E. 头孢唑啉钠

4. 女性, 70 岁, 阵发性咳嗽、咳痰 30 余年, 3 天前受凉后出现畏寒、发热、咳脓痰、气急。体检: T 38.8°C, P 40 次/分, 双肺呼吸音减低, 有较多湿性啰音, 下肢轻度水肿。

1) 最主要的治疗措施为

- A. 应用利尿剂消肿
- B. 给予止咳祛痰药
- C. 给予解痉平喘药
- D. 低浓度持续吸氧
- E. 控制肺部感染

2) 下列诊断中最不可能的是

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管肺炎
- C. 肺心病
- D. 心力衰竭
- E. 风心病

3) 下列检查、化验中不适合的是

- A. 支气管镜
- B. X 线胸片
- C. 痰细菌培养
- D. 血气分析
- E. 血常规

5. 女性, 37 岁, 风湿性心脏病病史, 因并发心力衰竭服用地高辛和利尿剂治疗, 症状减轻, 近 2 日无明显诱因出现食欲不振、恶心, 心电图示频发室早。

1) 患者出现这种情况最大的可能性是

- A. 病情加重
- B. 发生洋地黄中毒
- C. 伴发消化道疾病
- D. 药物的不良反应
- E. 洋地黄用量不足

2) 治疗期间如果为防止上述症状, 应注意避免发生的情况是

- A. 低钙血症
- B. 低钠血症

- C. 低钾血症
- D. 高钠血症
- E. 高钾血症

3) 当前最关键的处理是

- A. 立即停用地高辛
- B. 鼻导管给氧
- C. 静注利多卡因
- D. 静注普罗帕酮
- E. 静注苯妥英钠

6. 男性，65 岁，因急性前间壁心肌梗死并发急性左心衰竭 3 小时入院。

1) 此时应慎重使用的药物是

- A. 硝酸异山梨酯
- B. 硝普钠
- C. 酸妥拉明
- D. 硝酸甘油
- E. 毛花昔 C

2) 若出现频发室早，其治疗首选的药物是

- A. 利多卡因
- B. 苯妥英钠
- C. 普罗帕酮
- D. 维拉帕米
- E. 普鲁卡因

3) 若出现三度房室传导阻滞，最恰当的治疗措施是

- A. 静注阿托品
- B. 静注异丙肾上腺素
- C. 口服阿托品
- D. 安装临时心脏起搏器
- E. 安装永久性心脏起搏器

4) 若出现三度房室传导阻滞听诊可出现的异常表现是

- A. 第二心音增强
- B. 第二心音减弱
- C. 第三心音
- D. 第四心音
- E. 大炮音

7. 男性，42 岁，胃溃疡病史 12 年，近 2 个月上腹痛失去原规律性，伴反酸、嗝气，内科治疗疗效不满意。

1) 急需检查的是

- A. 钡餐检查

- B. B 超检查
- C. 胃酸测定
- D. 便隐血试验
- E. 胃镜+活检检查

2) 提示此病处于活动期的内镜下表现是

- A. 粘膜皱襞向溃疡集中
- B. 溃疡基底部呈现红色瘢痕
- C. 溃疡基底部呈现白色瘢痕
- D. 溃疡基底部有白色厚苔
- E. 溃疡表浅苔变薄

3) 若患者腹部 X 线透视见膈下游离气体影, 提示可能的病变是

- A. 出血
- B. 穿孔
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 溃疡愈合

四、B

- 1. A. 菊花样缺损
- B. 皮革状
- C. 虫蚀样充盈缺损
- D. 龛影
- E. 变形

1) 肝硬化食管静脉曲张 X 线钡餐检查的表现是

2) 肝硬化胃底静脉曲张 X 线钡餐检查的表现是

- 2. A. 上行感染
- B. 血行感染
- C. 直接感染
- D. 淋巴道感染
- E. 间接感染

1) 尿路感染最主要的感染途径为

2) 多发生于伴有慢性疾病患者的尿路感染的感染途径为

- 3. A. 干咳无痰
- B. 咳铁锈色痰
- C. 咳吐大量鲜血
- D. 咳大量脓痰
- E. 咳粉红色泡沫痰

1) 肺炎球菌肺炎, 常伴有

2) 急性左心功能不全, 常伴有

- 4. A. 原发性肺泡通气不足
- B. 慢性高原病
- C. 支气管哮喘
- D. COPD
- E. 支气管扩张症

本题知识点: 1 呼吸系统疾病—慢性肺源性心脏病,

1) 慢性肺心病最常见的病因是

2) 大咯血的常见病因是

- 5. A. 进餐后 2 小时疼痛
- B. 疼痛无固定时间
- C. 进食后 1 小时内疼痛
- D. 进食后 2~4 小时左右疼痛
- E. 进餐前 2 小时疼痛

1) 胃溃疡疼痛的特点是

2) 十二指肠溃疡疼痛的特点是

- 6. A 免疫治疗
- B. 中医中药治疗
- C. 化学药物治疗
- D. 放射治疗
- E. 手术治疗

1) 局限性非小细胞性肺癌首选的治疗方法是

2) 小细胞肺癌首选的治疗方法是

- 7. A. 贫血
- B. 晨僵
- C. 关节肿胀
- D. 类风湿结节
- E. 抗角蛋白抗体阳性

1) 提示类风湿关节炎处于活动期的表现是

2) 类风湿关节炎最多见的表现是

- 8. A. 壳核
- B. 丘脑
- C. 桥脑
- D. 小脑
- E. 脑叶

1) 脑出血患者交叉瘫, 针尖样瞳孔和昏迷, 可能的出血部位是

2) 脑出血患者表现为眩晕、共济失调而无瘫痪, 可能的出血部位是

