

医学教育网主管护师考试：《答疑周刊》2020 年第 52 期

1. 【问题】高钾血症病人出现酸中毒时应首选

A. 10%葡萄糖酸钙

B. 葡萄糖液+胰岛素

C. 碳酸氢钠溶液

D. 10%氯化钾

E. 聚磺苯乙烯

【解答】治疗代谢性酸中毒的首选药物就是碳酸氢钠溶液，碳酸氢钠溶液在进入体液以后，可以离解为钠离子和碳酸氢根离子，碳酸氢根离子与体液中的氢离子化合成为碳酸，再离解为水和二氧化碳，二氧化碳则由肺部排出，从而减少体内的氢离子，可以使酸中毒得到改善。

选 C。

2. 【问题】为什么肺源性心脏病引起的右心衰禁止使用洋地黄类药物？

【解答】因肺心病病人长期处于缺氧状态，对洋地黄类药物的耐受性低，容易中毒，故使用洋地黄类药时应以快速、小剂量为原则，用药前要积极纠正缺氧和低钾血症，用药过程中密切观察药物毒副反应。

3. 【问题】链霉素过敏反应的急救中可选用

A. 乳酸钙

B. 碳酸钙

C. 溴化钙

D. 草酸钙

E. 葡萄糖酸钙

【解答】此题选 E，链霉素过敏反应的处理方法与青霉素大致相同，同时，可静脉缓慢推注 10%葡萄糖酸钙（或氯化钙）10ml，以使钙离子与链霉素络合而减轻中毒症状。

4. 【问题】符合革兰氏阴性杆菌感染临床特点的是

A. 常导致菌血症

B. 体温升高

C. 白细胞计数升高

D. 四肢厥冷

E. 血压升高

【解答】选 D，革兰氏阴性杆菌所致的脓毒血症常较严重。多见肠道、胆道、泌尿道感染和
大面积烧伤时。此类细菌的内毒素及其介导的多种炎症介质可引起毛细血管扩张、通透性增
加和微循环淤滞，导致有效循环血量减少。临床特点为全身寒战或间歇发热、四肢湿冷和“三
低”现象（体温不升、低血白细胞计数、低血压），早期即可发生感染性休克，且持续时间
长。引起菌血症的不单单是革兰阴性菌感染，还包括革兰染色阳性球菌感染等。

