

主管护师：《答疑周刊》2020 年第 54 期

1. 【问题】医院感染与非医院感染的诊断标准？

【解答】

医院感染范围	非医院感染范围
(1) 无明确潜伏期的感染，规定入院 48 小时后发生的感染为医院感染；有明确潜伏期的感染，自入院时起超过平均潜伏期后发生的感染为医院感染	(1) 医务人员在医院工作期间获得的感染
(2) 本次感染直接与上次住院有关	(2) 由于创伤或非生物性因子刺激而产生的炎症表现
(3) 在原有感染基础上出现其他部位新的感染(除外脓毒症迁徙灶)，或在原感染已知病原体基础上又分离出新的病原体(排除污染和原来的混合感染)的感染	(3) 新生儿经胎盘获得(出生后 48 小时内发病)的感染，如单纯疱疹、弓形体病、水痘等
(4) 新生儿在分娩过程中和产后获得的感染	(4) 患者原有的慢性感染在医院内急性发作
(5) 由于诊疗措施激活的潜在性感染，如疱疹病毒、结核杆菌等的感染	
(6) 医务人员在医院工作期间获得的感染	

2. 【问题】医院隔离区域的划分？

【解答】

分类	概念	范围
清洁区	凡未被病原微生物污染的区域	更衣室、配膳室、医护值班室及库房等
半污染区	凡有可能被病原微生物污染的区域	医护办公室、化验室、病区内走廊等
污染区	凡病人直接接触或间接接触，被病原微生物污染的区域	病室、厕所、浴室等

3. 【问题】医用物品的危险样分类？

【解答】

分类	概念	常见物品
高度危险性物品	进入人体无菌组织、器官、脉管系统， 或有无菌体液从中流过的物品或接触 破损皮肤、破损黏膜的物品，一旦被微 生物污染，具有极高感染风险	手术器械、穿刺针、腹腔镜、 活检钳、心脏导管、植入物等
中度危险性物品	与完整黏膜相接触，而不进入人体无菌 组织、器官和血流，也不接触破损皮肤、 破损黏膜的物品	胃肠道内镜、气管镜、喉镜、 肛表、口表、呼吸机管道、麻 醉机管道、压舌板、肛门直肠 压力测量导管等
低度危险性物品	与完整皮肤接触而不与黏膜接触的器 材，如听诊器、血压计袖带等	听诊器、血压计袖带等；病床 围栏、床面以及床头柜、被褥； 墙面、地面；痰盂（杯）和便 器等