

2020年《中药学综合知识与技能》模考大赛（一）

关注【正保医学教育网执业药师考试】公众号
及时获取更多执业药师考试资讯！



一、最佳选择题

1. 药学服务于 1990 年由美国学者倡导，其含义是药师应用药专业知识向公众（包括医务人员、患者及家属）提供直接的、负责任的、与用药相关的服务，以期提高药物治疗的安全、有效、经济和适宜性，改善和提高人类生活质量。以下关于中药药学服务的表述，说法错误的是

- A. 中药药学服务是指中药师运用中医药专业知识提供的与用药相关、以提高患者生命质量为目的，以促进合理用药治疗为核心的相关服务
- B. 中药药学服务的对象是广大公众，包括患者及其家属、医护人员和卫生工作者、药品消费者，不包括健康人群
- C. 药学服务模式的转变，从“以药品为中心”转变为“以病人为中心”，从“以保障药品供应为中心”转变为“在保障药品供应的基础上，以重点加强药学专业技术服务、参与临床用药为中心”。
- D. 中药药学服务的具体工作除传统的中药处方调剂工作以外，还包括中药处方点评、用药咨询、中药医嘱审核、参与临床查房、开展药学查房、开展药学监护、参与临床会诊、患者用药教育、健康宣教、个体化药学服务及用药安全性检测等多个环节
- E. 药学服务是高度专业化的服务过程，要求药师以合理用药为核心，以提高患者生命质量为目的

【正确答案】B

【答案解析】中药药学服务的对象是广大公众，包括患者及其家属、医护人员和卫生工作者、药品消费者和健康人群。其中尤为重要的人群包括：①用药周期长的慢性病患者，需长期或终生用药者；②病情和用药复杂，患有多种疾病，需同时合并应用多种药品者；③特殊人群，如特殊体质者、肝肾功能不全者、过敏体质者、小儿、老年人、妊娠及哺乳期妇女、血液透析者，听障、视障人士以及特殊职业者如驾驶员等；④用药效果不佳，需要重新选择药品或调整用药方案、剂量、方法者；⑤用药后易出现明显的药品不良反应者；⑥应用特殊剂型、特殊给药途径者。故 B 项表述错误。

2. 中医学历史悠久，医籍浩繁，汗牛充栋，据《全国中医图书联合目录》载，目前全国 110 个图书馆，共藏有中医药书籍达 10124 种，这些藏书尚不包括近代诸位同道编著出版佳作。其种类之多，内容之多，充分显示出中医药伟大宝库内容之丰富。以下关于常用古文献典籍的叙述，说法错误的是

- A. 《伤寒论》载方 113 首，配伍严谨，体现了君臣佐使的组方原则，并包含汗、吐、下、和、温、清等法，具有广泛的适用性。剂型有汤剂、散剂、丸剂、栓剂等，有很高的临床实用价值，后世称为“众方之祖”
- B. 《备急千金要方》序例中著有“大医习业”、“大医精诚”两篇专论
- C. 《太平惠民和剂局方》涉及内科、外科、妇科、儿科、伤科、五官科等病证，由宋代官府颁行，是我国第一部成药典
- D. 《普济方》保存了大量的民间验方，是中国古代收方最多的方书，为研究复方用药提供了极为珍贵的资料

E.《炮炙大法》将前人的炮制方法归纳为炮、熅、煨、炙、煨、炒、煨、炼、制、度、飞、伏、镑、撮、(日煞)、曝、露十七种方法,即称雷公炮炙十七法,也是我国第一部炮制学专著

【正确答案】E

【答案解析】《炮炙大法》中药物炮炙方法,有的系引用《雷公炮炙论》的内容,有的则是记述当世制法,并将前人的炮制方法归纳为:炮、熅、煨、炙、煨、炒、煨、炼、制、度、飞、伏、镑、撮、(日煞)、曝、露十七种方法,即称雷公炮炙十七法。《炮炙大法》是继《雷公炮炙论》之后第二部炮制专著,在前人的基础上有所发展,正如作者所说的“自为阐发,以益前人所未逮”。《雷公炮炙论》是我国第一部炮制专著。故E错误。

3.某患者,三叉神经痛复发,痛得说不出话,吃不下饭,睡不着觉。就诊后,西医医师处方西药卡马西平和中成药山海丹胶囊,当晚服药后疼痛加剧。第二天向药师咨询后发现,该患者是热性体质,而山海丹胶囊主含人参、黄芪、灵芝、山羊血等温补药,不宜服。于是停药山海丹胶囊。此案例体现执业药师向医师提供的用药咨询服务是

A.药品的不良反应

B.新药信息

C.合理用药信息

D.药物相互作用

E.药物禁忌证

【正确答案】C

【答案解析】执业药师向医师提供的用药咨询服务是合理用药信息。据某大城市的调查,现行生产的中成药,有75%左右是由西医医师处方的。这些医师经过西学中的培训,系统地接受了中医学的培养,对中医理论和用药能融会贯通。而有些医师并未接受系统的中医学培训,他们也希望得到一些合理用药的信息。如:某患者,三叉神经痛复发,痛得说不出话,吃不下饭,睡不着觉。就诊后,西医医师处方西药卡马西平和中成药山海丹胶囊,当晚服药后疼痛加剧。第二天咨询后发现,该患者是热性体质,而山海丹胶囊主含人参、黄芪、灵芝、山羊血等温补药,不宜服。于是停药山海丹胶囊。随着临床药师的努力,很多药师已经在合理用药咨询方面形成了自身的特色。

4.根据中医天人相应的思想,人体的生命活动与自然界的的时间变化具有同步节律,因此中药的服药时间也应和自然界的阴阳消长、人体疾病的盛衰和病理生理节律一致。药性不同、治疗的疾病不同,服药的时间也各不相同。以下关于药物服药时间的表述,说法错误的是

A.桃核承气汤宜空腹服药

B.保和丸宜饭后服

C.麻黄汤宜午前服

D.七宝饮宜清晨服用

E.酸枣仁汤宜睡前服

【正确答案】B

【答案解析】饭前服:补益药宜饭前服以利于吸收,如六味地黄丸、参苓白术散等;健胃消食药宜饭前服,如保和丸、大山楂丸等;制酸药宜饭前服,以减少胃酸分泌,增强对胃黏膜的保护;病在胸腹以下,如肝、肾等脏器疾病宜饭前服,旨在使药力直达病所,发挥最佳效力。故B项表述错误。

5.丸剂、散剂、片剂、胶囊剂等固体剂型通常直接以温开水送服。特殊剂型有特殊的服药方式,以下关于服药方式的表述,说法错误的是

A.大蜜丸可咀嚼服用

B.老人使用缓控释制剂时,可以碾碎服用

C.速效救心丸舌下含服

D.颗粒剂用开水冲服

E.煎膏剂可以用温开水化开后服用

【正确答案】B

【答案解析】丸剂、散剂、片剂、胶囊剂等固体剂型通常直接以温开水送服。其中大蜜丸可咀嚼服用，或搓成小丸服用；老人、儿童及吞咽困难的患者可将普通片剂等碾碎服用，但应注意缓控释制剂不可碾碎，以免影响药物的生物利用度，如雷公藤缓释片等。含服剂用药时需保持口腔湿润，其中舌下含服速效救心丸、复方丹参滴丸、冠心病丹参滴丸等应将药物放于舌下。咽喉含片(丸)如草珊瑚含片、金嗓子喉宝、清咽滴丸等是将药物含于口中，然后合并双唇，避免搅动舌头，直至药物完全溶解，在用药过程中应避免吃喝吞咽、抽烟等动作，不可咀嚼或吞咽药物。颗粒剂用开水冲服。口服液、糖浆剂可直接服用。煎膏剂可以用温开水化开后服用。胶剂可用水或黄酒加热熔化后服用，或兑入煎好的药液中加热化服用，如阿胶、鳖甲胶、鹿角胶等。茶剂用时以沸水泡汁或煎汁，不定时饮用。

6.根据中医理论，“症”“证”“病”三者含义不同，下列表述中属于“证”的是

- A. 气虚血瘀
- B. 鼻塞流涕
- C. 胸胁胀满
- D. 噎腐吞酸
- E. 胸痛彻背

【正确答案】A

【答案解析】“证”是机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括，包括病变的部位、原因、性质，以及邪正关系，能够反映出疾病发展过程中某一阶段的病例变化的本质。A为证，BCDE为症。

7.某女，56岁。近日出现畏寒肢冷，腰膝冷痛，腹泻，完谷不化等不适症状。利用中医五行学说的理论，可选用的治法是

- A. 滋水涵木法
- B. 金水相生法
- C. 泻南补北法
- D. 佐金平木法
- E. 益火补土法

【正确答案】E

【答案解析】益火补土法：温肾阳以补脾阳的治法，又称温肾健脾法。（火，在此是指命门之火，而非心火。益火，补益命门之火，即温肾阳之法。）适用于肾阳衰微而致脾阳不振的脾肾阳虚证。临床可见畏寒肢冷，腰膝冷痛，腹泻，完谷不化，或五更泄泻，舌淡胖边有齿痕，苔白滑，脉沉无力等症。

8.以下表述中，属于“子病犯母”的是

- A. 肝病及心
- B. 脾病及肾
- C. 脾病及肺
- D. 肝病及肾
- E. 肺病及肾

【正确答案】D

【答案解析】五行相生顺序是：木火土金水木.....，对应五脏的相生顺序是：肝心脾肺肾肝.....。故A项肝病及心，属于母病及子。B项脾病及肾，属于相乘关系。C项脾病及肺，属于母病及子。D项肝病及肾，属于子病及母。E项肺病及肾，属于母病及子。

9.容易发生湿滞、水肿、痰饮、瘀血等病症的体质类型是

- A. 阴虚质
- B. 肝郁质
- C. 偏阳质

D. 阴阳平和质

E. 偏阴质

【正确答案】 E

【答案解析】 具有偏阴质体质类型的人,对寒、湿等阴邪具有易感性,受邪发病后多表现为寒证、虚证;容易发生湿滞、水肿、痰饮、瘀血等病症。在用药上宜温,忌用苦寒。

10. 有位商人外出经商多年不归,他妻子因思念丈夫,致胸脘痞满,不思饮食,倦怠乏力,日渐消瘦。某医诊治后嘱其父高声责骂她,女子无故被骂,既气又怒,放声大哭。大哭后渐有食欲,开始进食,病情好转。按照七情致病特点,诊治医生所采用的治法依据是

A. 恐胜喜

B. 怒胜思

C. 喜胜悲

D. 悲胜怒

E. 恐胜思

【正确答案】 B

【答案解析】 肝在志为怒,脾在志为思。正常时,木克土,怒胜思,从而治疗了患者的思念之病。

11. 空腹食入过多的未熟柿子,可形成

A. 梅核气

B. 肾结石

C. 尿结石

D. 胃结石

E. 梅毒

【正确答案】 D

【答案解析】 空腹食入过多的未熟柿子、黑枣等,可影响胃的受纳和通降,形成胃结石。

12. 中医诊断学认为辨别邪正盛衰的纲领是

A. 表里

B. 寒热

C. 虚实

D. 阴阳

E. 五行

【正确答案】 C

【答案解析】 虚实用以分别邪正的盛衰。

13. 某女,20岁。恶寒喜暖,口淡不渴,面色苍白,肢冷蜷卧,小便清长,大便溏稀,舌淡苔白而润滑,脉紧。中医辨证是

A. 实寒

B. 虚寒

C. 实热

D. 虚热

E. 寒热错杂

【正确答案】 A

【答案解析】 寒证,是感受寒邪,或阳虚阴盛,机体的功能活动衰减所表现的证候。其临床表现常见恶寒喜暖、口淡不渴、面色苍白、肢冷蜷卧、小便清长、大便稀溏、舌淡苔白而润滑、脉迟或紧等症状。以寒为主,功能减退为

辨证要点。

14.某女, 56岁。近几日食少, 没胃口, 腹胀便溏, 神疲乏力, 舌淡脉虚, 证属

- A. 脾虚气陷
- B. 脾阳虚证
- C. 寒湿困脾
- D. 脾胃湿热
- E. 脾失健运

【正确答案】 E

【答案解析】脾失健运证: 常见食纳减少, 食后作胀, 或肢体浮肿, 小便不利, 或大便溏泻, 时息时发。并伴有身倦无力, 气短懒言, 面色萎黄, 舌质淡嫩, 苔白, 脉缓弱的临床表现。以运化功能减退和气虚证共见为辨证要点。

15.某女, 40岁。带下量多, 色白, 质稀薄, 无臭气, 绵绵不断, 神倦乏力, 四肢不温, 纳少便溏, 两足肿, 面色白。舌质淡, 苔白腻, 脉缓弱, 其证候是

- A. 湿热
- B. 痰湿
- C. 脾虚
- D. 肝郁
- E. 肾虚

【正确答案】 C

【答案解析】问带下, 应注意了解量的多少, 质地和气味等。若带下量多色白, 清稀如涕, 多属脾虚湿注; 带下色黄, 黏稠臭秽, 或伴有外阴瘙痒疼痛, 多属湿热下注; 带下色赤, 淋漓不断, 微有臭味, 多属肝经郁热; 带下晦暗, 质稀薄而多, 腰腹酸冷, 多属肾虚。总之, 凡带下色白而清稀的, 多属虚证、寒证; 色黄或赤, 稠黏臭秽的, 多为实证、热证。

16.成年男性正常的血红蛋白范围应是

- A. 90~110g/L
- B. 110~150g/L
- C. 120~160g/L
- D. 140~180g/L
- E. 170~200g/L

【正确答案】 C

【答案解析】血红蛋白参考值

男性: 120~160g/L。

女性: 110~150g/L。

新生儿: 170~200g/L。

17.当蛋白质浓度大于 100mg/L 或 150mg/24h 尿液, 蛋白质定性检查呈阳性的尿液, 称为蛋白尿。膀胱炎患者所出现的蛋白尿为

- A. 肾小球性蛋白尿
- B. 肾小管性蛋白尿
- C. 混合性蛋白尿
- D. 溢出性蛋白尿
- E. 假性蛋白尿

【正确答案】 E

【答案解析】泌尿道感染（膀胱炎、尿道炎）所出现的蛋白尿为假性蛋白尿。

18. 某女，56岁。恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咯痰无力，舌淡苔白，脉浮而无力。治法宜首选

- A. 辛温解表
- B. 辛凉解表
- C. 祛湿解表
- D. 益气解表
- E. 滋阴解表

【正确答案】D

【答案解析】气虚感冒

【症状】发热，恶寒较甚，无汗，头痛鼻塞，身楚倦怠，咳嗽，痰白，咯痰无力。舌淡，苔白，脉浮而无力。

【治法】益气解表。

19. 方剂桑杏汤的组成是桑叶、杏仁、沙参、象贝、香豉、栀子、梨皮等，其多用于治疗

- A. 风寒袭肺型咳嗽
- B. 风热犯肺型咳嗽
- C. 痰湿蕴肺证咳嗽
- D. 痰热郁肺型咳嗽
- E. 风燥伤肺型咳嗽

【正确答案】E

【答案解析】咳嗽——风燥伤肺证

【症状】干咳，连声作呛，咽痒，咽喉干痛，唇鼻干燥，口干，无痰或痰少而黏，不易咳出，或痰中带血丝，初起或伴鼻塞、头痛、微寒、身热。舌质红而少津，苔薄白或薄黄，脉浮数。

【治法】疏风清肺，润燥止咳。

【方剂应用】基础方剂：桑杏汤

20. 虚喘的治疗尤当重视

- A. 治肺
- B. 治脾
- C. 治心
- D. 治肝
- E. 治肾

【正确答案】E

【答案解析】肾为先天之本，肾主纳气。所以虚喘的治疗，尤当重视肾脏。此题教材不涉及，根据藏象知识，可以推断出来。可以结合所学知识了解下。

21. 某男，70岁。喘而胸满闷塞，甚则胸盈仰息，咳嗽，痰黏腻色白，咳吐不利，甚则呕恶，食少，口黏不渴。舌苔白腻，脉滑。治疗时应首选

- A. 二陈汤合三子养亲汤
- B. 生脉散合补肺汤
- C. 七味都气丸合生脉散
- D. 参蛤散合肾气丸
- E. 苏子降气汤合二陈汤

【正确答案】A

【答案解析】喘证——痰浊阻肺证【症状】喘而胸满闷塞，甚则胸盈仰息，咳嗽，痰多黏腻色白，咳吐不利，兼有呕恶，食少，口黏不渴。舌苔白腻，脉滑或濡。

【治法】祛痰降逆，宣肺平喘。

【方剂应用】基础方剂：二陈汤(陈皮、半夏、茯苓、甘草、生姜、乌梅)合三子养亲汤(紫苏子、白芥子、莱菔子)加减。

22.痰热郁肺型肺胀在治疗时，应采用的治法是

- A. 宣肺化痰，止咳定喘
- B. 清热解毒，止咳化痰
- C. 清肺化痰，降逆平喘
- D. 辛凉解表，止咳化痰
- E. 养阴清肺，化痰降气

【正确答案】C

【答案解析】肺胀——痰热郁肺证

【症状】咳逆，喘息气粗，胸满，目胀睛突，痰黄或白，黏稠难咳，烦躁，口渴欲饮，尿赤，大便干。舌边尖红，苔黄或黄腻，脉数或滑数。

【治法】清肺化痰，降逆平喘。

23.可参考胸痹来辨证论治的西医疾病是

- A. 心源性哮喘
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 冠心病
- D. 肺气肿
- E. 支气管扩张症

【正确答案】C

【答案解析】胸痹是指以胸部闷痛，甚则胸痛彻背，短气、喘息不得卧为主症的疾病，轻者仅感胸闷如窒，呼吸欠畅，重者则有胸痛，严重者心痛彻背，背痛彻心。西医学的冠心病(心绞痛或心肌梗死)、其他原因引起的心绞痛(如主动脉瓣狭窄、梗阻性肥厚型心肌病)、心包炎以及肺源性心脏病等以上述表现为主者，可参考此内容辨证论治。

24.某女，60岁，有冠心病史半年，昨日因劳作太累，胸部隐隐作痛，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩。治疗主方选

- A. 补阳还五汤
- B. 丹栀逍遥散
- C. 当归四逆散
- D. 甘麦大枣汤
- E. 瓜蒌薤白半夏汤

【正确答案】A

【答案解析】胸痹——气虚血瘀证

【症状】胸痛隐隐，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩，或结、代。

【治法】益气活血，通脉止痛。

【方剂应用】基础方剂：补阳还五汤(当归、川芎、黄芪、桃仁、红花、地龙、赤芍)加减。

25.某女，66岁。虚烦不眠，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴有气短自汗，倦怠乏力。舌淡，脉弦细。证属

- A. 肝火扰心证

- B. 痰热扰心证
- C. 心胆气虚证
- D. 心肾不交证
- E. 心脾两虚证

【正确答案】C

【答案解析】不寐——心胆气虚证

【症状】虚烦不眠，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力。舌淡，脉弦细。

26. 患者张某，男，27岁，聚餐后出现胃脘疼痛，胀满拒按，噎腐吞酸，或呕吐不消化食物，其味腐臭，吐后痛减，不思饮食，大便不爽，得矢气及便后稍舒，舌苔厚腻，脉滑。治宜选用

- A. 大承气汤
- B. 小承气汤
- C. 藿香正气丸
- D. 半夏泻心汤
- E. 保和丸

【正确答案】E

【答案解析】胃痛——饮食伤胃证

【症状】胃脘疼痛，胀满拒按，噎腐恶食，或吐不消化食物，吐后或矢气后痛减，大便不爽。舌淡红，苔厚腻，脉滑。

【治法】消食导滞，和胃止痛。

【方剂应用】基础方剂：保和丸(山楂、神曲、茯苓、半夏、莱菔子、陈皮、连翘、麦芽)加减。根据患者症状，可辨证为饮食伤胃证，故可选用的方剂是保和丸。

27. 下列哪一项不是肝郁气滞胁痛的特点

- A. 胁肋胀痛
- B. 走窜不定
- C. 入夜痛甚
- D. 胸闷暖气
- E. 疼痛每因情志变化而增减

【正确答案】C

【答案解析】胁痛——肝郁气滞证【症状】胁肋胀痛，走窜不定，甚则引及项背肩臂，疼痛每因情志变化而增减，胸闷腹胀，暖气频作，得暖气而胀痛稍舒，纳少口苦。舌苔薄白，脉弦。

28. 患者尿频量多，混浊如膏脂，腰膝酸软，头晕耳鸣，皮肤干燥，舌红少苔，脉细数。治法宜用

- A. 清利湿热
- B. 清热化湿
- C. 滋养肾阴
- D. 健脾益肾
- E. 滋肾壮阳

【正确答案】C

【答案解析】消渴——肾阴亏虚证【症状】尿频量多，浊如膏脂，腰酸膝软，头晕耳鸣，多梦遗精，乏力，皮肤干燥。舌红少苔，脉细数。

29. 患者腰部疼痛，重着而热，暑湿阴雨天气症状加重，身体困重，舌苔黄腻，脉濡数或弦数，治宜

- A. 清热化痰，舒筋通络

- B. 清热利湿, 舒筋止痛
- C. 利水消肿, 舒筋通络
- D. 活血化瘀, 通络止痛
- E. 健脾渗湿, 舒筋止痛

【正确答案】 B

【答案解析】 腰痛——湿热腰痛【治法】清热利湿, 舒筋止痛。

30. 某男, 69岁。常日工作于海鲜市场, 近日偶感肢体关节酸痛、重着, 患处肿胀且固定, 手足沉重, 活动不利, 肌肤麻木不仁。苔白腻, 脉濡滑。治疗宜选用的治法是

- A. 祛风通络, 散寒除湿
- B. 散寒通络, 祛风除湿
- C. 除湿通络, 祛风散寒
- D. 化痰祛瘀, 滋养肝肾
- E. 解表散寒, 祛暑化湿

【正确答案】 C

【答案解析】 痹证——着痹【症状】肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛, 肿胀散漫, 关节活动不利, 肌肤麻木不仁。舌质淡, 苔白腻, 脉濡缓。

【治法】除湿通络, 祛风散寒。

31. 治疗乳痈热毒炽盛证最常用的方剂是

- A. 瓜蒌牛蒡汤
- B. 牛蒡解肌汤
- C. 五味消毒饮合透脓散
- D. 仙方活命饮合橘叶散
- E. 瓜蒌牛蒡汤合开郁散

【正确答案】 C

【答案解析】 乳痈——热毒炽盛证【方剂应用】基础方剂: 五味消毒饮(金银花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵子)合透脓散(生黄芪、川芎、当归、穿山甲、皂角刺)加减。

32. 某女, 35岁。肛门松弛, 痔核脱出须手法复位, 便血色淡, 伴面白少华, 少气懒言, 纳少便溏。舌质淡, 边有齿痕, 苔薄白, 脉弱。治宜选用的方剂是

- A. 止痛如神汤
- B. 凉血地黄汤
- C. 补中益气汤
- D. 脏连丸
- E. 防风通圣丸

【正确答案】 C

【答案解析】 患者为痔——脾虚气陷证【方剂应用】基础方剂: 补中益气汤(黄芪、人参、炙甘草、当归、橘皮、升麻、柴胡、白术)加减。

33. 某女, 36岁。月经周期提前半年有余, 量少色淡暗, 质清稀。腰膝酸软, 头晕耳鸣, 面色晦暗, 舌淡暗, 苔白, 脉沉细。中医应辨证为

- A. 肾气虚证
- B. 脾气虚证
- C. 血虚证

D. 肝郁血热证

E. 痰湿证

【正确答案】A

【答案解析】月经先期——肾气虚证【症状】月经周期提前，经量或多或少，色淡暗，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，面色晦暗或面有暗斑。舌淡暗，苔白，脉沉细。

34. 患儿，8个月。因一次食入2个鸡蛋，并饮用一大杯牛奶而致呕吐，呕吐物见有不消化食物，且有酸腐味。不思进食，腹胀，啼哭不安，大便酸臭，舌苔厚腻。其诊断是

A. 厌食

B. 积滞

C. 呕吐

D. 疳积

E. 腹痛

【正确答案】B

【答案解析】积滞为小儿常见病。母乳喂养或牛奶喂养的婴儿发病，为伤乳，呕吐物或大便中可见较多的乳凝块；幼儿发病者，为伤食，多有较明显饮食不节病史，呕吐物或大便中可见较多的食物残渣，且多有酸腐味。故根据患者的症状“呕吐物见有不消化食物，且有酸腐味，大便酸臭”等症状，可诊断为积滞。

35. 某女，72岁。耳聋突然发生，如吹风音，昼夜不停，耳部胀闷不适，听力下降，伴有发热恶寒，鼻塞流涕，咽痒咳嗽。舌质红，苔薄黄，脉浮数。中医应辨证为

A. 火毒上攻证

B. 肝火上扰证

C. 风热侵袭证

D. 肾精亏损证

E. 脾胃虚弱证

【正确答案】C

【答案解析】耳鸣耳聋——风热外袭证【症状】耳鸣或耳聋突然发生，如吹风音，昼夜不停，耳部胀闷不适，或耳内作痒，听力下降，伴有发热恶寒，鼻塞流涕，咽痒咳嗽。舌质红，苔薄黄，脉浮数。

36. 某女，33岁。经血量少，色暗红，夹有小血块；小腹胀痛不适，经行后痛减，舌紫暗，有瘀斑或瘀点，脉沉弦。医师给予桃红四物汤来治疗。方中选用的当归为

A. 生品当归头

B. 土炒当归

C. 酒当归

D. 当归炭

E. 生品当归尾

【正确答案】C

【答案解析】当归功用活血养血，桃红四物汤活血行瘀，方中宜用酒当归；当归补血汤补气生血，方中宜用生当归。

37. 以下关于中药临方炮制的说法错误的是

A. 中药临方炮制通常是指医师在开具中药处方时，根据药物性能和治疗需要，要求中药师遵医嘱临时将生品中药饮片进行炮制的操作过程

B. 中药临方炮制是适应中医辨证施治用药需求发展而来的一项传统制药技术，是中药炮制的组成部分，是确保中药临床应用有效性和安全性的重要环节

C. 中药饮片必须按照国家药品标准炮制，未按规定炮制的，应认定为假药

- D. 对市场上没有供应的中药饮片, 医疗机构可以根据本医疗机构医师处方的需要, 在本医疗机构内炮制、使用
E. 根据临床用药需要, 医疗机构可以凭本医疗机构医师的处方对中药饮片进行再加工

【正确答案】C

【答案解析】中药临方炮制通常是指医师在开具中药处方时, 根据药物性能和治疗需要, 要求中药师遵医嘱临时将生品中药饮片进行炮制的操作过程。中药临方炮制是适应中医辨证施治用药需求发展而来的一项传统制药技术, 是中药炮制的组成部分, 是确保中药临床应用有效性和安全性的重要环节。现行法律规定, 中药饮片应当按照国家药品标准炮制; 国家药品标准没有规定的, 应当按照省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范炮制。对市场上没有供应的中药饮片, 医疗机构可以根据本医疗机构医师处方的需要, 在本医疗机构内炮制、使用。医疗机构炮制中药饮片, 应当向所在地设区的市级人民政府药品监督管理部门备案。另外, 根据临床用药需要, 医疗机构可以凭本医疗机构医师的处方对中药饮片进行再加工。

38. 某女, 33岁。肠鸣腹痛, 大便泄泻, 泻必腹痛, 泻后痛缓, 舌苔薄白, 脉两关不调, 左弦而右缓。医师给予痛泻要方治疗, 功用补脾柔肝, 祛湿止泻。方中所用白芍为

- A. 生白芍
B. 炒白芍
C. 醋白芍
D. 酒白芍
E. 土炒白芍

【正确答案】B

【答案解析】炒白芍, 寒性缓和, 以养血和营, 敛阴止汗为主。用于血虚萎黄, 腹痛泄泻, 自汗盗汗。痛泻要方补脾柔肝, 祛湿止泻。[主治]脾虚肝旺之痛泻。肠鸣腹痛, 大便泄泻, 泻必腹痛, 泻后痛缓, 舌苔薄白, 脉两关不调, 左弦而右缓者。

39. 某男, 37岁。化脓性扁桃体炎入院, 静滴穿琥宁注射液10分钟后, 出现高热、寒战、面色苍白、呼吸困难等症状。经抢救, 症状逐渐好转。据悉扁桃体炎往往是革兰阳性菌感染。而穿琥宁注射液主要用于病毒性肺炎的治疗, 故本例中药注射剂不合理使用的原因是

- A. 药证不符
B. 给药途径不当
C. 超功能主治用药
D. 超剂量使用
E. 配伍不合理

【正确答案】C

【答案解析】超功能主治用药某男, 37岁。化脓性扁桃体炎入院, 静滴穿琥宁注射液10分钟后, 出现高热、寒战、面色苍白、呼吸困难等症状。经抢救, 症状逐渐好转。

分析: 扁桃体炎往往是革兰阳性菌感染。而穿琥宁注射液主要用于病毒性肺炎、病毒性上呼吸道感染的治疗。

40. 我国《药品不良反应报告和监测管理办法》中要求对新的或严重的药品不良反应病例需要快速报告, 最迟不超过

- A. 3个工作日
B. 7个工作日
C. 30个工作日
D. 10个工作日
E. 15个工作日

【正确答案】E

【答案解析】我国《药品不良反应报告和监测管理办法》中要求对新的或严重的药品不良反应病例需用有效方式快速报告, 必要时可以越级报告, 最迟不超过15个工作日。

二、配伍选择题

- 1.A.实中夹虚
- B.虚中夹实
- C.真虚假实
- D.真实假虚
- E.上实下虚

1) 实热内盛, 伤津耗气, 其病机是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】实中夹虚, 指以邪实为主, 兼见正气虚损的病机变化。如外感热病发展过程中, 由于邪热炽盛, 消灼津液而形成的实热伤津、气阴两伤病证, 出现以高热、烦渴欲饮、尿少便干等主要表现, 就属于实中夹虚的病机变化。

2) 脾阳不振, 运化无力的水肿, 其病机是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】虚中夹实, 指以正虚为主, 兼夹邪实的病机变化。如脾阳不振, 运化无权之水肿病, 即属此类。这是由于脾失健运, 气不化水, 水湿停聚, 泛滥肌肤所致。

3) 实邪结聚, 阻滞经络, 气血不能外达, 其病机是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】在特殊情况下, 还会出现疾病的现象与本质不完全一致的变化, 在临床上形成疾病本质与症状不符的许多假象, 如由于实邪结聚, 阻滞经络, 气血不能外达, 可导致真实假虚的现象, 称为“大实有羸状”; 由于脏腑的气血不足, 运化无力, 可导致真虚假实的现象, 称为“至虚有盛候”。

4) 老人久病, 大便秘结, 排出困难, 其病机是

- A.
- B.

- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】真虚假实：又称“至虚有盛候”，是指病机的本质为“虚”，但表现出“实”的临床假象的病机变化。一般是由于正气虚弱，脏腑经络气血不足，功能减退，气化无力所致。例如，脾气虚弱，运化无力，可见脘腹胀满、疼痛等假实征象。又如，老年或大病久病，因气虚推动无力而出现的便秘等。

2.A 两眼明亮，鉴识精明

B.突然跌扑，昏不知人

C.撮空理线，循衣摸床

D.意识不清，突然精神转“佳”

E.表情淡漠，寡言少语

“目”为五脏六腑之精气之所注，其目系通于脑，为肝之窍，心之使，“神藏于心，外候在目”，所以察眼神的变化又是望神的重要内容之一。

1) 病重“失神”的临床表现是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】失神的临床表现和意义：在疾病过程中，如患者表现为目光晦暗、瞳仁呆滞、精神萎靡、反应迟钝、呼吸气微，甚至神识昏迷、循衣摸床、撮空理线，或猝倒而目闭口开、手撒、遗尿等，均称为“失神”或“无神”。“失神”，表示正气已伤，病情严重，预后不良。

2) 病危“假神”的临床表现是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】假神的临床表现和意义：在疾病过程中，如患者原来不欲言语、语声低弱、时断时续、突然转为言语不休者，原来精神极度衰颓，意识不清、突然精神转“佳”者，原来面色十分晦暗、忽然两颧发红如妆者，都属于假神，是为阴阳格拒，阴不敛阳欲将离决的虚假现象，人们通常把它比喻为“回光返照”或“残灯复明”，应予以特别注意。假神，往往见于久病、重病、精气极度衰弱的患者，表示正气大伤、病情严重又复杂，预后不良。

3.A.眼睑、口唇或手指、足趾不时颤动

B.足或手软弱无力、行动不灵

- C.项背强直、角弓反张、四肢抽搐
D.一侧手足举动不遂，或麻木不仁
E.突然跌倒、昏不知人、口吐白沫

1) 痿证多见于

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】 B

【答案解析】 足或手软弱无力、行动不灵，多属于痿证。

2) 痫病多见于

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】 E

【答案解析】 突然跌倒，昏不知人，口吐涎沫，四肢抽动，多属痰迷心窍、肝风内动的痫病。

3) 痉病多见于

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】 C

【答案解析】 项背强直，角弓反张，四肢抽搐，则为痉病。

4.A.神识昏糊，胡言乱语，声高有力

B.神志不清，语言重复，声音低弱

C.言语粗鲁，狂妄叫骂，失去理智

D.喃喃自语，语无对象，见人则止

E.语言错乱，语无伦次，笑骂不定

“言为心声”，语言错乱多属于心的病变。

1) 谵语患者，多表现为

- A.
B.
C.
D.

E.

【正确答案】A

【答案解析】语言错乱：“言为心声”，语言错乱多属于心的病变。若神识昏糊，胡言乱语，声高有力的，是谵语，常见于热扰心神的实证。

2) 郑声患者，多表现为

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】B

【答案解析】神志不清，语言重复，时断时续，声音低弱的，是郑声，属于心气大伤，精神散乱的虚证。

3) 狂言患者，多表现为

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】C

【答案解析】若言语粗鲁，狂妄叫骂，失去理智控制的为狂言，常见于狂证，是痰火扰心所致。

4) 独语患者，多表现为

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】D

【答案解析】喃喃自语，讲话无对象，见人便停止的是独语，常见于癫证，多是心气虚，精不养神的表现。而语言窘涩，则多属于风痰上扰的病变。

5.A.心阳虚证

B.肝肾阴虚证

C.心血虚证

D.心气虚证

E.心阴虚证

1) 某男，73岁。心悸，气短，自汗，形寒肢冷，心胸憋闷，面色苍白，舌淡。中医辨证为

A.

B.

- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】心阳虚证的临床表现，心悸，气短，自汗，活动或劳累后加重，兼见形寒肢冷，心胸憋闷，面色苍白，舌淡或紫暗脉细弱或结代。如出现心阳虚脱，除有心阳虚的症状外，兼见大汗淋漓，四肢厥冷，口唇青紫，呼吸微弱，脉微欲绝。

2) 某女，55岁。心悸，心烦，易惊，失眠，健忘，眩晕，面色不华，唇舌色淡，脉细弱，中医辨证为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】心血虚证的临床表现，心悸，心烦，易惊，失眠，健忘，兼见眩晕，面色不华，唇舌色淡，脉细弱。

3) 某女，68岁。头晕目眩，耳鸣，胁痛，腰膝酸软，咽干，颧红，盗汗，五心烦热，舌红无苔，脉细数。中医辨证为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】肺肾阴虚证临床常见咳嗽痰少，动则气促，间或咳血，腰膝酸软，消瘦，骨蒸潮热，盗汗遗精，颧红。舌红苔少，脉细数。这些症状，均由肺肾阴虚，阴虚内热，虚火上炎所引起。一般以久咳痰血，腰膝酸软，遗精等症与阴虚症状同见为辨证要点。

- 6.A.气虚证
- B.气血两虚证
- C.血虚证
- D.气虚血瘀证
- E.气滞血瘀证

1) 某女，28岁。胸胁胀满走窜疼痛，性情急躁，并兼见痞块刺痛拒按，舌紫暗有瘀斑，痛经、经色紫暗有块，乳房胀痛，中医辨证是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】气滞血瘀证的临床表现，常见胸胁胀满走窜疼痛，性情急躁，并兼见痞块刺痛拒按，舌紫暗或有瘀斑等。妇女还可见月经闭止，或痛经、经色紫暗有块，乳房胀痛等症状。一般以病程较长和肝经循行部位的疼痛痞块为辨证要点。

2) 某男，55岁。少气懒言，乏力自汗，面色萎黄，心悸失眠，舌淡而嫩，脉细弱，中医辨证是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】气血两虚证的临床表现，常见少气懒言，乏力自汗，面色苍白或萎黄，心悸失眠，舌淡而嫩，脉细弱等。多以气虚与血虚的症状同见为辨证要点。

7.A.麻黄汤合华盖散

B.桑白皮汤

C.肾气丸合参蛤散

D.百合固金汤

E.清金化痰汤

1) 某女，69岁，喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，稀薄痰且带泡沫，兼有头痛鼻塞，恶寒，脉浮紧等症，治疗时可选用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】喘证——风寒闭肺证【症状】喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞、无汗、恶寒、发热，舌苔薄白而滑，脉浮紧。

【治法】宣肺散寒平喘。

【方剂应用】基础方剂：麻黄汤（麻黄、杏仁、桂枝、炙甘草）合华盖散（麻黄、杏仁、桑白皮、紫苏子、茯苓、陈皮）加减。

2) 某男，50岁，症见喘咳气涌，胸部胀痛，痰稠黏色黄，伴有胸中烦闷，身热，有汗，口渴喜冷饮，面红，尿赤，舌质红，苔薄黄腻，脉滑数等症，治疗时可选用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】喘证——痰热壅肺证【症状】喘咳气涌，胸部胀痛，痰稠黏色黄，或夹血痰，伴胸中烦闷、身热、有汗、口渴喜冷饮、咽干、面红、尿赤、便秘。舌质红，苔薄黄腻，脉滑数。

【治法】清热化痰，宣肺平喘。

【方剂应用】基础方剂：桑白皮汤(桑白皮、半夏、苏子、苦杏仁、贝母、黄芩、黄连、栀子)加减。

3) 某男，55岁，症见喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，小便常因咳甚而失禁，形瘦神疲，汗出肢冷，舌淡苔薄，脉沉弱，治疗时可选用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】喘证——肾不纳气证【症状】喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，小便常因咳甚而失禁，或尿后余沥，形瘦神疲，汗出肢冷，面唇青紫，或有跗肿，舌淡苔薄，脉沉弱；或见喘咳，面红烦躁，口咽干燥，足冷，汗出如油。舌红少津，脉细数。

【治法】补肾纳气。

【方剂应用】基础方：肾气丸(桂枝、附子、熟地、山萸肉、山药、茯苓、丹皮、泽泻)合参蛤散(人参、蛤蚧)加减。

- 8.A.柴胡疏肝散
- B.龙胆泻肝汤
- C.血府逐瘀汤
- D.通窍活血汤
- E.一贯煎

1) 胁痛肝络失养证代表方是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】胁痛——肝络失养证【方剂应用】基础方剂：一贯煎(北沙参、麦冬、当归、生地黄、枸杞子、川楝子)

2) 胁痛瘀血阻络证代表方是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 胁痛——瘀血阻络证【方剂应用】基础方剂：血府逐瘀汤（当归、生地黄、桃仁、红花、枳壳、赤芍、柴胡、川芎、桔梗、牛膝、甘草）或复元活血汤（柴胡、栝楼根、当归、红花、甘草、穿山甲、大黄、桃仁）加减。

3) 胁痛肝胆湿热证代表方是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 胁痛——肝胆湿热证【方剂应用】基础方剂：龙胆泻肝汤(龙胆、泽泻、木通、车前子、当归、柴胡、生地黄、黄芩、栀子、生甘草)加减。

4) 胁痛肝郁气滞证代表方是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 胁痛——肝郁气滞证【方剂应用】基础方剂：柴胡疏肝散(柴胡、香附、枳壳、芍药、陈皮、川芎、炙甘草)加减。

9.A.五皮饮合胃苓汤

- B.麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- C.越婢加术汤
- D.疏凿饮子
- E.实脾饮

1) 治疗水肿脾阳虚衰证的首选方是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 水肿——脾阳虚衰证【方剂应用】基础方剂：实脾饮（厚朴、白术、木瓜、木香、草果仁、槟榔、附子、茯苓、干姜、炙甘草、生姜、大枣）加减。

2) 治疗水肿湿热壅盛证的首选方是

- A.

- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】水肿——湿热壅盛证【方剂应用】基础方剂：疏凿饮子（泽泻、赤小豆、商陆、羌活、大腹皮、椒目、木通、秦艽、槟榔、茯苓皮、生姜）加减。

10.A. 补血养肝

B. 益气补虚

C. 补阳温中

D. 养阴生津

E. 阴阳双补

治疗虚劳时

1) 患者面色萎黄，气短懒言，语声低微，头昏神疲，肢体无力，脉虚无力，治法宜

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】虚劳——气虚证

【症状】面色（白光）白或萎黄，气短懒言，语声低微，头昏神疲，肢体无力。舌质淡，或有齿痕，舌苔薄白，脉虚无力。

【治法】益气补虚。

2) 患者头晕眼花，心悸多梦，手足发麻，面色淡黄，爪甲色淡，舌质淡，脉细，治法宜

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】虚劳——血虚证

【症状】头晕眼花，心悸多梦，手足发麻，面色淡黄或淡白无华，口唇、爪甲色淡，妇女月经量少。舌质淡，脉细。

【治法】补血养肝。

3) 患者形体消瘦，口燥咽干，潮热颧红，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细数，治法宜

- A.
- B.
- C.

D.

E.

【正确答案】D

【答案解析】虚劳——阴虚证

【症状】形体消瘦，口燥咽干，潮热颧红，五心烦热，盗汗，小便短黄，大便干结。舌质红，舌面少津，苔少或无苔，脉细数。

【治法】养阴生津。

4) 患者畏寒怕冷，四肢不温，口淡不渴，小便清长，大便溏薄，舌质淡，脉沉迟，治法宜

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】C

【答案解析】虚劳——阳虚证

【症状】畏寒怕冷，四肢不温，口淡不渴，自汗，小便清长或尿少浮肿，大便溏薄。舌体胖，舌质淡，苔白滑，脉沉迟。

【治法】补阳温中。

11.A.五味消毒饮合黄连解毒汤

B.仙方活命饮合透脓散

C.仙方活命饮合增液汤

D.瓜蒌牛蒡汤

E.五味消毒饮合透脓散

1) 外科疾病疔的热毒蕴结证，宜选用的方剂是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】A

【答案解析】疔热毒蕴结证【方剂应用】基础方剂：五味消毒饮(金银花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵子)合黄连解毒汤(黄连、黄芩、黄柏、栀子)加减。

2) 外科疾病疔的湿毒蕴结证，宜选用的方剂是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 B

【答案解析】 疖湿毒蕴结证【方剂应用】基础方剂：仙方活命饮（金银花、赤芍、当归、乳香、没药、陈皮、防风、贝母、白芷、天花粉、甘草、穿山甲、皂角刺）合透脓散（当归、川芎、生黄芪、穿山甲、皂角刺）加减。

12.A.二陈汤合桃红四物汤

B.茵陈蒿汤

C.枇杷清肺饮

D.防风通圣散

E.桂枝麻黄各半汤

1) 瘾疹胃肠湿热证，治宜选用的方剂是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 D

【答案解析】 瘾疹——胃肠湿热证【方剂应用】基础方剂：防风通圣散（防风、荆芥、连翘、麻黄、薄荷、川芎、当归、白芍、枳实、大黄、芒硝、石膏、黄芩、桔梗、滑石、甘草）加减。

2) 粉刺胃肠湿热证，治宜选用的方剂是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 B

【答案解析】 粉刺——胃肠湿热证【方剂应用】基础方剂：茵陈蒿汤(茵陈、栀子、生大黄)加减。

13.A.四物汤加减

B.固本止崩汤加减

C.调肝汤加减

D.左归丸合二至丸

E.归脾汤加减

治疗崩漏时

1) 属于气血两虚者，宜选用的方剂是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 E

【答案解析】崩漏——气血两虚证【方剂应用】基础方剂归脾汤去当归、茯神、远志（人参、黄芪、白术、酸枣仁、木香、龙眼肉、甘草、生姜、大枣）加党参、茜草、乌贼骨、仙鹤草。

2) 属于脾不统血者，宜选用的方剂是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】崩漏——脾不统血证【方剂应用】基础方剂：固本止崩汤（人参、黄芪、白术、熟地黄、当归、黑姜）加升麻、山药、大枣、乌贼骨。

3) 属于肝肾不足证，宜选用的方剂是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】崩漏——肝肾不足证【方剂应用】基础方剂：左归丸合二至丸（熟地黄、山药、枸杞、山萸肉、菟丝子、鹿角胶、龟甲胶、川牛膝、女贞子、旱莲草）加黄芩、夏枯草、仙鹤草、制首乌。

14.A.生黄连

- B.酒黄连
- C.萸黄连
- D.黄连炭
- E.姜黄连

1) 泻心汤泻火解毒，方中选用黄连为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】

2) 香连丸清热化湿、行气止痛，方中选用黄连为

- A.
- B.

- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】黄连有生黄连、姜黄连、萸黄连之分，泻心汤泻火解毒，用生黄连；香连丸清热化湿、行气止痛，宜用萸黄连。

- 15.A.生巴豆
- B.白降丹
- C.洋金花
- D.水银
- E.生狼毒

1) 用法为熬膏外敷，不宜与密陀僧同用的毒性中药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】生狼毒：熬膏外敷，不宜与密陀僧同用。

2) 用法为研末调敷或作药捻，不可内服，具腐蚀性的毒性中药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】白降丹：外用适量，研末调敷或作药捻，不可内服，具腐蚀性。

3) 内服 0.3~0.6g，外感及痰热咳喘、青光眼、高血压及心动过速者禁用的毒性中药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】洋金花：内服，0.3~0.6g，宜入丸散；亦可作卷烟分次燃吸（一日用量不超过 1.5g），外用适量。孕妇、外感及痰热咳喘、青光眼、高血压及心动过速患者禁用。

16.A.牡丹皮

B.大蒜

C.灯心草

D.花椒

E.吴茱萸

1) 宜与山药同贮的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】A

【答案解析】牡丹皮与泽泻、山药同贮。

2) 宜与土鳖虫同贮的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】B

【答案解析】土鳖虫与大蒜同贮。

17.A.溶媒用量不足

B.配伍禁忌

C.配制不规范

D.溶媒选用不当

E.超功能主治用药

1) 某女, 57岁, 冠心病, 予以参麦注射液 50ml+氯化钠注射液 500ml 静脉滴注。5分钟后。突感头昏、胸闷、多汗、心悸, 继而出现呼吸困难、口唇及肢端发钳、四肢厥冷, 面色苍白; 血压测不到。本例中药注射剂不合理使用的原因是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】D

【答案解析】溶媒选用不当: 参麦注射液说明书对溶媒的使用有明确规定: “静脉滴注, 一次 20~100ml (用 5%葡萄糖注射液 250~500ml 稀释后应用)”。该例使用了氯化钠注射液作为溶媒稀释药物。

2) 某男, 40岁。发热、呕吐、全身乏力, 诊断为肠胃型感冒。给予输液, 第一组是硫酸庆大霉素等药, 第二组是

清开灵注射液等药。在输完第一组,第二组输入约 70ml 时,患者出现抽搐、胸闷、气促、呼吸抑制等症状。本例中药注射剂不合理使用的原因是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 配伍禁忌:清开灵注射液说明书的[注意事项]注明“已确认清开灵注射液不能与硫酸庆大霉素、青霉素 G 钾、肾上腺素、间羟胺、乳糖酸红霉素、多巴胺、山梗菜碱、硫酸美芬丁胺等药物配伍使用”。

- 18.A.麝香保心丸
- B.六味地黄丸
- C.人参鹿茸丸
- D.银杏叶制剂
- E.柴胡舒肝丸

1) 老年人服用地高辛时不宜同时服用的中成药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 麝香保心丸与地高辛等强心类药物联合用药,由于麝香保心丸中所含的蟾酥的基本化学结构与强心苷相似,在化学结构上有相似之处,故具有与强心苷类药物地高辛相似的强心作用,联合应用势必会造成相同或者相似功效的累加,产生拟似效应,诱发强心苷中毒,出现频发性早搏等心律失常等不良反应。

2) 老年人服用法莫替丁时不宜同时服用的中成药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 法莫替丁片为抗溃疡抗酸药,与含有多量黄酮类成分的银杏叶制剂同时服用可产生络合效应,形成螯合物,影响疗效。

3) 老年人服用二甲双胍时不宜同时服用的中成药是

- A.
- B.
- C.

D.

E.

【正确答案】C

【答案解析】甘草、人参、鹿茸具有糖皮质激素样作用，可以促进糖原异生，升高血糖，与降糖药二甲双胍、消渴丸、阿卡波糖和胰岛素产生拮抗作用，导致降糖效果降低。

三、综合分析选择题

1. 某患者，女，38岁，表现有肋下刺痛，痛处固定，拒按，伴有面色晦暗、口唇青紫、脉涩。按照气血津液辨证，回答以下问题。

1) 该证属于

- A. 血虚证
- B. 血瘀证
- C. 血热证
- D. 血寒证
- E. 气不摄血证

【正确答案】B

【答案解析】“刺痛，痛处固定，拒按，口唇青紫，脉涩”等症状均是血瘀的典型症状，故应辨证为血瘀证。

2) 该证可见口干，其特点为

- A. 饮水量少，水入即吐
- B. 大渴喜冷饮
- C. 但欲漱水不欲咽
- D. 渴喜热饮
- E. 口虽干但不喜饮

【正确答案】C

【答案解析】血瘀证，可见的饮水特点是：口干，但欲漱水不欲咽。

3) 该证最有可能出现的舌象是

- A. 舌淡红
- B. 舌边有齿痕
- C. 舌红绛
- D. 舌红，苔黄
- E. 舌紫暗，有瘀点

【正确答案】E

【答案解析】血瘀可见的舌象特点是舌紫暗，有瘀斑、瘀点。

2. 患者肺胀病史20年，呼吸浅促难续，声低气怯，倚息不能平卧，胸闷如室，心慌，咳痰不爽，脉沉数无力。

1) 根据患者症状，应辨证为

- A. 痰浊阻肺证
- B. 痰热郁肺证

- C. 肾不纳气证
- D. 肺肾气虚证
- E. 风寒闭肺证

【正确答案】D

【答案解析】肺胀——肺肾气虚证

【症状】胸部膨满，呼吸浅短难续，声低气怯，甚则张口抬肩，不能平卧，咳嗽，痰白如沫，咳吐不利，胸闷心慌，形寒汗出，腰膝酸软，小便清长，或尿有余沥。舌淡或暗紫，脉沉细无力，或结、代。

2) 根据辨证证候，治疗时应采用的治法是

- A. 温肺散寒，降逆涤痰
- B. 清肺泄热，降逆平喘
- C. 涤痰祛瘀，泻肺平喘
- D. 补肺摄纳，降气平喘
- E. 温阳化饮，宣肺平喘

【正确答案】D

【答案解析】肺胀——肺肾气虚证【治法】补肺摄纳，降气平喘。

3) 治疗时，首选的方剂是

- A. 苏子降气汤合三子养亲汤
- B. 越婢加半夏汤
- C. 平喘固本汤合补肺汤
- D. 肾气丸合参蛤散
- E. 麻黄汤合华盖散

【正确答案】C

【答案解析】肺胀——肺肾气虚证【方剂应用】基础方剂：平喘固本汤（党参、五味子、冬虫夏草、胡桃肉、沉香、灵磁石、脐带、苏子、款冬花、法半夏、橘红）合补肺汤（人参、黄芪、熟地黄、五味子、紫菀、桑白皮）加减。

3. 某女，72岁，突然胸闷隐痛，时作时止，心悸气短，倦怠懒言，头晕，且近日常失眠多梦，舌体胖且边有齿痕，苔少。

1) 根据患者症状，应诊断为

- A. 郁证
- B. 肺胀
- C. 喘证
- D. 胸痹
- E. 痹证

【正确答案】D

【答案解析】胸痹是指以胸部闷痛，甚则胸痛彻背，短气、喘息不得卧为主症的疾病，轻者仅感胸闷如室，呼吸欠畅，重者则有胸痛，严重者心痛彻背，背痛彻心。

故患者“胸闷隐痛”，应诊断为胸痹。

2) 根据患者症状，应辨证为

- A. 气虚血瘀证
- B. 气滞血瘀证
- C. 气阴两虚证
- D. 寒凝心脉证
- E. 阴血亏虚证

【正确答案】C

【答案解析】胸痹——气阴两虚证【症状】胸闷隐痛，时作时止，心悸气短，动则益甚，伴倦怠懒言，易汗出，头晕，失眠多梦。舌红或淡红，舌体胖且边有齿痕，苔薄白或少，脉细缓或结代。

3) 根据患者症状，治疗宜采用的治法是

- A. 益气活血，通脉止痛
- B. 理气活血，通脉止痛
- C. 通阳泄浊，豁痰宣痹
- D. 辛温散寒，宣通心阳
- E. 益气养阴，活血通脉

【正确答案】E

【答案解析】胸痹——气阴两虚证【治法】益气养阴，活血通脉。

4) 治疗宜选用的中成药是

- A. 通心络胶囊
- B. 复方丹参滴丸
- C. 冠心苏合丸
- D. 冠心生脉口服液
- E. 速效救心丸

【正确答案】D

【答案解析】胸痹——气阴两虚证可选用的中成药有益心胶囊、益心舒胶囊、益心通脉颗粒、冠心生脉口服液、洛布桑胶囊。

4. 某女，45岁。患有类风湿关节炎，长期服用解热镇痛药，近期咽喉肿痛，牙痛，邻居介绍服用新癬片。药师询问患者一般情况和用药目的后，结合患者既往治疗情况，阻止了该患者购买新癬片。

1) 因为新癬片含有解热镇痛作用的西药组分，为防止重复用药，药师阻止了患者购药。新癬片所含有的西药组分是

- A. 双氯芬酸
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 布洛芬
- D. 吲哚美辛
- E. 安乃近

【正确答案】D

【答案解析】新癬片中所含的西药组分是吲哚美辛。

2) 药师进一步说明，若加用新癬片，造成解热镇痛药重复使用，会加大不良反应发生的可能性，关于该药发生不

不良反应的说法, 错误的是

- A. 有头痛、眩晕、困倦等中枢神经系统反应
- B. 有恶心、呕吐、消化不良等胃肠道反应
- C. 有粒细胞增多等造血系统损害
- D. 可引起肝肾损害
- E. 有皮疹、哮喘等过敏反应

【正确答案】 C

【答案解析】 含吲哚美辛的中成药吲哚美辛的不良反应发生率高达 35%~50%，其中约 20% 的患者常因不能耐受而被迫停药。常见的不良反应包括如下几个方面。

- (1) 胃肠道反应：如恶心、呕吐、厌食、消化不良、胃炎、腹泻，偶有胃溃疡、穿孔、出血。
- (2) 中枢神经系统反应：头痛、眩晕、困倦，偶有惊厥、周围神经痛、晕厥、精神错乱等。
- (3) 造血系统损害：可有粒细胞、血小板减少，偶有再生障碍性贫血。
- (4) 过敏反应：常见为皮疹、哮喘、呼吸抑制、血压下降等。
- (5) 可引起肝肾损害。

3) 药师向患者介绍, 服用该类药的注意事项, 正确的是

- A. 孕妇慎用
- B. 肝肾功能不全者慎用
- C. 哺乳期妇女慎用
- D. 精神病患者慎用
- E. 溃疡病患者慎用

【正确答案】 B

【答案解析】 溃疡病、哮喘、帕金森病、精神病患者、孕妇、哺乳期妇女禁用；14 岁以下儿童一般不用；老年患者、心功能不全、高血压病、肝肾功能不全、出血性疾病患者慎用；且不宜与阿司匹林、丙磺舒、钾盐、氨苯蝶啶合用。

5. 患者用香加皮、当归、蛇类自制药酒, 服用后出现恶心、呕吐等症状, 继而出现心律失常等严重症状, 遂送往医院就诊, 被诊断为香加皮的中毒反应。

1) 《中国药典》规定, 香加皮为有毒饮片, 其用量应控制在

- A. 2~5g
- B. 3~6g
- C. 3~9g
- D. 1.5~3g
- E. 0.3~0.6g

【正确答案】 B

【答案解析】 香加皮为有毒饮片, 用量为 3~6g, 在服用时不宜过量。

2) 服用香加皮出现心律失常等不良反应时, 不应采用哪些药物救治

- A. 镁制剂
- B. 铁制剂
- C. 铝制剂
- D. 钙制剂

E. 钾制剂

【正确答案】D

【答案解析】香加皮导致心律失常时，禁用钙剂、拟肾上腺素药。

3) 香加皮的别名有

A. 大腹皮

B. 桑皮

C. 五加皮

D. 北五加皮

E. 臭五加皮

【正确答案】D

【答案解析】香加皮的别名有北五加皮、杠柳皮。

4) 服用香加皮出现不良反应时，应采取的救治措施，叙述错误的是

A. 可以用甘草 15g，绿豆 30g，水煎服

B. 当出现心律失常时，禁用拟肾上腺素药

C. 出现心跳过缓时，注射去甲肾上腺素 0.5~1mg

D. 呼吸困难时，可用尼可刹米

E. 呼吸困难时，可用山梗菜碱

【正确答案】C

【答案解析】香加皮的不良反应救治：当出现心跳过缓时，注射阿托品 0.5~1mg，必要时重复注射。

6. 某女，56岁，因颈椎、腰椎疼痛服用仙灵骨葆胶囊，每日2次，每次3粒，约2个月后发现眼黄、尿黄、乏力、纳差。查肝生化指标：总胆红素(STB)63.1 μ mol/L，谷氨酸氨基转移酶(ALT)832U/L、门冬氨酸氨基转移酶(AST)744U/L；查肝炎病毒学、自身免疫性肝炎指标，均呈阴性。停用仙灵骨葆胶囊，给予保肝对症治疗。2周后肝生化指标：STB19.77 μ mol/L、ALT156U/L、AST73U/L。

1) 仙灵骨葆胶囊的功能是

A. 养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾

B. 祛风除湿，通络止痛，补益肝肾

C. 滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨

D. 补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络

E. 壮腰健肾，祛风活络

【正确答案】C

【答案解析】仙灵骨葆胶囊的功能是滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨。

2) 仙灵骨葆胶囊的君药是

A. 续断

B. 淫羊藿

C. 补骨脂

D. 丹参

E. 知母

【正确答案】B

【答案解析】仙灵骨葆胶囊中，淫羊藿辛散甘补温燥，善补肾壮阳、强筋健骨、祛风寒湿，故为君药。

3) 根据患者病例，仙灵骨葆胶囊的不良反应表现是

- A. 瞳孔极度缩小
- B. 肝损伤
- C. 肾损害
- D. 呼吸中枢麻痹
- E. 瞳孔散大

【正确答案】B

【答案解析】仙灵骨葆胶囊的不良反应主要包括胃肠道系统损害（占 55.6%）、皮肤及其附件损害（占 23.2%）、中枢及外周神经系统损害（占 5.5%）等，不良反应表现包括恶心、呕吐、皮疹、瘙痒、腹痛、腹泻、腹胀、心悸、胸闷、肝功能异常、肝细胞损害等。在严重不良反应报告中，肝胆系统损害所占比例明显高于总体报告中的相应比例，不良反应表现包括肝酶水平升高、胆红素水平升高、肝细胞损害等。肝胆系统损害多见于中老年患者，其中 45~64 岁患者占 40.5%，65 岁以上患者占 51.9%。大多数(约 60.7%)肝损伤不良反应报告中的用药时间在 30 天以上。

四、多项选择题

1. 面对没有特效药的新冠病毒，“免疫力”就是你目前最好的疫苗。所以增强体质，是提高正气抗邪能力的关键。未病先防中扶助正气，提高抗病能力的方法有

- A. 调摄精神，修身养性
- B. 锻炼身体，增强体质
- C. 顺应自然，起居有常
- D. 饮食有节，顾护脾胃
- E. 慎避外邪，防止六淫

【正确答案】ABCD

【答案解析】扶助正气，提高抗病能力：增强体质，是提高正气抗邪能力的关键。调摄精神，修身养性；顺应自然，起居有常；劳逸适度，积精全神；锻炼身体，增强体质；饮食有节，顾护脾胃；针灸保健等措施，是增强体质、提高正气抗邪能力的主要方法。

(1) 重视精神调养：人的情志活动与身体健康密切相关。心情舒畅，精神愉快，则气机调畅，气血和平，脏腑功能旺盛，抗病能力增强，对预防疾病的发生有积极的意义。因此，重视精神调养，是养生防病的一个重要方面。

(2) 加强身体锻炼：锻炼形体可以促进气血流畅，使人体肌肉筋骨强健，脏腑功能旺盛，并可借形动以济神静，从而使身体健康，益寿延年，同时也能预防疾病。

(3) 注意生活起居：遵循顺应自然四时变化规律的根本，倡导衣着饮食调配、起居有常、动静合宜等，以协调阴阳之气的变化，从而预防疾病的发生。

(4) 人工免疫：服用某些中药，或者接种疫苗等，都可提高人体抗邪能力，预防疾病的发生，也是未病先防的一项重要措施，尤其在预防疫病流行方面更有意义。

2. 治疗疝瘕可选用的中成药有

- A. 独活寄生合剂
- B. 疝瘕颗粒
- C. 天麻丸
- D. 四妙丸

E. 益肾蠲痹丸

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 尪痹常用的中成药有独活寄生合剂、尪痹颗粒、天麻丸、益肾蠲痹丸。

3. 蒙医中的“三秽”指的是

- A. 稠
- B. 津
- C. 稀
- D. 液
- E. 汗

【正确答案】 ACE

【答案解析】 三秽指的是稠、稀、汗三种排泄物，是七素生化过程中的产物，对诊治疾病有重要参照意义。

4. 合理用药的目的有

- A. 最大限度地发挥药物治疗效能
- B. 将中药和中成药的不良反应降低到最低限度，甚至于零
- C. 以最少的支出，冒最小的风险，得到最好的治疗效果
- D. 充分利用卫生资源减少浪费和患者经济负担
- E. 方便患者使用

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 合理用药的目的，首先就是要最大限度地发挥药物治疗效能，将中药和中成药的不良反应降低到最低限度，甚至于零。其次是使患者用最少的支出，冒最小的风险，得到最好的治疗效果。其三是最有效地利用卫生资源，减少浪费，减轻患者的经济负担。其四是方便患者使用所选药物。

5. 既含有朱砂，又含有雄黄的中成药有

- A. 局方至宝散
- B. 速效牛黄丸
- C. 紫金锭
- D. 七珍丸
- E. 人参再造丸

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 人参再造丸中只含有朱砂，不含有雄黄，故不选 E。

6. 含马来酸氯苯那敏成分中成药的注意事项有

- A. 有嗜睡、疲劳乏力等不良反应
- B. 过量易引发大量汗出而引起虚脱
- C. 服药期间，不得驾驶车船、登高作业或操作危险的机器
- D. 用于各种过敏性疾病，并与解热镇痛药配伍用于感冒
- E. 对流感病毒等多种病毒增殖期的各个环节都有作用

【正确答案】 ACD

【答案解析】 含马来酸氯苯那敏成分中成药的注意事项：氯苯那敏也称扑尔敏，常用其马来酸盐，用于各种过敏性疾病，并与解热镇痛药配伍用于感冒，但有嗜睡、疲劳乏力等不良反应。因此在服药期间，不得驾驶车船、登高作业或操作危险的机器。

7. 维 C 银翘片中含有的西药成分包括

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 马来酸氯苯那敏
- C. 咖啡因
- D. 维生素 C
- E. 异戊巴比妥

【正确答案】 ABD

【答案解析】 维 C 银翘片中含有的西药成分有对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、维生素 C。

8. 药物警戒涉及的范围包括

- A. 草药、传统药物
- B. 辅助用药
- C. 生物制品
- D. 血液制品
- E. 医疗器械及疫苗

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 根据 WHO 的指南性文件，药物警戒涉及的范围已经扩展到草药、传统药物、辅助用药、生物制品、血液制品、医疗器械及疫苗等。

9. 临床用药时存在的发生用药错误的风险因素有

- A. 管理制度落实不到位，缺少专职的管理机构和人员，未建立正确的用药安全文化
- B. 对易发生的用药错误在信息系统中没有提示
- C. 外用药、内服药等不同类别的药品未分开摆放
- D. 工作人员风险意识不强，未能严格遵守规章制度和标准化操作规程
- E. 看似易混淆药品未分开摆放并设置特殊警示标识

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 发生用药错误的风险因素

1. 管理因素 包括管理制度落实不到位，缺少专职的管理机构和人员，未建立正确的用药安全文化等因素。科学的管理可以有效降低用药风险，如在防范用药错误过程中，从系统观出发，从组织机构的角度系统设计防御错误的机制，可以有效减少犯错误的环境和机会。即错误发生后，关键是弄清楚为什么出现这些问题以及如何防范差错的再次发生。

2. 流程因素 包括医疗机构内部缺乏有效沟通，临床治疗和用药的各环节衔接不畅，从医生开具处方到患者用药的过程中系统信息的传递发生差错或药品信息未能及时更新，对易发生的用药错误在信息系统中没有提示等。

3. 环境因素 如工作空间狭小，药品或给药装置等堆放混乱，外用药、内服药等不同类别的药品未分开摆放，工作环境嘈杂拥挤，噪声污染较大等。

4. 人员因素 包括人力资源不足，人员知识结构欠缺，且缺乏系统规范的培训，工作人员风险意识不强，未能严格遵守规章制度和标准化操作规程等。

5. 药品因素 包括药品的外观、包装、标签、名称等相近，各听似、看似易混淆药品未分开摆放并设置特殊警示标识，特定剂型、特殊用法药品未与普通药品区分管理，近效期药品未及时更新，药品储存条件不足等。

10. 使用乌头类药物引起中毒的原因有

- A. 过量服用
- B. 泡酒服用
- C. 使用生品
- D. 煎煮时间太短
- E. 个体差异引起蓄积性中毒

【正确答案】ABCDE

【答案解析】使用乌头类药物的中毒原因有:

- (1) 过量服用为主要原因。
- (2) 用法不当, 如煎煮时间太短或生用。
- (3) 泡酒服用。
- (4) 个体差异引起蓄积性中毒。

