

2020年《中药学综合知识与技能》模考大赛（二）

关注【正保医学教育网执业药师考试】公众号
及时获取更多执业药师考试资讯！



一、最佳选择题

1. 在患者入院、转科和出院时，药师通过核对医嘱，比较患者目前的整体用药情况与医嘱是否一致，以保证患者用药安全的过程是

- A. 药物重整
- B. 中药知识科普
- C. 中药药物警戒
- D. 中药药学信息服务
- E. 临方炮制研究

【正确答案】A

【答案解析】药物重整（medicationreconciliation）是指在患者入院、转科和出院时，药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱，比较患者目前的整体用药情况（包括处方药、非处方药、营养补充剂等）与医嘱是否一致，以保证患者用药安全的过程。其目的是获取和确认患者的既往用药史，消除故意的/非故意的处方不一致，做好用药评估，预防医疗过程中的药品不良事件，避免漏服药物、重复用药、剂量错误和药物不良相互作用等。

2. 保存了大量的民间验方，也是中国古代收方最多的方书是

- A. 《备急千金要方》
- B. 《肘后备急方》
- C. 《太平圣惠方》
- D. 《普济方》
- E. 《重修政和本草》

【正确答案】D

【答案解析】《普济方》收方61739首，原有插图239幅，保存了大量的民间验方。是中国古代收方最多的方书，为研究复方用药提供了极为珍贵的资料。朱为医药学的发展做出了较大的贡献，使明初及其以前的医药资料得以保存。今有铅印本共十册，仅有文无图。十册铅印本是以《四库全书》版排印，共1960论，2175卷，778法，载方61739首。

3. 对胃肠道有刺激性的药物忌苦寒伤胃药，服用方法是

- A. 饭前服
- B. 饭后服

- C. 清晨服
- D. 睡前服
- E. 饭中服

【正确答案】B

【答案解析】饭后服：对胃肠道有刺激的药物及苦寒伤胃之药宜饭后服；病在胸膈以上，如头痛、眩晕、目疾、咽痛等宜饭后服，使药效停留于上焦，便于发挥药效。

4. 临床上感冒由于病因病机和患者体质的不同，因而有辛凉解表、辛温解表、益气解表等相应治法，主要依据是
- A. 体征不同
 - B. 症状不同
 - C. 证候不同
 - D. 病机相同
 - E. 诊法不同

【正确答案】C

【答案解析】中医认为，同一种疾病可以包括几种不同的证，不同的疾病在其发展过程中可以出现相同的证，因此在临床治疗中往往采取“同病异治”或“异病同治”的方法。“同病异治”，是指同一种疾病，由于发病的时间、地区及患者机体的反应不同，或处于不同的发展阶段，所表现的证不同，因而治法就各异。

5. 某男，19岁，形体偏瘦，面色红润，精力旺盛，喜饮冷水，易出汗，性格外向，喜动，易急躁。其体质类型应辨为
- A. 气郁质
 - B. 阳虚质
 - C. 偏阳质
 - D. 偏阴质
 - E. 阴阳平和质

【正确答案】C

【答案解析】偏阳质是指具有代谢相对亢奋、身体偏热、多动、好兴奋等特性的体质类型。体质特征为：形体适中或偏瘦，但较结实；面色多略偏红或微苍黑，或呈油性皮肤，皮肤易生疮疖；食量较大，消化吸收功能健旺，大便易干燥，小便易黄赤；平素畏热喜冷，耐冬不耐夏，或体温略偏高；动则易出汗，口渴喜冷饮；精力旺盛，动作敏捷，反应灵敏，性欲较强，喜动好强；性格外向，易急躁；唇、舌偏红，苔薄易黄，脉象多数或细弦。故本题答案选C。

6. 可导致不思饮食、脘腹胀满等症，妨碍脾气运化功能的情志活动是
- A. 怒
 - B. 喜
 - C. 思
 - D. 悲
 - E. 恐

【正确答案】C

【答案解析】情志所伤，主要影响脏腑气机，使其紊乱。主要的病理变化是：“怒则气上”、“喜则气缓”、“悲则气消”、“恐则气下”、“惊则气乱”、“思则气结”。

7. 某男，10岁。常在熟睡时不自主地排尿，属于气的哪项功能失常
- A. 推动作用
 - B. 温煦作用

- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 气化作用

【正确答案】D

【答案解析】气的固摄作用，主要是对于精、血、津液等物质具有防止其无故流失，以及维护脏腑器官各自位置的相对恒定等作用。具体表现在：固摄血液，即维持血液在脉管内循环，防止逸出脉外；固摄汗液、尿液、唾液、胃液、肠液等正常物质分泌和排泄，防止其无故外泄和流失，从而维持体内水液代谢的相对平衡；维持脏腑器官位置的稳定，使之保持正常的生理活动和脏腑之间功能的相互协调，维持胎儿在胞宫内的安定和正常发育等。

8. 奇经八脉中，被称为“阴脉之海”的经脉是

- A. 督脉
- B. 任脉
- C. 带脉
- D. 冲脉
- E. 阴维脉

【正确答案】B

【答案解析】任脉的基本功能

- (1) 调节阴经气血，故称“阴脉之海”。
- (2) 主持妊养胞胎。

9. 患者在原有壮热、面红、气粗、烦躁、舌红、脉数大有力等邪热内盛表现的基础上，又出现四肢厥冷、脉象沉伏等症，其病机为

- A. 阴损及阳
- B. 阳损及阴
- C. 阴盛格阳
- D. 阳盛格阴
- E. 阴阳亡失

【正确答案】D

【答案解析】阳盛格阴：阳盛格阴，是指邪热过盛，深伏于里，阳气被遏，郁闭于内，不能外透布达于肢体，从而形成阴阳排斥，而格阴于外，表现为真热假寒的病机变化。病变本质是阳热内盛，临床可见身热、面红、气粗、烦躁等症状；又突然出现四肢厥冷(但身热不恶寒)、脉象沉伏(但沉数有力)等假寒之象。

10. 面、目、身俱黄，且黄而鲜明如橘子色者，称为

- A. 萎黄
- B. 黄胖
- C. 黄疸
- D. 阳黄
- E. 阴黄

【正确答案】D

【答案解析】面、目、身俱黄，称为黄疸，其中黄而鲜明如橘子色者，称为阳黄，多属湿热。

11. 八纲辨证中，寒热证候主要辨证的是

- A. 疾病属性
- B. 疾病部位
- C. 疾病原因

D. 病势趋向

E. 邪正盛衰

【正确答案】A

【答案解析】寒热用以分别疾病的属性。

12. 患者卧床不起，瘦削已至大肉脱失，其临床意义是

A. 阴虚火旺

B. 形盛气虚

C. 胃火亢盛

D. 精气衰竭

E. 心阳虚衰

【正确答案】D

【答案解析】瘦削已至大肉脱失的程度，每见于精气衰竭的患者。

13. 某男，33岁。突然出现片状脱发，其临床意义是

A. 瘀血阻络

B. 血寒不通

C. 精血不足

D. 血虚受风

E. 肾虚精亏

【正确答案】D

【答案解析】望头发：主要望发的质和色的变化。如发稀疏易落，或干枯不荣，多为精血不足之证；突然出现片状脱发，多属血虚受风；年少落发，不属于肾虚，便属于血热。青年白发，无其他病象者不属病态。头发的质和色与家族遗传也直接相关。

14. 寒热在辨证中的主要意义是

A. 辨病位的纲领

B. 辨病因的纲领

C. 辨病性的纲领

D. 辨标本的纲领

E. 辨邪正的纲领

【正确答案】C

【答案解析】寒热用以分别疾病的属性。

15. 某女，43岁。症见肋肋胀痛，小便黄而浑浊，带下色黄，舌红苔黄腻。辨析其证候是

A. 脾胃湿热证

B. 痰火扰心证

C. 肝胆湿热证

D. 肝气郁结证

E. 寒湿痹阻证

【正确答案】C

【答案解析】肝胆湿热证临床表现，常见肋肋满闷疼痛，黄疸，小便短赤，或小便黄而浑浊，或带下色黄腥臭，外阴瘙痒，或睾丸肿痛，红肿灼热，舌苔黄腻，脉弦数。一般以肋肋胀痛，身目发黄或阴部瘙痒，带下黄臭，舌红苔黄腻为辨证要点。

16. 早期诊断急性心肌梗死(AMI)的灵敏指标之一是

- A. AMY
- B. CK
- C. BU
- D. UA
- E. ALP

【正确答案】B

【答案解析】肌酸激酶(CK)为早期诊断急性心肌梗死(AMI)的灵敏指标之一。

17. 患者出现腹部冷痛、渴喜热饮、舌淡苔白、脉沉迟等症,应采取的治则治法是

- A. 寒者热之
- B. 热者寒之
- C. 阳病治阴
- D. 阴病治阳
- E. 阴阳双补

【正确答案】A

【答案解析】根据患者症状为“实寒证”,故应采用寒者热之的治法。

18. 肺癆咳嗽用滋养肺肾之阴的方法来治疗,属于

- A. 因人制宜
- B. 因时制宜
- C. 急则治其标
- D. 缓则治其本
- E. 标本兼治

【正确答案】D

【答案解析】肺癆咳嗽,其本多为肺肾阴虚,应滋养肺肾之阴以治其本。治疗热病后期,阴伤液亏,应养胃滋肾进行治疗。

19. 可参考中医癃闭来辨证论治的西医疾病是

- A. 泌尿系感染
- B. 尿路结石
- C. 前列腺炎
- D. 尿潴留
- E. 尿道综合征

【正确答案】D

【答案解析】西医学的尿潴留及无尿症,可参考中医上的癃闭来辨证论治。其余选项均可参考中医上的淋证来辨证论治。

20. 某男,25岁,因腹泻就诊。症见腹痛肠鸣,泻下粪便臭如败卵,伴有未消化食物,泻后痛减,暖腐吞酸,不思饮食,舌苔厚腻,脉滑,治宜选用的方剂是

- A. 保和丸
- B. 参苓白术散
- C. 四神丸
- D. 葛根芩连汤
- E. 藿香正气水

【正确答案】A

【答案解析】泄泻——食滞肠胃证【症状】腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，泻下伴有不消化食物，脘腹胀满，暖腐吞酸，不思饮食。舌淡红，苔垢浊或厚腻，脉滑实。

【方剂应用】基础方剂：保和丸(神曲、山楂、茯苓、半夏、莱菔子、陈皮、连翘、麦芽)加减。

21. 某男，28岁，患粉刺，症见丘疹色红，有痒痛，时有脓疱，伴口渴喜饮，大便秘结，小便短赤，舌质红，苔薄黄，脉弦滑。治宜选用的方剂是

- A. 二陈汤
- B. 枇杷清肺饮
- C. 茵陈蒿汤
- D. 防风通圣散
- E. 桃红四物汤

【正确答案】B

【答案解析】粉刺——肺经风热证【症状】丘疹色红，或有痒痛，或有脓疱；伴口渴喜饮，大便秘结，小便短赤。舌质红，苔薄黄，脉弦滑。

【方剂应用】基础方剂：枇杷清肺饮(人参、枇杷叶、桑白皮、生甘草、黄连、黄柏)加减。

22. 患者，女，23岁，未婚。近2年来每次月经提前1~2周，量多少不定，色紫红有块，质稠，且伴有胸胁胀满，少腹胀痛，心烦易怒，脉弦数等症，根据患者症状可诊断为

- A. 月经先期-肝郁血热证
- B. 月经先后无定期-肾虚证
- C. 月经先后无定期-肝郁证
- D. 月经先期-肾气虚证
- E. 气滞血瘀型月经后期

【正确答案】A

【答案解析】月经先期——肝郁血热证【症状】月经周期提前，经量或多或少，经色深红或紫红，质稠，经行不畅，或有块；或少腹胀痛，或胸闷胁胀，或乳房胀痛，或心烦易怒，口苦咽干。舌红，苔薄黄，脉弦数。

23. 某患儿，6岁。面色萎黄，形体消瘦，神疲肢倦，不思饮食，腹满喜按，大便稀溏，夹有未消化的食物，治宜选用的方剂是

- A. 消乳丸
- B. 健脾丸
- C. 保和丸
- D. 香连丸
- E. 归脾汤

【正确答案】B

【答案解析】积滞——脾虚夹积证【症状】面色萎黄，形体消瘦，神疲肢倦，不思乳食，食则饱胀，腹满喜按，大便溏稀酸腥，夹有乳片或不消化食物残渣。舌质淡，苔白腻，脉细滑，或指纹淡滞。

【方剂应用】基础方剂：健脾丸(人参、白术、陈皮、麦芽、山楂、神曲、枳实)加减。

24. 某患者，近日出现了纳呆，食无味，或拒食，形体尚可，嗝气泛恶、胸闷脘痞、大便不调，舌苔薄白，脉尚有力等症，医生诊断其患有厌食，中医上应辨证为

- A. 脾肾阳虚证
- B. 脾不统血证
- C. 脾失健运证

D. 脾胃气虚证

E. 胃阴不足证

【正确答案】C

【答案解析】厌食——脾失健运证【症状】食欲不振，厌恶进食，食而乏味，或伴胸脘痞闷，暖气泛恶，偶尔多食则脘腹饱胀，大便不调，形体尚可，精神如常。舌淡红，苔薄白或薄腻，脉尚有力。

25. 功能为清肝热，利胆退黄的藏成药方剂是

A. 七十味珍珠丸

B. 二十五松石丸

C. 二十五珊瑚丸

D. 五味渣驯丸

E. 八味沉香散

【正确答案】D

【答案解析】五味渣驯丸的功能是清肝热，利胆退黄。故本题选 D。

26. 根据蒙医传统用药的“服药十则”，补养药的服用时间是

A. 食前服

B. 食间服

C. 睡前服

D. 空腹服

E. 夹食服

【正确答案】A

【答案解析】蒙医传统用药的“服药十则”是：治疗寒证及驱虫药，早晨空腹服；补养或下清“赫依”（通便、通经）药，食前服；上行“赫依”（理气）药，食间服；司命“赫依”（镇静）药，食药交替服；平喘、祛痰或催吐药，不定期服；止逆药，与食混服；止噎或开胃药，夹食服（饭前饭后各一半）；治“巴达干”病或毒剧麻药及催眠药，睡前服。

27. 由于医疗需要，医师为了表达用药意图和要求，在中药处方中常应用不同的术语，对药品的产地、炮制、质量、调剂和煎煮等特殊要求加以注明。处方对药品品质提出要求的处方药名是

A. 怀山药

B. 田三七

C. 广藿香

D. 江枳壳

E. 子黄芩

【正确答案】E

【答案解析】药材的品质优劣直接影响到疗效，历代医家都非常重视药材的质量优劣，医师处方对药品质量提出了要求。如明天麻、子黄芩、左牡蛎、左秦艽、金毛狗脊、鹅根实、马蹄决明、九孔石决明、净山楂等。

28. 大黄（庶虫）虫丸活血破瘀，通经消癥，治疗瘀血内停所致的癥瘕、闭经，方中的大黄应选用

A. 生大黄

B. 酒大黄

C. 熟大黄

D. 大黄炭

E. 醋大黄

【正确答案】C

【答案解析】大黄功用泻下攻积、清热泻火、凉血解毒、逐瘀通络，大承气汤泻下用生大黄；大黄?虫丸或加减方破瘀消癥则宜用熟大黄。

29. 乌鸡白凤丸治疗妇女气血不足，月经不调时，为增强乌鸡白凤丸养血调经之功，常配伍

- A. 金匱肾气丸
- B. 妇科千金片
- C. 附子理中丸
- D. 香砂六君丸
- E. 八珍益母丸

【正确答案】D

【答案解析】以乌鸡白凤丸为主治疗妇女气血不足，月经不调，配以香砂六君丸为辅，“相使”为用，开气血生化之源，增强乌鸡白凤丸养血调经之功。

30. 下列中药处方中马蹄决明的正名是

- A. 石决明
- B. 草决明
- C. 决明子
- D. 茺蔚子
- E. 萝卜子

【正确答案】C

【答案解析】决明子的别名有草决明、马蹄决明。

31. 2015版《中国药典》载有毒性药材和饮片共计83种，其中属于大毒饮片的中药是

- A. 天仙子
- B. 山豆根
- C. 天南星
- D. 土鳖虫
- E. 北豆根

【正确答案】A

【答案解析】2015版《中国药典》载有毒性药材和饮片共计83种，其中有大毒饮片10种，如川乌、马钱子、天仙子、巴豆、草乌、斑蝥等。故本题选A。口诀为：天仙养马，草豆搬屋打粉。天仙=天仙子，马=马钱子，草=草乌，豆=巴豆，搬=斑蝥，屋=川乌。

32. 某女，27岁，妊娠5个月，因上火导致咽喉肿痛，口苦，小便黄赤，便秘；舌红，苔薄黄，脉弦数。该患者应慎用的中成药是

- A. 咽喉消炎丸
- B. 牛黄上清丸
- C. 牛黄消炎片
- D. 芩翘口服液
- E. 牛黄解毒丸

【正确答案】B

【答案解析】妊娠慎用中成药，重点掌握以下品种：牛黄清心丸、牛黄上清丸、黄连上清丸、防风通圣丸、伤湿止痛膏、枣仁安神胶囊、附子理中丸、妇科分清片等。

33. 湿度是影响药物质量的一个重要因素, 不仅可引起药物的物理和化学变化, 如含水量, 外观形态, 化学成分发生改变等, 而且能影响微生物的繁殖及害虫的生长。一般中药炮制品的含水量控制和贮藏环境的要求应是

- A. 绝对含水量应控制在 7%~13%, 贮存环境的相对湿度应控制在 35%~75%
- B. 绝对含水量应控制在 7%~13%, 贮存环境的相对湿度应控制在 30%~70%
- C. 绝对含水量应控制在 7%~15%, 贮存环境的相对湿度应控制在 35%~75%
- D. 绝对含水量应控制在 7%~15%, 贮存环境的相对湿度应控制在 35%~70%
- E. 绝对含水量应控制在 7%~13%, 贮存环境的相对湿度应控制在 40%~70%

【正确答案】A

【答案解析】一般炮制品的绝对含水量应控制在 7%~13%, 贮藏环境的相对湿度应控制在 35%~75%。

34. 生姜可温胃止呕, 黄芩药性寒凉, 可削弱生姜的温胃作用, 此配伍属

- A. 相须配伍
- B. 相使配伍
- C. 相恶配伍
- D. 相反配伍
- E. 相畏配伍

【正确答案】C

【答案解析】生姜可温胃止呕, 黄芩药性寒凉, 可削弱生姜的温胃作用, 即生姜恶黄芩, 两药应避免同用。

35. 中药注射剂在临床安全合理使用问题值得医师、护士、药师的关注。以下有关中药注射剂合理应用的基本原则, 说法错误的是

- A. 注射给药见效快, 在临床应用时应优先选择
- B. 中药注射剂应单独使用, 禁忌与其他药品混合配伍使用
- C. 临床使用应辨证用药, 严格按照药品说明书规定的功能主治使用, 禁止超功能主治用药
- D. 用药过程中, 应密切观察用药反应, 特别是开始 30 分钟。发现异常立即停药, 采用积极救治措施, 救治患者
- E. 选用中药注射剂应严格掌握适应证

【正确答案】A

【答案解析】中药注射剂合理应用基本原则

1. 选用中药注射剂应严格掌握适应证, 合理选择给药途径。能口服给药的, 不选用注射给药; 能肌内注射给药的, 不选用静脉注射或滴注给药。必须选用静脉注射或滴注给药的应加强监测。
2. 辨证施药, 严格掌握功能主治。临床使用应辨证用药, 严格按照药品说明书规定的功能主治使用, 禁止超功能主治用药。
3. 严格掌握用法用量及疗程。按照药品说明书推荐剂量、调配要求、给药速度、疗程使用药品。不超剂量、过快滴注和长期连续用药。
4. 严禁混合配伍, 谨慎联合用药。中药注射剂应单独使用, 禁忌与其他药品混合配伍使用。谨慎联合用药, 如确需联合使用其他药品时, 应谨慎考虑与中药注射剂的间隔时间以及药物相互作用等问题。
5. 用药前应仔细询问过敏史, 对过敏体质者应慎用。
6. 对老人、儿童、肝肾功能异常患者等特殊人群和初次使用中药注射剂的患者应慎重使用, 加强监测。对长期使用者, 在每疗程间要有一定的时间间隔。
7. 加强用药监护。用药过程中, 应密切观察用药反应, 特别是开始 30 分钟。发现异常立即停药, 采用积极救治措施, 救治患者。

中药注射剂应单独开具处方。故 E 说法错误。

36. 属于中成药配伍应用, 一药为主, 一药为辅, 辅药能提高主药的功效的是

- A. 更衣丸与内消瘰疬丸

- B. 二陈丸与平胃散
- C. 急支糖浆与珍菊降压片
- D. 银黄片与双黄连口服液
- E. 镇咳宁胶囊与心通口服液

【正确答案】B

【答案解析】二陈丸燥湿化痰为主药，治疗湿痰咳嗽；而脾为生痰之源，辅以平胃散同用，燥湿健脾，可明显增强二陈丸燥湿化痰之功。

37. 治疗肾盂肾炎时，既可防止胃肠道反应，又可保留呋喃唑酮的杀菌作用的中药是

- A. 黄连
- B. 金银花
- C. 甘草
- D. 麻黄
- E. 黄柏

【正确答案】C

【答案解析】甘草与呋喃唑酮联用，在治疗肾盂肾炎时，既能防止胃肠道反应，又起到了保留了呋喃唑酮的杀菌作用。

38. 利胆中成药胆乐胶囊避免与下列哪种药物合用

- A. 利胆排石片
- B. 胆宁片
- C. 六应丸
- D. 大活络丹
- E. 天麻丸

【正确答案】C

【答案解析】胆乐胶囊中含有郁金，六应丸中含有丁香，根据十九畏“丁香莫与郁金见”得知，两者存在配伍禁忌，不宜联用。

39. 关于中成药之间配伍应用主要形式的说法，错误的是

- A. 功效不同的中成药配伍应用，辅药能够提高主药的功效
- B. 功效相似的中成药合理配伍应用，可起到协同增效作用
- C. 两药同用，一种中成药能够抑制另一种中成药的副作用
- D. 含有毒成分的中成药配伍应用，可起到以毒攻毒的作用
- E. 中成药配伍应用可采用内服与外用相结合的治疗法

【正确答案】D

【答案解析】含同种毒性成分，在临床应用中使用时其中一种即可。所以在几种含有有毒成分或相同成分的中成药联用时，应注意有毒成分或相同成分的“叠加”，以免引起不良反应。故D项叙述错误。

40. 香加皮不良反应的表现是

- A. 心律失常
- B. 水肿
- C. 血尿
- D. 皮肤糜烂
- E. 皮肤黄染

【正确答案】A

【答案解析】香加皮心血管系统：主要为心律失常，如心率减慢、早搏、房室传导阻滞等。动物毒性实验表明香加皮中毒后多表现为血压先升而后下降、心肌收缩力增强、每分钟心输出量增加，继而心输出量减弱、心律失常，乃至心肌纤颤而死亡。?

二、配伍选择题

1. A. 齿
- B. 发
- C. 骨
- D. 肉
- E. 爪

1) “血之余”是指

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】发，即头发，发的生机根于肾。肾精生血，血能生发，发的生长，赖血以养，故“发为血之余”。

2) “筋之余”是指

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】爪，即爪甲，包括指甲和趾甲。中医学认为，爪乃筋之延伸到体外的部分，故称“爪为筋之余”。

3) “骨之余”是指

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】肾在志为恐，在体为骨，齿为骨之余，其华在发，开窍于耳及前后二阴，在液为唾，与冬气相应。

2. A. 胃气
- B. 宗气
- C. 卫气

D. 元气

E. 营气

1) 根于肾, 通过三焦而流行于全身的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】D

【答案解析】元气根于肾, 通过三焦而流行于全身, 内至脏腑, 外达肌肤腠理。

2) 走息道以行呼吸、贯心脉以行气血的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】B

【答案解析】宗气的生理功能: 上走息道以行呼吸, 贯注心脉以行气血。故凡语言、声音、呼吸的强弱, 气血的运行, 肢体的寒温和活动能力, 视听功能, 心搏的强弱及其节律等, 皆与宗气盛衰有关。

3) 由水谷精气的精华部分所化生的气是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】E

【答案解析】营气, 又称“荣气”, 与卫气相对而言, 营气行于脉内而属阴, 故又有“营阴”之称。主要来源于脾胃所运化的水谷精气, 由水谷精气中的精华部分所化生。

4) 运行于脉外, 活动力特别强, 流动迅速的气是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】C

【答案解析】卫气活动力特别强, 流动迅速, 故不受脉管的约束, 可运行于皮肤、分肉之间, 布散于全身内外上下。

3. A. 癫痫
B. 失神
C. 痫病
D. 狂病
E. 假神

1) 突然跌倒、昏不知人、口吐涎沫、四肢抽动，多为

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】C

【答案解析】突然跌倒、昏不知人、口吐涎沫、四肢抽动，多属痰迷心窍、肝风内动的痫病。

2) 烦躁不宁、登高而歌、弃衣而走、打人毁物，多为

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】D

【答案解析】烦躁不宁、登高而歌、弃衣而走、呼号怒骂、打人毁物、不避亲疏，多属痰火扰心的狂病。

3) 表情淡漠、寡言少语、闷闷不乐，继而精神发呆，多为

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】A

【答案解析】表情淡漠、寡言少语、闷闷不乐、继而精神发呆、哭笑无常的，多为痰气凝结、阻蔽心神的癫痫。

4. A. 六磨汤
B. 黄芪汤
C. 麻子仁丸
D. 四神丸
E. 温脾汤

治疗便秘时

1) 某患者，男，22岁。大便艰涩，腹痛拘急，胀满拒按，胁下偏痛，手足不温，呃逆呕吐。舌苔白腻，脉弦紧。可选用的方剂是

- A.

- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】便秘——冷秘【症状】大便艰涩，腹痛拘急，胀满拒按，胁下偏痛，手足不温，呃逆呕吐。舌苔白腻，脉弦紧。

【方剂应用】基础方剂：温脾汤（附子、人参、大黄、干姜、甘草）合半硫丸（半夏、硫黄）加减。

2) 某患者，女，33岁，大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，或有身热，小便短赤。舌红，苔黄燥，脉滑数。可选用的方剂是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】便秘——热秘【症状】大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，或有身热，小便短赤。舌红，苔黄燥，脉滑数。

【方剂应用】基础方剂：麻子仁丸（麻子仁、芍药、枳实、大黄、厚朴、杏仁）加减。

3) 某患者，男，77岁。大便并不干硬，虽有便意，但排便困难，用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言。舌淡苔白，脉弱。可选用的方剂是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】便秘——虚秘【症状】大便并不干硬，虽有便意，但排便困难，用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言。舌淡苔白，脉弱。

【方剂应用】基础方剂：黄芪汤（黄芪、陈皮、火麻仁、白蜜）加减。

4) 某患者，女，25岁。因失恋情绪低迷，出现便出不爽，胸胁痞满，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，纳食减少。舌苔薄腻，脉弦。可选用的方剂是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】便秘——气秘【症状】大便干结，或不甚干结，欲便不得出，或便出不爽，胸胁痞满，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，纳食减少。舌苔薄腻，脉弦。

【方剂应用】基础方剂：六磨汤(沉香、木香、槟榔、乌药、枳壳、大黄)加减。

- 5. A. 甘草
- B. 麻黄
- C. 黄药子
- D. 马兜铃
- E. 麦芽

1) 体虚多汗者忌用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】体虚多汗者忌用发汗力较强的麻黄。

2) 湿盛胀满、水肿者忌用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】湿盛胀满、水肿患者，忌用甘草。

3) 肝功能不全者忌用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】有肝功能障碍者，忌用黄药子。

4) 肾功能不全者忌用

- A.
- B.
- C.
- D.

E.

【正确答案】D

【答案解析】肾病患者，忌用马兜铃。

- 6. A. 瓜蒌、黄连
- B. 地骨皮、千年健
- C. 篇蓄、瞿麦
- D. 龙骨、艾炭
- E. 玄明粉、京三棱

1) 属于配伍禁忌的药物，不能装于一斗或上下药斗中的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】根据十九畏“牙硝难合荆三棱”得知，牙硝（包括芒硝、玄明粉）是不能与京三棱放在一起的。

2) 按处方常用的“药对”药物排列，可同放于一个斗中的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】将同一处方中经常一起配伍应用的，如“相须”“相使”配伍的饮片，处方常用的“药对”药物可同放于一个斗中。如瞿麦、篇蓄等。

- 7. A. 先煎
- B. 后下
- C. 冲服
- D. 包煎
- E. 兑服

某男，66岁。半身不遂，患侧僵硬拘挛，头晕头痛，面赤耳鸣，舌红，苔薄黄，脉弦。中医辨证为肝阳上亢，治以天麻钩藤饮加减，组方为：药用天麻，钩藤，石决明，牛膝，桑寄生，栀子，黄芩，益母草，茯神，竹沥水。执业药师发药时，需向患者交待正确的煎药和服用方法。

1) 处方中竹沥水应采用的是

- A.
- B.
- C.

D.

E.

【正确答案】E

【答案解析】对于液体中药，放置其他药中煎煮，往往会影响其成分，故应待其他药物煎煮去渣取汁后，再行兑入服用。如黄酒、竹沥水、鲜藕汁、姜汁、梨汁、蜂蜜等。

2) 处方中的石决明应采用的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】A

【答案解析】先煎的目的是为了延长药物的煎煮时间，使药物中难溶性成分充分煎出。一般来说，需先煎的饮片，经武火煮沸后文火煎煮 10-15 分钟后再与用水浸泡过的其他药物合并煎煮。需要先煎的药物有以下几类。

(1) 矿物、动物骨甲类饮片。因其质地坚硬，有效成分不易煎出，故应打碎先煎约 15 分钟，方可与其他药物同煎。如蛤壳、紫石英、石决明、珍珠母、瓦楞子、鳖甲、龟甲、鹿角霜、磁石、牡蛎、生石膏、赭石、自然铜等。水牛角宜先煎 3 小时以上。

(2) 某些有毒饮片。一般应先煎 1~2 小时达到降低毒性或消除毒性的目的。如含有毒成分乌头碱的川乌、草乌或制附子，经 1~2 小时的煎煮后，可使乌头碱分解为乌头次碱，进而分解为乌头原碱，使毒性大为降低。

3) 处方中的钩藤应采用的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】B

【答案解析】后下的目的是为了缩短药物的煎煮时间，减少药物因煎煮时间过久所造成的成分散失。一般来说，在其他群药文火煎煮 15~20 分钟后，放入需后下的饮片再煎煮 5~10 分钟即可。需要后下的药物有以下几类。

(1) 气味芳香类饮片，因其含挥发性成分故不宜煎煮时间过久，以免其有效成分散失，一般在其他群药煎好前 5~10 分钟入煎即可。如降香、沉香、薄荷、砂仁、白豆蔻、鱼腥草等。

(2) 久煎后有效成分易被破坏的饮片，一般在其他群药煎好前 10~15 分钟入煎即可。如钩藤、苦杏仁、徐长卿、生大黄、番泻叶等。

8. A. 牡丹皮

B. 细辛

C. 红花

D. 灯心草

E. 吴茱萸

1) 宜与山药同贮的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】牡丹皮与泽泻、山药同贮。

2) 宜与蛤蚧同贮的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮。

- 9. A. 生大黄
- B. 酒大黄
- C. 熟大黄
- D. 醋大黄
- E. 大黄炭

中药饮片炮制品在遣方中的正确使用, 关乎中医临床疗效, 对中药饮片的合理使用意义重大。

1) 当归龙荟丸泻火通便, 用于肝胆火旺, 心烦不宁, 头晕不眩等症的治疗。方中所用大黄为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】当归龙荟丸(《临床用药须知中药成方制剂卷》2015年版)

[组成] 龙胆酒炒大黄(酒炒) 芦荟黄连(酒炒) 黄芩(酒炒) 黄柏(盐炒) 栀子青黛当归(酒炒) 木香麝香

[功用] 泻火通便。

[主治] 用于肝胆火旺, 心烦不宁, 头晕目眩, 耳鸣耳聋, 胁肋疼痛, 脘腹胀痛, 大便秘结。

[用法] 口服。一次6g, 一日2次。

2) 温脾汤攻下冷积, 温补脾阳, 用于寒积里实证的治疗。方中所用大黄为

- A.
- B.
- C.
- D.

E.

【正确答案】A

【答案解析】温脾汤（《备急千金要方》）

[组成] 大黄当归干姜附子人参芒硝甘草

[用法] 上七味，以水七升，煮取三升，分服，一日三次。

[功用] 攻下冷积，温补脾阳。

[主治] 寒积里实证。腹痛便秘，脐下绞结，绕脐不止，手足不温，苔白不渴，脉沉弦而迟。

3) 大黄?虫丸活血破瘀，通经消癥，用于瘀血内停所致的癥瘕、闭经等症的治疗，方中所用大黄为

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】C

【答案解析】大黄?虫丸（《临床用药须知中药成方制剂卷》2015年版）

[组成] 熟大黄?虫炒水蛭制虻虫去翅足炒，蛭螬炒干漆煨桃仁地黄白芍黄芩苦杏仁炒甘草

[功用] 活血破瘀，通经消癥。

[主治] 用于瘀血内停所致的癥瘕、闭经，症见腹部肿块、肌肤甲错、面色暗黑、潮热羸瘦、经闭不行。

[用法与用量] 口服。水蜜丸一次3g，小蜜丸一次3~6丸，大蜜丸一次1~2丸，一日1~2次。

4) 十灰丸凉血止血，用于血热妄行所致吐血、衄血、血崩等症的治疗，方中所用大黄为

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】E

【答案解析】十灰丸（《临床用药须知中药成方制剂卷》2015年版）

[组成] 大蓟炒炭小蓟炒炭茜草炒炭白茅根炒炭荷叶煨炭侧柏叶炒炭棕榈煨炭栀子炒炭大黄炒炭牡丹皮炒炭

[功用] 凉血止血。

[主治] 用于血热妄行所致吐血、衄血、血崩。

[用法] 口服。一次3~9g，一日1~2次。

10. A. 川贝枇杷露与天麻丸

B. 附子理中丸与参茸卫生丸

C. 七厘散与血府逐瘀丸

D. 当归补血汤与牵正散

E. 牛黄解毒片与附子理中丸

1) 因配伍禁忌而不宜合用的药组是

A.

- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】治疗风寒湿痹证的大活络丸、尪痹冲剂、天麻丸、人参再造丸等均含有附子，而止咳化痰的川贝枇杷露、蛇胆川贝液、通宣理肺丸等分别含有川贝、半夏，依据配伍禁忌原则，若将上述两组合用，附子、乌头与川贝、半夏当属相反禁忌同用之列。

2) 因证候禁忌而不宜合用的药组是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】如附子理中丸与牛黄解毒片联用，附子理中丸系温中散寒之剂，适用于脾胃虚寒所致的胃脘痛、呕吐、腹泻等；而牛黄解毒片性质寒凉，为清热解毒泻火之剂，适用于火热毒邪炽盛于内而上扰清窍者，可见不加分析地盲目将两者合用是不适宜的。

- 11. A. 石菖蒲
- B. 补中益气汤
- C. 逍遥散
- D. 芍药甘草汤
- E. 钩藤散

1) 与西药催眠镇静药联用，既可提高对失眠症的疗效，又可逐渐摆脱对西药的依赖性的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】逍遥散或三黄泻心汤等与西药催眠镇静药联用，既可提高对失眠症的疗效，又可逐渐摆脱对西药的依赖性。

2) 与苯妥英钠等抗癫痫药联用，能提高抗癫痫的效果的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 石菖蒲、地龙与苯妥英钠等抗癫痫药联用，能提高抗癫痫的效果。

3) 与西药解痉药联用，可提高疗效的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 芍药甘草汤等与西药解痉药联用，可提高疗效。

4) 与抗胆碱酯酶药联用，治肌无力疗效较好的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 补中益气汤、葛根汤等具有免疫调节作用的中药与抗胆碱酯酶药联用，治肌无力疗效较好。

12. A. 人参归脾丸

B. 六味地黄丸

C. 补中益气丸

D. 生脉饮

E. 龟龄集

1) 老人阴虚宜选用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】

2) 老人阳虚宜选用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】

3) 老人心脾两虚宜选用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】

4) 老人肾阴虚宜选用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 老年人的体虚，也有阴虚、阳虚、气虚、血虚和心、肝、脾、肺、肾等不同脏器虚衰之区别。阴虚者选用清补型滋补剂，如大补阴丸；偏于阳虚者应服用温补型滋补剂，如龟龄集；肾阴虚老人宜服用六味地黄丸；心脾两虚老人宜服人参归脾丸。

13. A. 影响吸收

- B. 影响代谢
- C. 增加排泄
- D. 影响分布
- E. 减少排泄

1) 中西药联用时，七厘散与士的宁合用，可发生的药动学相互作用是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 含鞣质的中药（如大黄、虎杖、五倍子、石榴皮）、含鞣质的中成药（如牛黄解毒片、麻仁丸、七厘散）不宜与红霉素、士的宁、利福平同服，鞣质具有吸附作用，使红霉素、士的宁、利福平透过生物膜的吸收量减少。

2) 中西药联用时，红灵散与吡哆美辛合用，可发生的药动学相互作用是

- A.

- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】碱性中药（如煅牡蛎、煅龙骨、红灵散、女金丹、痧气散、乌贝散、陈香露白露片等）+尿液酸化药物（诺氟沙星、呋喃妥因、呋喃美辛、头孢类抗生素等）联用，排泄加快，使作用时间和作用强度降低。

- 14. A. 副作用
- B. 毒性作用
- C. 后遗作用
- D. 药物依赖性
- E. 变态反应

1) 用小金丸、西黄丸等引起的皮肤红肿、瘙痒等过敏反应，停药后即可逐渐消失的案例，属于

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】后遗作用：药物的后遗作用指停止用药后遗留下来的生物学效应。遗留的效应分可逆和不可逆两种情况，如长期大量服用关木通造成的肾损害，就是不可逆的，无法恢复的；服用小金丸、西黄丸等引起的皮肤红肿、瘙痒等过敏反应，停药后即可逐渐消失。遗留时间的长短也不同，有些时间短暂，如服用熊胆粉、大黄、番泻叶、黄连等苦寒泻火药物后，患者短期内出现的食欲减退等消化道不适症状；有些则后遗作用较为持久，如长期大量服用甘草出现的假性醛固酮增多症。

2) 临床利用大黄逐瘀通经的功效治疗瘀血肿痛，会导致腹泻的案例，属于

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】副作用：副作用是药物的固有反应，其发生机制往往是因为一种药物具有多种功效，治病时通常只利用其中一二种作用，而其他的作用就会成为副作用。例如临床利用大黄逐瘀通经的功效治疗瘀血肿痛，其泻下攻积的功效就会导致腹泻的副作用；利用麻黄宣肺平喘的功效治疗哮喘，其所含的麻黄碱具有升压作用，因而在用药过程中就可能对患者血压出现波动。通常来说，药物的治疗范围越广，选择性越低，其副作用就表现得越多。

3) 大量服用乌头、附子，可即刻出现口舌及全身麻木、呕吐、头昏、神志不清等症状，属于

- A.
- B.

- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】毒性作用：药物毒性作用的发生机制可能由于用药剂量过大或时间过长引起，也可能由患者对该种药物的敏感性较高导致。毒性反应可能在用药后立即发生，即急性毒性，如大量服用乌头、附子，可即刻出现口舌及全身麻木、呕吐、头昏、神志不清、手足抽搐、呼吸困难或衰竭，心律失常、血压下降和中枢神经系统功能紊乱等症状；也可能是长期用药蓄积中毒，即慢性毒性，如长期服用朱砂、雄黄等中药，即可导致汞、砷等重金属蓄积中毒，出现恶心、呕吐、腹痛腹泻等胃肠道症状及血尿、蛋白尿等肾损害。

4) 五味子、白芍、当归、丹参等可引起荨麻疹的案例，属于

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】变态反应：药物的过敏反应本质上是一种病理性免疫反应，过敏反应的发生机制往往与药物的药理作用和剂量大小无关，因而往往难以预料。过敏反应在所有中药药源性疾病中发病率最高，其发生机制可能与中药成分复杂，往往含有大量大分子半抗原物质，且大多为复方制剂等因素有关。中药引起的变态反应包括多种类型，如五味子、白芍、当归、丹参等可引起荨麻疹；虎杖、两面针等可引起药疹；蟾酥、苍耳子、蓖麻子可引起剥脱性皮炎；槐花、南沙参可引起丘状皮疹；黄柏、天花粉、大黄等可引起湿疹样药疹；清开灵注射液、双黄连注射液、参麦注射液、生脉注射液、香丹注射液、喜炎平注射液、丹参注射液、柴胡注射液等中药注射液可引起皮疹等过敏反应、过敏性哮喘、过敏性休克。

5) 连续使用罂粟壳以及含罂粟壳的中成药易致成瘾的案例，属于

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】药物依赖性：药物依赖性的发生机制可分为精神依赖性和生理依赖性。如部分患者长期服用番泻叶可产生生理依赖性，主要症状包括焦虑不安、全身疼痛、失眠、面热潮红、厌食、体温上升、呼吸频率加快、心率加快、呕吐、腹痛等。连续服用罂粟壳及含有罂粟壳的中成药易致成瘾，出现的症状兼有生理依赖性和精神依赖性。

- 15. A. 角弓反张，痉挛
- B. 牙关紧闭，心律失常
- C. 大汗，脱发，口唇糜烂
- D. 吐血、咯血、便血、尿血、黄疸
- E. 口腔粘膜充血，牙龈肿胀，少尿

1) 过量服用含有朱砂的药物会引起

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 含朱砂、轻粉、红粉的中成药的中毒表现：消化系统表现为恶心呕吐、腹痛腹泻、口中有金属味、流涎、口腔黏膜充血、牙龈肿胀溃烂等。

2) 过量服用含有雄黄的药物会引起

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 含雄黄的中成药中毒表现：各种出血症状，如吐血、咯血、眼结膜充血、鼻衄、便血、尿血等。

3) 过量服用含有马钱子的药物会引起

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 含有马钱子药物的中毒表现是：初期出现头晕、头痛、烦躁不安、面部肌肉紧张、吞咽困难；进而伸肌与屈肌同时做极度收缩，发生典型的士的宁惊厥、痉挛，甚至角弓反张，可因呼吸肌痉挛窒息或心力衰竭而死亡。

4) 过量服用含有乌头的药物会引起

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 含乌头类药物和含乌头类药物的中成药中毒表现是：口舌、四肢及全身麻木、头痛、头晕、精神恍惚、语言不清或小便失禁，继而四肢抽搐、牙关紧闭、呼吸衰竭等。

三、综合分析选择题

1. 某男, 45岁。胃脘疼痛伴急躁易怒, 胸胁胀满, 口苦, 舌质红, 苔黄, 脉弦, 某医生诊断为“肝胃不和”。根据五行学说, 回答以下问题。

1) 肝与胃在五行中分别属于

- A. 水与火
- B. 金与木
- C. 水与金
- D. 木与土
- E. 土与水

【正确答案】D

【答案解析】肝属木。脾属土, 脾与胃相表里, 所以胃也属土。

2) “肝胃不和”在五行关系上属

- A. 相生
- B. 相克
- C. 相乘
- D. 相侮
- E. 制化

【正确答案】C

【答案解析】相乘, 是相克太过致病。如由于肝气郁结或肝气上逆, 影响脾胃的运化功能, 即木旺乘土。此题患者“急躁易怒, 胸胁胀满”定位在肝, 影响了脾胃的运化功能, 故而出现胃脘疼痛。

3) 该病经治疗后胃脘疼痛消除, 但其余症状未解, 并出现咳嗽、咯血, 重新诊断为“肝火犯肺”。按五行关系, 此属

- A. 母病及子
- B. 子病及母
- C. 相乘
- D. 相侮
- E. 母子

【正确答案】D

【答案解析】肝属木, 肺属金, 正常时金克木。现肝病传及肺病, 为“反克”, 即为相侮。

4) 针对肝火犯肺应采用的相应治法为

- A. 益火补土法
- B. 抑木扶土法
- C. 培土生金法
- D. 泻南补北法
- E. 佐金平木法

【正确答案】E

【答案解析】佐金平木法: 滋肺阴、清肝火的治法, 又称滋肺清肝法, 适用于肺阴不足, 肝火上逆犯肺之证。若因肝火太盛, 耗伤肺阴的肝火犯肺之证, 又当清肝火为主, 兼以滋肺降气。

2. 某男, 48岁, 病起5日, 恶寒发热, 身热显著, 发热较重, 鼻塞流涕, 少汗身痛, 咳嗽气急, 痰稠色黄, 咽痛咽红, 苔薄黄, 舌边尖红, 脉浮数。

1) 此患者辨证当属

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 暑湿感冒
- D. 时行感冒
- E. 体虚感冒

【正确答案】 B

【答案解析】 风热感冒【症状】身热较著, 微恶风, 头胀痛, 或咳嗽少痰, 或痰出不爽, 咽痛咽红, 口渴。舌边尖红, 苔薄白或微黄, 脉浮数。

2) 根据患者症状, 可选用的治法是

- A. 辛凉解表
- B. 辛温解表
- C. 祛暑解表
- D. 滋阴解表
- E. 益气解表

【正确答案】 A

【答案解析】 风热感冒

【症状】身热较著, 微恶风, 头胀痛, 或咳嗽少痰, 或痰出不爽, 咽痛咽红, 口渴。舌边尖红, 苔薄白或微黄, 脉浮数。

【治法】辛凉解表, 宣肺清热。

3) 治疗时可选用的方剂是

- A. 荆防败毒散加减
- B. 银翘散加减
- C. 清瘟败毒饮加减
- D. 参苏饮加减
- E. 桑杏汤加减

【正确答案】 B

【答案解析】 风热感冒可选用的基础方剂是银翘散。

4) 患者根据医师处方服药后, 出现恶心不适, 应对方剂作何调整

- A. 生牛蒡子改为清炒牛蒡子
- B. 薄荷叶更换为薄荷梗
- C. 生甘草改为炙甘草
- D. 减少牛蒡子的用量
- E. 减少苦桔梗的用量

【正确答案】 E

【答案解析】 银翘散的合理用药与用药指导

(1) 饮片选择: 银翘散出自清代《温病条辨》。选用荆芥穗, 长于散风解表; 选用生牛蒡子, 生用辛苦性寒, 长

于疏散风热、解毒散结，而清炒后能缓和寒滑之性，如果患者平素便溏则可选择：薄荷叶偏于发汗解表，薄荷梗偏于下气宽中，本方选用薄荷叶；选用生甘草，性平偏凉，清热解毒，缓和药性、调和百药。

(2) 剂量建议：本方以金银花、连翘为君，原方用量最大，若患者平素脾虚，则二者用量宜小。原方牛蒡子用六钱，如果患者平时脾胃虚弱，则用量宜小，或者使用炒牛蒡子。原方苦桔梗用六钱，如果患者用药后出现恶心不适，则可适当减量。

(3) 煎法服法：原方用解苈根汤煎（现代多用芦根入煎）。煎煮时“香气大出，即取服，勿过煎”，因为该药轻清，过煎则味浓效差，煎煮时薄荷后下为宜。服用方法为每日2次，病重者每日3次。

3. 患者，女，57岁，近日出现胸痛胸闷，胸胁胀满，心悸。唇舌紫暗，脉涩。根据该患者的病历回答以下问题。

1) 根据中医内科病证的辨证论治，该患者应诊断为

- A. 眩晕
- B. 郁证
- C. 头痛
- D. 胸痹
- E. 乳癖

【正确答案】D

【答案解析】胸痹是指以胸部闷痛，甚则胸痛彻背，短气、喘息不得卧为主症的疾病，轻者仅感胸闷如窒，呼吸欠畅，重者则有胸痛，严重者心痛彻背，背痛彻心。根据患者主要症状“胸痛胸闷，胸胁胀满”可诊断为胸痹。

2) 根据中医内科的辨证论治，该患者应辨为

- A. 寒凝心脉
- B. 气滞血瘀
- C. 气虚血瘀
- D. 痰瘀痹阻
- E. 风寒闭肺

【正确答案】B

【答案解析】胸痹——气滞血瘀证【症状】心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，入夜为甚，重者心痛彻背，背痛彻心，或痛引肩背，伴有胸闷，日久不愈，可因暴怒、劳累而加重。舌质紫暗，有瘀斑，苔薄，脉弦细。

3) 针对此证，应采用的治法是

- A. 益气活血，通脉止痛
- B. 理气活血，通脉止痛
- C. 通阳泄浊，豁痰宣痹
- D. 辛温散寒，宣通心阳
- E. 益气养阴，活血通脉

【正确答案】B

【答案解析】胸痹——气滞血瘀证【治法】理气活血，通脉止痛。

4) 如果患者希望服用中成药，作为执业药师，您可以推荐的是

- A. 膈下逐瘀汤
- B. 补阳还五汤

- C. 乌鸡白凤丸
- D. 血府逐瘀口服液
- E. 三金片

【正确答案】D

【答案解析】胸痹——气滞血瘀证，中成药选用血府逐瘀口服液、速效救心丸、复方丹参滴丸。

4. 患者，女性，33岁，因发热，咽喉痛，口服维C银翘片，3次/日，每次3片，服药3天后，体温未降反而上升至39℃，伴厌食、上腹部不适。前往医院就诊，实验室检查报告显示：谷丙转氨酶364U/L，谷草转氨酶265U/L，γ-谷氨酰转肽酶189-U/L、碱性磷酸酶259-U/L、总胆汁酸58.8 μmol/L，乳酸脱氢酶407U/L、甲肝抗体、丙肝抗体、戊肝抗体均阴性。

1) 维C银翘片为中西药复方制剂，其中含有的西药成分为

- A. 安乃近
- B. 扑热息痛
- C. 吲哚美辛
- D. 盐酸可乐定
- E. 格列本脲

【正确答案】B

【答案解析】维C银翘片中所含的西药成分是对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、维生素C。

2) 服药期间，不得驾驶车船、登高作业或操作危险的机器，是因为维C银翘片中含有哪个成分引起的不良反应

- A. 小檗碱
- B. 维生素C
- C. 对乙酰氨基酚
- D. 盐酸麻黄碱
- E. 马来酸氯苯那敏

【正确答案】E

【答案解析】维C银翘片中含有马来酸氯苯那敏，也称扑尔敏，常与解热镇痛药同用于感冒，但有嗜睡、疲劳乏力等不良反应。因此在服药期间，不得驾驶车船、登高作业或操作危险的机器。

3) 以下关于维C银翘片的不良反应症状的描述错误的是

- A. 过敏昏厥
- B. 白细胞增加
- C. 溶血性贫血
- D. 间质性肾炎
- E. 泌尿系统受损

【正确答案】B

【答案解析】维C银翘片的不良反应可表现为白细胞减少，故B项描述错误。

4) 以下关于维C银翘片的使用注意事项说法错误的是

- A. 对维C银翘片所含成分过敏者禁用，过敏体质者慎用
- B. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料

- C. 建议严格按照说明书用药, 避免超剂量、长期连续用药
- D. 出现食欲不振、尿黄、皮肤黄染等症状时应立即停药, 并及时就诊, 监测肾功能
- E. 用药期间, 若出现皮肤瘙痒、皮疹、呼吸困难等早期过敏症状应立即停药并及时处理或立即就诊

【正确答案】D

【答案解析】服用维C银翘片期间, 若出现食欲不振、尿黄、皮肤黄染等症状时应立即停药, 及时就诊, 并监测肝功能。而不是肾功能, 故D项描述错误。

5. 5岁幼儿嗜食坚果, 某日该儿童出现眩晕、恶心、呕吐等症状来医院就诊, 来院后病情继续恶化, 出现神志改变, 惊厥。查体: 瞳孔散大, 对光反应迟钝。询问家长得知, 患儿发病前服用过某种坚果。

1) 结合患者病情, 医师推测患儿可能误食的坚果是

- A. 桃仁
- B. 郁李仁
- C. 苦杏仁
- D. 薏苡仁
- E. 甜杏仁

【正确答案】C

【答案解析】苦杏仁的不良反应症状有眩晕、心悸、恶心、呕吐等中毒反应, 重者出现昏迷、惊厥、瞳孔散大、对光反应消失, 最后因呼吸麻痹而死亡。根据患者的症状, 可判断是苦杏仁的不良反应症状, 故可判断该坚果为苦杏仁。

2) 若医师判断正确, 患儿病情有进一步发展, 可能出现的严重后果是

- A. 黏膜出血
- B. 呼吸麻痹
- C. 中毒性肝炎
- D. 急性肾功能衰竭
- E. 中毒性休克

【正确答案】B

【答案解析】苦杏仁的不良反应最严重的后果是患者因呼吸麻痹而死亡。

6. 女性患者, 47岁, 因类风湿性关节炎, 服用壮骨关节丸, 每日服两次, 每次6g。服药30天后, 出现乏力、尿黄而浓茶色, 皮肤黄染, 伴明显皮肤瘙痒, 大便呈灰白色。入院治疗, 进行了化验检查, 结果为甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒学标志均呈阴性。肝穿病理检查提示胆汁淤积型肝炎。

1) 患者使用壮骨关节丸, 可能出现的不良反应不包括

- A. 皮疹、瘙痒
- B. 恶心、呕吐
- C. 女性闭经
- D. 血压升高
- E. 肝损害

【正确答案】C

【答案解析】壮骨关节丸的不良反应该包括皮疹、瘙痒、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胃痛，血压升高，肝损害。在不良反应该的报告中，胆汁淤积型肝炎例数有一定比例。女性闭经为雷公藤的不良反应该。

2) 临床上在使用壮骨关节丸时，作为执业药师，不应给出的用药指导是

- A. 建议患者严格遵医嘱用药，避免大剂量、长期连续用药
- B. 用药时一旦出现纳差、尿黄、皮肤黄染等症应及时停药就医。
- C. 肝功能不良或特异体质者慎用，定期检查肝功能
- D. 30 天为一疗程，长期服用者每疗程之间间隔 10~20 天
- E. 严格控制用药剂量和疗程，一般连续用药不宜超过三个月

【正确答案】E

【答案解析】壮骨关节丸的用药指导

(1) 建议患者应严格遵医嘱用药，避免大剂量、长期连续用药；一旦出现纳差、尿黄、皮肤黄染等症应及时停药就医。

(2) 肝功能不良或特异体质者慎用，定期检查肝功能。

(3) 30 天为一疗程，长期服用者每疗程之间间隔 10~20 天。

E 项属于雷公藤制剂的用药指导，故本题选 E。

四、多项选择题

1. 执业药师对医师开展用药咨询服务的内容包括

- A. 价格信息
- B. 新药信息
- C. 合理用药信息
- D. 药物相互作用和禁忌证
- E. 药品不良反应信息

【正确答案】BCDE

【答案解析】执业药师可从以下几个方面向医师提供用药咨询服务。

- (1) 新药信息
- (2) 合理用药信息
- (3) 药品不良反应
- (4) 药物相互作用和禁忌证

2. 阴阳偏衰的治疗原则有

- A. 补其不足
- B. 实者泻之
- C. 虚则补之
- D. 损者益之
- E. 损其有余

【正确答案】ACD

【答案解析】本题考查阴阳的关系在治疗上的应用。

补其不足、损者益之、虚则补之都属不足之虚性病证的治疗原则，故可用于阴阳偏衰所致病证的治疗。

3. 根据中医理论，属于反治法的有

- A. 寒因寒用
- B. 寒者热之
- C. 通因通用
- D. 热者寒之
- E. 热因热用

【正确答案】ACE

【答案解析】反治：主要有“热因热用”、“寒因寒用”、“塞因塞用”、“通因通用”。

4. 痛经肝肾亏虚证常用的中成药有

- A. 安坤赞育丸
- B. 当归芍药颗粒
- C. 妇女养血丸
- D. 参茸白凤丸
- E. 复方乌鸡口服液

【正确答案】AE

【答案解析】痛经肝肾亏虚证常用中成药有安坤赞育丸、复方乌鸡口服液。

5. 处方药名为焦四仙，应付

- A. 焦山楂
- B. 焦神曲
- C. 焦麦芽
- D. 焦槟榔
- E. 焦苍术

【正确答案】ABCD

【答案解析】处方药名：焦四仙，应付：焦神曲、焦山楂、焦麦芽、焦槟榔。

6. 以下对罂粟壳的使用和管理规定说法正确的是

- A. 配方调配不得单包
- B. 在中药市场禁止销售
- C. 用量一般在 3~6g
- D. 严格凭医生处方使用
- E. 处方保存三年备查

【正确答案】ABCDE

【答案解析】罂粟壳也称米壳，有生罂粟壳和蜜罂粟壳两个炮制品。敛肺止咳，涩肠，定痛。治久咳，久泻，久痢，脱肛，便血，心腹筋骨诸痛，滑精，多尿，白带等病证，临床使用时的用量一般在 3~6g。本品有成瘾性，故不宜常服，孕妇及儿童禁用，运动员慎用。

罂粟壳必须凭有麻醉药处方权的执业医师签名的淡红色麻醉药处方方可调配，应于群药中，且与群药一起调配，不得单方发药，每张处方不得超过三日用量，连续使用不得超过 7 天，成人一次的常用量为每天 3~6g。处方保存 3 年备查。

7. 婴幼儿患者合理使用中药的原则

- A. 不宜随便施补
- B. 用量宜轻
- C. 多宜温补
- D. 宜用轻清之品

E. 尤宜兼顾健脾和胃

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 婴幼儿患者合理应用中药的原则主要有以下几点: ①用药及时, 用量宜轻; ②宜用轻清之品; ③宜佐健脾和胃之品; ④宜佐凉肝定惊之品; ⑤不宜滥用滋补之品。

8. 肝功能不全患者因肝功能减退, 药物代谢受到严重影响, 在肝脏的作用时间延长, 故此类患者应在医师指导下慎重用药, 用药时执业药师可给予的合理用药指导有

- A. 服药初始宜从小剂量开始
- B. 不能使用有肝毒性中药
- C. 服药期间定期检查肝功能
- D. 选择肝毒性小的药物
- E. 注意观察用药后的反应

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 肝功能不全者用药基本原则和注意事项

- (1) 明确疾病诊断和治疗目标
- (2) 忌用有肝毒性的药物 (B对)
- (3) 注意药物相互作用, 避免产生新的肝损害 (E对)
- (4) 坚持少而精的用药原则 (A对)
- (5) 定期检查肝功能, 及时调整治疗方案 (C对)

9. 不合理用药的后果有

- A. 浪费医疗资源
- B. 延误疾病治疗
- C. 造成医疗事故
- D. 造成医疗纠纷
- E. 引发药源性疾病

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 不合理用药的后果有: ①浪费医药资源。②延误疾病的治疗。③引发药物不良反应及药源性疾病的发生。④造成医疗事故和医疗纠纷。

10. 婴幼儿面色苍白、疲乏、舌淡等气血两虚宜选用

- A. 黄芪
- B. 党参
- C. 首乌
- D. 黄精
- E. 大枣

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 面色苍白、神疲乏力、夜寐不安、舌质淡, 属于气血两虚的儿童, 可给予益气养血的黄芪、党参、当归、黄精、首乌、大枣等。