

近5年“剂量”相关考题

第六章 呼吸系统常见疾病

最佳选择题

1. 患者，男，55岁，高血压病史5年，因咳嗽咳痰呼吸困难就诊，经查体检查：患者桶状胸，杵状指，双肺叩诊过清音，散在干鸣音，双下肺少许湿罗音，辅助检查，血常规 $WBC 11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能， $FEV_1/FVC 60\%$ ， $FEV_1 55\%$ ，治疗方案如下：

氨溴索注射液 30mg tid ivgtt
莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid ivgtt
异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入
布地奈德混悬液 1ml bid 雾化吸入
硝苯地平控释片 15mg bid po

以上用药中，给药频次错误的是

- A. 硝苯地平控释片
- B. 氨溴索注射液
- C. 异丙托溴铵溶液
- D. 布地奈德混悬液
- E. 莫西沙星氯化钠注射液

答案：E

解析：莫西沙星是喹诺酮类抗菌药物，注射给药是每日用药一次（qd）。

2. 患者，女，68岁，体重45kg，因发热、咳嗽，咳痰入院治疗，临床诊断为社区获得性肺炎，化验结果，白细胞计数 $11.76 \times 10^9/L$ ，肌酐清除率 $18ml/min$ ，该患者使用下列抗菌药物治疗时，不需要减量的是

- A. 左氧氟沙星
- B. 莫西沙星
- C. 头孢噻肟钠
- D. 阿莫西林
- E. 头孢吡肟

答案：B

解析: 本题考查教材表 9-1 肺炎常用抗菌药物, 其中莫西沙星肾功能不全患者无需调整剂量。

3. 患者, 女, 49 岁, 近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊, 临床诊断为下呼吸道细感染, 处方如下:

左氧氟沙星片 0.5g tid po

氨溴索片 30mg tid po

阿司匹林泡腾片 0.5g prn 冲服

维生素 C 片 0.2g tid po

板蓝根冲剂 1 袋 tid po

药师审核医嘱认为存在不合理用药, 其分析理由和结论, 正确的是

A. 左氧氟沙星片给药间隔不合理

B. 氨溴索片给药剂量不合理

C. 阿司匹林泡腾片给药剂量不合理

D. 维生素 C 片用法用量不合理

E. 板蓝根冲剂给药间隔不合理

答案: A

解析: 左氧氟沙星 0.5g 口服的话, 一天给药一次。