

《药学综合知识技能》不良反应汇总（二）

地塞米松粘贴片	局部组织萎缩、继发真菌感染
异丙托溴铵	具有抗胆碱作用
托特罗定	具有抗胆碱作用
吸入型糖皮质激素	口咽白色念珠菌感染、声音嘶哑
莫西沙星	诱发癫痫、Q-T 间期延长
沙丁胺醇	心悸、骨骼肌震颤、低钾血症
异烟肼	周围神经病
利福平	排泄物呈橘红色
乙胺丁醇	球后视神经炎
链霉素	耳毒性、肾毒性、神经肌肉组织、过敏反应
ACEI 类（**普利）	刺激性干咳、血钾升高
ARB 类（**沙坦）	血钾升高
β 受体阻断剂（**洛尔）	支气管痉挛、心功能抑制、反跳现象
CCB 类（**地平）	二氢吡啶类：足踝部水肿、头痛、面部潮红
噻嗪类利尿剂	血钾降低，血钠降低，血尿酸升高
保钾利尿剂（阿米洛利、氨苯蝶啶）	血钾升高
醛固酮受体阻断剂（螺内酯）	血钾升高，男性乳房发育
α 受体阻断剂（**唑嗪）	体位性低血压
阿司匹林	导致胃出血、胃溃疡
他汀类	横纹肌溶解、肝毒性
苯海索	有抗胆碱作用，升高眼压、引起尿潴留
颠茄	会加重痴呆
左旋多巴	异动症
文拉法辛	轻度升高血压
苯妥英钠	共济失调、视物模糊、齿龈增生、镇静作用
丙戊酸钠	脱发、体重增加、肝中毒
质子泵抑制剂	影响钙吸收、骨质疏松（建议用枸橼酸钙补钙），

(**拉唑)	维生素 B12 和维生素 C 吸收下降, 增加感染风险, 便秘、口干
α -葡萄糖苷酶抑制剂	腹胀、肠鸣音亢进、腹泻、皮肤反应
别嘌醇	眩晕 (驾驶员不宜使用)
硫酸亚铁	可减少肠蠕动, 引起便秘, 并排黑便
环孢素	齿龈增生、多毛
甲氨蝶呤	脱发、骨髓抑制、听力损害和肺间质变、再生障碍性贫血
氯喹、羟氯喹	引起视网膜变性而致失明

