



临床助理医师考试：《答疑周刊》2021 年第 21 期

【运动系统】

1. 下列最容易并发骨筋膜室综合征的疾病是

A. 股骨干骨折

B. 胫骨上 1/3 骨折

C. 胫骨中 1/3 骨折

D. 胫骨下 1/3 骨折

E. 胫骨平台骨折

【正确答案】C

【答案解析】最容易并发骨筋膜室综合征的疾病是胫骨中 1/3 骨折。

2. 桡骨头半脱位的治疗措施是

A. 手法复位不必固定

B. 切开复位内固定

C. 切开复位韧带修复

D. 手法复位外固定

E. 切开复位外固定

【正确答案】A

【答案解析】桡骨头半脱位的治疗措施是手法复位。

3. 男，50 岁。突发车祸，急诊就医。查体：右足下垂，小腿外侧和足背外侧感觉消失。X 线片示右胫、腓骨多段骨皮质不连续。该病变最可能损伤的神经是

A. 闭孔神经

B. 股神经

C. 腓总神经

D. 隐神经

E. 坐骨神经

【正确答案】C

【答案解析】右足下垂，小腿外侧和足背外侧感觉消失，提示腓总神经损伤。

4. 最可能出现拇指不能伸直表现的是

A. 桡神经损伤



- B. 尺神经损伤
- C. 正中神经损伤
- D. 尺骨骨折
- E. 腱鞘炎

【正确答案】A

【答案解析】最可能出现拇指不能伸直表现的是桡神经损伤。

5. 判断早期成人股骨头缺血性坏死最敏感的无创检查是

- A. MRI
- B. 血管造影
- C. B 超
- D. X 线片
- E. CT

【正确答案】A

【答案解析】早期成人股骨头缺血性坏死最敏感的无创检查是 MRI。

6. 男，65 岁，左膝关节严重疼痛，步行距离少于 500 米。查体：左膝关节屈曲挛缩畸形，活动受限。负重位膝关节正位 X 线片显示左膝内侧关节间隙消失，骨质硬化，边缘骨赘增生。最可能的诊断是

- A. 骨关节炎
- B. 痛风关节炎
- C. 化脓性关节炎
- D. 骨关节结核
- E. 风湿性关节炎

【正确答案】A

【答案解析】关节屈曲挛缩畸形，活动受限。负重位膝关节正位 X 线片显示左膝内侧关节间隙消失，骨质硬化，边缘骨赘增生。考虑诊断为骨关节炎。

7. 最容易发生缺血性骨坏死的是

- A. 股骨干骨折
- B. 股骨颈骨折
- C. 耻骨干骨折

D. 桡骨远端骨折

E. 肱骨髁上骨折

【正确答案】 B

【答案解析】 最容易发生缺血性骨坏死的是头下型股骨颈骨折。

