

医学教育网执业西药师：《答疑周刊》2021 年第 22 期

问题索引：

1. 【问题】免疫抑制剂监护要点汇总。
2. 【问题】引起药源性疾病的典型药物汇总。

具体解答：

1. 【问题】免疫抑制剂监护要点汇总。

药物	药物监护要点
环孢素	1. 需监测血药浓度，适当调整给药剂量； 2. 软胶囊需整粒吞服； 3. 为减少浓度波动，要求固定时间给药（可选择餐前或餐后）
他克莫司	1. 需监测血药浓度，适当调整给药剂量； 2. 建议患者空腹（餐前 1h 或餐后 2h）给药，2 次用药应间隔 12 h
吗替麦考酚酯	前体药物，建议空腹给药
巯唑嘌呤	建议与食物同服以减轻胃肠道不适症状
西罗莫司	本药片剂不得压碎、咀嚼或掰开；为减少药物吸收差异，建议保持固定的给药方案，可选择餐前或餐后给药，但用药时间要求一致
糖皮质激素	每日一次，给药时间建议为早 8 点左右，要求固定时间给药（可选择餐前或餐后）

2. 【问题】引起药源性疾病的典型药物汇总。

药源性疾病	药物
胃肠道损害	非甾体类抗炎药
再生障碍性贫血	甲氨蝶呤、氯霉素、环磷酰胺、吡喹酮、阿司匹林、对乙酰氨基酚
粒细胞减少症	甲氨蝶呤、甲硫氧嘧啶、丙硫氧嘧啶、氯霉素、磺胺类、复方

	阿司匹林、吲哚美辛、异烟肼、氯氮平
药源性肾损害	氨基糖苷类、阿昔洛韦、布洛芬、吲哚美辛、阿司匹林、顺铂、含马兜铃酸的中药（青木香、关木通、广防己、朱砂莲）
药源性高血压	复方酚咖伪麻胶囊、地塞米松、麻黄碱、垂体后叶素、重组人红细胞生成素
听神经障碍	氨基糖苷类抗生素、抗疟药（氯喹、奎宁）、水杨酸类、依他尼酸
肌病	他汀类

**典型例题：**

甲状腺功能亢进患者服用甲硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是

- A. 粒细胞减少症
- B. 消化性溃疡
- C. 慢性肾衰竭
- D. 溶血性贫血
- E. 呼吸抑制

 **【答案】**A

**【解析】**甲硫氧嘧啶可引起粒细胞减少症。