

中级主管护师考试：《答疑周刊》2022 年第 5 期

1. 【问题】宫颈癌分期是怎么区分的？

【解答】宫颈癌分期：

期别	肿瘤范围
I 期	癌灶局限于宫颈（包括累及宫体）
I _A	肉眼未见癌灶，仅在显微镜下可见浸润癌
I _{A1}	间质浸润深度≤3mm，宽度≤7mm
I _{A2}	间质浸润深度>3mm 至≤5mm，宽度≤7mm
I _B	临床可见癌灶局限于宫颈，或显微镜下可见病变>IA2
I _{B1}	临床可见癌灶最大直径≤4cm【医学教育网原创】
I _{B2}	临床可见癌灶最大直径>4cm
II 期	癌灶已超出宫颈，但未达盆壁。癌累及阴道，但未达阴道下 1/3
II _A	无宫旁浸润
II _{A1}	可见癌灶最大直径≤4cm
II _{A2}	可见癌灶最大直径>4cm
II _B	有宫旁浸润
III 期	癌灶扩散至盆壁和（或）累及阴道已达下 1/3，或有肾盂积水或肾无功能（非癌所致者除外）
III _A	癌累及阴道，已达阴道下 1/3，但未达盆壁
III _B	癌浸润以宫旁为主，已达盆壁，或有肾盂积水或肾无功能者
IV 期	癌播散超出真骨盆或癌浸润膀胱粘膜或直肠粘膜
IV _A	癌浸润膀胱粘膜或直肠粘膜
IV _B	癌浸润超出真骨盆，有远处转移

2. 【问题】体液紊乱应如何补液？

【解答】（1）补多少：包括三部分：

- 1) 生理需要量：正常人每日生理需要量为 2000~2500ml。
- 2) 累积丧失量：从发病开始到就诊时已经损失的液体量。
- 3) 继续丧失量：在治疗过程中继续损失的液体。如呕吐、腹泻、肠痿、体

温升高、大汗、气管切开等损失量要充分估计。

(2) 补什么：原则是缺什么补什么。【医学教育网原创】对盐、糖的生理需要量，正常人氯化钠 5~9g/d，氯化钾 2~3g/d，葡萄糖 100~150g/d 以上。

高渗性脱水，饮水或输注 5% 葡萄糖溶液为首选。低渗性脱水，轻者以等渗盐水，重度缺钠者先静脉输注含盐溶液，后输胶体溶液，再给高渗盐水 200~300ml。等渗性脱水，一般以等渗盐水和葡萄糖液交替应用。

(3) 如何补：【医学教育网原创】补液原则是先盐后糖，先晶后胶，先快后慢，见尿补钾。见尿补钾是指尿量在 40ml/h 以上。在具体补液时根据病人的情况进行调整。

3. 【问题】内囊损伤出现

- A. 偏瘫
- B. 交叉瘫
- C. 截瘫
- D. 四肢瘫
- E. 肌肉性瘫

【正确答案】A。内囊损伤出现偏瘫。一侧脑桥损伤出现交叉瘫。

【学员问题】老师，请总结一下关于瘫痪的表现。

【解答】1) 单瘫：【医学教育网原创】表现为一侧上肢或一侧下肢的运动不能或运动无力。见于脑半球、脊髓前角、周围神经或肌肉等病变。

2) 偏瘫：表现为一侧面部和肢体瘫痪，常常见于一侧大脑半球病变，如脑梗死等。

3) 交叉性瘫痪：表现为病变侧脑神经麻痹和对侧肢体的瘫痪。常见于脑干病变。

4) 截瘫：表现为双下肢瘫痪。【医学教育网原创】多见于脊髓横贯性损害。

5) 四肢瘫：表现为四肢不能运动或肌力减退。见于高颈位病变。

6) 局限性瘫痪：表现为某一根神经根支配区或某些肌群无力。