

【6.23日】临床医师-女性生殖系统-冲刺刷题考题

1. 下列关于女性外阴解剖结构的描述，正确的是
 - A. 前庭大腺位于大阴唇后部，被球海绵体肌覆盖
 - B. 阴道前庭有尿道外口，阴道口和肛门
 - C. 处女膜的表面上皮为柱状上皮
 - D. 阴蒂分为阴蒂头和阴蒂脚两部分
 - E. 大阴唇的外侧为皮肤，内侧为黏膜

2. 关于卵巢形态学特征，说法正确的是
 - A. 卵巢约 $8 \times 5 \times 3$ cm 大小
 - B. 成年妇女卵巢重约 15g
 - C. 卵巢表面无腹膜
 - D. 髓质内含许多始基卵泡
 - E. 皮质内含血管、神经、淋巴管

3. 关于子宫下段说法正确的是
 - A. 由非孕时的子宫峡部伸展形成
 - B. 孕中期的子宫颈扩展为宫腔的一部分
 - C. 临产后子宫颈伸展可达 7~10cm
 - D. 为临产后的子宫颈
 - E. 孕 16 周扩展成宫腔的一部分

4. 不属于骨盆底外层范畴的肌肉是
 - A. 球海绵体肌
 - B. 会阴深横肌
 - C. 肛门外括约肌
 - D. 会阴浅横肌
 - E. 坐骨海绵体肌

5. 关于女性生殖器淋巴引流，错误的是
 - A. 宫颈淋巴大部分汇入髂外淋巴结及骶前淋巴结
 - B. 阴道下段的淋巴引流主要汇入腹股沟浅淋巴结
 - C. 阴道上段淋巴大部分汇入闭孔淋巴结及髂内淋巴结
 - D. 内生殖器淋巴分髂淋巴、腰淋巴和骶前淋巴组
 - E. 宫体两侧淋巴可沿圆韧带入腹股沟浅淋巴结

6. 雌激素的生理作用，下列哪项是正确的
 - A. 使宫颈口松弛，粘液分泌增加，稀薄，拉丝度增长

医师资格考试辅导

- B. 使子宫肌肉对催产素的敏感性下降
C. 使阴道上皮细胞脱落
D. 对下丘脑只有负反馈
E. 可升高胆固醇，不利于冠心病预防
7. 月经周期的长短取决于下列何项
A. 增生期的长短
B. 分泌期的长短
C. 经期的长短
D. 黄体的寿命
E. 黄体退化成白体的时间
8. 妊娠早期血中高浓度的雌激素和孕激素来自
A. 肾上腺皮质
B. 卵泡
C. 妊娠黄体
D. 胎盘
E. 卵巢
9. LOA（枕左前）
A. 大囟在 3 点，小囟在 9 点
B. 大囟在 9 点，小囟在 3 点
C. 大囟在 7 点，小囟在 1 点
D. 大囟在 11 点，小囟在 5 点
E. 大囟在 4 点，小囟在 10 点
10. 低于正常值的骨盆测量数值是
A. 髂棘间径 25cm
B. 髂嵴间径 28cm
C. 骶耻外径 19cm
D. 坐骨棘间径 10cm
E. 坐骨结节间径 7cm
11. 初产妇，24 岁，妊娠 39 周临产，产程进展顺利，枕左前位，S=0，胎心监护突然出现变异减速，胎心 70 次/分且持续 50 秒，本例胎心减慢最可能的原因为
A. 胎盘早剥
B. 脐带受压
C. 胎头受压
D. 胎盘功能减退
E. 慢性胎儿窘迫
12. 28 岁初产妇，临产 8 小时后，胎头迟迟不能入盆，此时应测量哪条径线，判断产妇骨盆是否狭窄
A. 骶耻外径

医师资格考试辅导

- B. 坐骨棘间径
- C. 真结合径
- D. 对角径
- E. 坐骨结节间径

13. 临产时可以灌肠的是

- A. 胎膜已破，宫口开大 2cm，头先露，S+1，胎心音正常
- B. 宫口开大 2cm，头先露，S+1，胎心音正常，阴道流血，量较多
- C. 产程顺利，估计 1 小时内胎儿可以娩出
- D. 胎膜未破，臀先露，胎心音正常
- E. 胎膜未破，宫口开大 2cm，头先露，S+1，胎心音正常

14. 21 岁，已婚妇女。停经 80 天，阴道少量流血 3 天，大量流血半天。入院查：面色苍白，血压 80/50mmHg，脉搏 120 次/分，阴道内有鸭蛋白血块，宫口有组织物堵塞，子宫约 50 天孕大，两侧附件阴性，应诊断

- A. 完全流产
- B. 不全流产
- C. 稽留流产
- D. 难免流产
- E. 先兆流产

15. 女，25 岁，停经 50 天，1 个月曾服炔诺酮片现阴道少量流血 5 天，伴腹痛，阴道检查：宫口未开，B 超提示宫内妊娠，本例最佳的处理方案是

- A. 吸宫术终止
- B. 中医保胎
- C. 静滴缩宫素
- D. 肌注黄体酮
- E. 观察

16. 关于输卵管妊娠的描述，正确的是

- A. 输卵管峡部妊娠发生率最高
- B. 多数患者都有较多量阴道流血
- C. 腹痛通常是患者就诊的主要症状
- D. 输卵管壶腹部妊娠多以破裂为结局
- E. 尿妊娠试验阴性可排除输卵管妊娠

(17~19 题共用题干) 初产妇，26 岁，妊娠 39 周，近 3 日头痛、视力模糊，今晨开始头痛加重，呕吐 2 次，急诊入院。

17. 查体发现最有意义的体征为

- A. 下肢浮肿
- B. 心率 96 次/分
- C. 24 小时尿蛋白 1g
- D. 睑结膜苍白
- E. 血压 160/110mmHg

18. 假设诊断确定，最有重要价值的病史是

医师资格考试辅导

- A. 既往血压正常
B. 既往无头痛史
C. 有高血压家族史
D. 曾患病毒性肝炎
E. 曾患慢性盆腔炎
19. 随后若发现胎心 184 次/分，最恰当的处理应为
A. 肌注地西洋
B. 立即剖宫产
C. 静脉滴注肼屈嗪
D. 立即缩宫素引产
E. 静脉滴注硫酸镁、甘露醇后立即剖宫产
20. 妊娠剧吐易造成患者下列哪种维生素缺乏
A. VitA
B. VitB₁
C. VitB₆
D. VitB₁₂
E. VitC
21. 孕妇，32 岁，孕 1 产 0，孕 28 周，反复多次阴道流血，流血量大，未诉腹痛，产科检查胎心 140 次/分，腹部无压痛。此患者最可能的临床诊断是
A. 完全性前置胎盘
B. 部分性前置胎盘
C. 边缘性前置胎盘
D. 轻型胎盘剥离
E. 重型胎盘剥离
22. 女性，28 岁。有风湿性心脏病、二尖瓣狭窄病史 5 年。平时不用药，登三楼无明显不适。自孕 5 个月起活动时常有轻度心慌、气促。现孕 38 周，因心悸，咳嗽，夜间不能平卧，心功能 III 级而急诊入院。在制定治疗计划时，最佳的方案是：
A. 积极控制心力衰竭后终止妊娠
B. 积极控制心力衰竭，行剖宫产术
C. 积极控制心力衰竭，行引产术
D. 适量应用抗生素后继续妊娠
E. 纠正心功能，等待自然临产
23. 初孕妇，26 岁。妊娠 38 周，规律宫缩 8 小时，宫口开大 6cm，S+1，胎膜已破，胎儿体重估计 3000g，血压 130/80mmHg，胎心 144 次/分。4 小时后肛查：宫口仍 6cm，边缘薄，先露 S+1，宫缩力弱，20 秒/5~6 分钟，胎心好。应诊断为
A. 潜伏期延长 B. 活跃期延长
C. 活跃期停滞 D. 第二产程延长
E. 滞产

医师资格考试辅导

24. 经孕妇，妊娠 39 周，晨起 4 时出现规律宫缩，宫口开大 1cm，胎膜未破，胎儿体重估计 3200g，血压 120/80mmHg，胎心 136 次/分。21 时后肛查：宫口 2cm，边薄，宫缩力弱，20 秒/5~6 分钟，胎心尚可。应诊断为

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 第二产程延长
- E. 滞产

(25~26 题共用题干) 27 岁初产妇，妊娠 39 周，规律宫缩 6 小时，枕左前位，估计胎儿体重 2700g，胎心 140 次/分。阴道检查：宫口开大 3cm，未破膜，S=+1，骨盆外测量未见异常。

25. 此时恰当处理应是

- A. 抑制宫缩，使其维持至妊娠 40 周
- B. 等待自然分娩
- C. 人工破膜加速产程进展
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 行剖宫产术

26. 若此后宫缩逐渐减弱，产程已 18 小时，胎膜已破，宫口开大 8cm，此时恰当处理应是

- A. 静注地西洋
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 肌内注射缩宫素
- D. 静脉注射麦角新碱
- E. 立即行剖宫产术

27. 初孕，孕 39 周，估计胎儿 3800g，临产 10 小时入院，查宫底剑下 1 指，左枕前位胎心好，宫缩强，宫口开大 4cm，胎头跨耻征阳性，应采取哪项处理

- A. 等待自然分娩
- B. 观察经过
- C. 剖宫产术
- D. 催产素静点
- E. 产钳助产

(28~30 题共用题干) 26 岁，初产妇，妊娠 39 周，规律宫缩 18 小时，肛查宫口 8cm，先露 0，腹部触诊为头先露，宫缩时宫体部不硬，持续 30 秒，间隔 5 分钟，胎心 136 次/分，B 型超声检查示胎儿双顶径为 9.0cm。

28. 出现以上情况最可能是

- A. 子宫收缩过强
- B. 胎儿过大
- C. 子宫收缩乏力
- D. 骨盆狭窄
- E. 胎儿畸形

29. 本例首先的处理是

- A. 人工破膜
- B. 立即剖宫产
- C. 静脉滴注宫缩素
- D. 肌注度冷丁 100mg
- E. 观察 1 小时后再决定

医师资格考试辅导

30. 若经过处理和观察，数小时后已进入第二产程，胎头 S+4，胎心 102 次/分，正确处理为

- A. 吸氧观察
- B. 静滴缩宫素
- C. 等待自然分娩
- D. 产钳助娩
- E. 剖宫产

(31~32 题共用题干) 25 岁初产妇，妊娠 39 周，阵发性腹痛 20 小时，10~12 分钟宫缩一次，持续 30 秒，宫口开大 2cm。

31. 出现上述临床表现的原因是

- A. 子宫收缩对称性异常
- B. 子宫收缩节律性异常
- C. 子宫收缩极性异常
- D. 子宫收缩缩复作用异常
- E. 腹肌和膈肌收缩力异常

32. 此时处理的原则应是

- A. 肌内注射缩宫素
- B. 静脉注射麦角新碱
- C. 静脉注射地西洋
- D. 人工破膜
- E. 立即行剖宫产

(33~35 题共用题干) 女，24 岁。足月妊娠临产 10 小时，宫口扩张 2cm，自觉下腹部持续疼痛，孕妇烦躁不安，疼痛喊叫，宫缩频率高，子宫下段收缩最强。

33. 患者初步诊断是

- A. 不协调性宫缩乏力
- B. 协调性宫缩乏力
- C. 骨盆狭窄
- D. 胎位不正
- E. 正常分娩

34. 患者最可能的原因是

- A. 羊水过多
- B. 头盆不称
- C. 多胎妊娠
- D. 巨大胎儿
- E. 子宫畸形

35. 此时应首先的措施是

- A. 静滴缩宫素
- B. 行剖宫产
- C. 肌注哌替啶
- D. 人工破膜
- E. 无需任何处理

医师资格考试辅导

36. 初孕妇，32岁。妊娠39周，规律宫缩8小时，随后持续腹痛，拒按，无间歇期，胎心音不清，宫口开大5cm，胎头S-1，后囟位于1点处。该患者最可能的诊断是

- A. 协调性宫缩乏力
- B. 强直性子宫收缩
- C. 先兆子宫破裂
- D. 持续性枕后位
- E. 宫颈扩张活跃期停滞

37. 26岁初产妇，孕40周，产程进展20小时，宫口开大4cm，静脉滴注缩宫素2小时后，宫缩持续不缓解，胎心100次/分，发现血尿且耻骨上有压痛，应考虑是

- A. 胎盘早剥
- B. 先兆子宫破裂
- C. 高张性宫缩乏力
- D. 子宫收缩过强
- E. 痉挛性子宫

38. 产妇分娩后5分钟突然发生烦躁不安，寒战，呕吐，咳嗽，呼吸困难，发绀，血压10.7/5.3kPa. (80/40mmHg)，脉细弱，首先应考虑下列何种情况

- A. 失血性休克
- B. 脑血管意外
- C. 羊水栓塞
- D. 感染与休克
- E. 子宫破裂

39. 初产妇，急产娩一男婴，体重3900g，胎盘娩出后半小时内有较多量间歇性阴道出血，色红，宫底，宫颈及肌肉已注催产素10单位，再次查看胎盘完整，胎膜有一处见血管中断于胎膜边缘。究其出血原因最可能是

- A. 胎盘剥离不全
- B. 软产道损伤
- C. 胎盘残留
- D. 产后宫缩乏力
- E. 凝血功能障碍

(40~41题共用备选答案)女，32岁。孕40周，妊娠合并子宫肌瘤，阴道分娩胎盘娩出后阴道出血量多，暗红色，检查：宫底高，子宫软，产道无裂伤，血自宫腔流出，有血块，检查胎盘完整，血压110/90mmHg。

40. 最可能诊断为

- A. 子宫收缩乏力
- B. 凝血功能障碍
- C. 胎盘残留
- D. 产道损伤
- E. 胎盘粘连

41. 除给宫缩剂外首先处理的是

- A. 止血剂
- B. 抗炎
- C. 迅速按摩子宫止血
- D. 子宫腔内纱布填塞

E. 髂内动脉结扎

42. 女, 25 岁。孕 40 周, 初孕, 规律宫缩 2 小时来院, 当时宫口扩张 4cm, 因宫缩强, 半小时后宫口开全, 第二产程仅 15 分钟即顺利娩出一男婴, 胎儿娩出后即有鲜红血流出, 5 分钟后胎盘自然娩出。此后出血量仍较多, 有血块。此时分析其出血原因最可能为

- A. 子宫收缩乏力
- B. 胎膜残留
- C. 胎盘残留
- D. 宫颈裂伤
- E. 凝血功能障碍

(43~44 题共用备选答案) 初产妇, 胎头吸引器加会阴侧切助产分娩足月活婴, 胎盘胎膜完整。产后 4 小时阴道流血约 500ml。查: 血压 90/60mmHg, 脉搏 100 次/分, 宫底脐上 3 横指, 轮廓清, 阴道口少量活动性流血, 可凝固。

43. 导致出血最可能性的原因是

- A. 子宫收缩乏力
- B. 软产道损伤
- C. 胎盘残留
- D. 凝血功能障碍
- E. 尿潴留

44. 首选处理措施是

- A. 按摩子宫
- B. 导尿
- C. 注射止血剂
- D. 检查软产道
- E. 刮宫

(45~47 题共用题干) 32 岁, 外阴瘙痒伴分泌物多 4~5 天, 妇科检查: 阴道粘膜散在红色斑点, 阴道内多量脓性泡沫状分泌物, 有臭味。

45. 对此病人进行检查时, 不正确操作是

- A. 取分泌物前不能做双合诊
- B. 取分泌物前先行碱性液体冲洗
- C. 取分泌物行悬滴法检查
- D. 可疑病人多次悬滴法阴性时做培养
- E. 检查标本应注意保暖

46. 此病人确切诊断为

- A. 细菌性阴道病
- B. 真菌性阴道炎
- C. 滴虫阴道炎
- D. 淋球菌阴道炎
- E. 外阴瘙痒症

47. 此病人治疗应首选

- A. 局部用药即可达治愈
- B. 全身及局部同时用药效果最佳
- C. 使用碱性液冲洗阴道可提高疗效

- D. 症状消失复查分泌物转阴即停药
- E. 男方不易感染，无需用药治疗

(48~50 题共用题干) 女性，55 岁，白带多，接触性出血 3 月余，3 年前曾因宫颈糜烂行宫颈冷冻治疗，妇科检查：外阴阴道未见异常，宫颈肥大糜烂、质脆，子宫及双附件未见异常。

48. 为明确诊断，首先检查项目应是

- A. 分段诊刮
- B. 宫腔镜检查
- C. 腹腔镜检查
- D. 宫颈锥切术
- E. 宫颈多点活检

49. 检查结果证实为宫颈上皮内瘤样病变，异型细胞占宫颈上皮全程 2/3 以上，伴 HPV 感染，此例应诊断为

- A. CIN I
- B. CIN II
- C. CIN III
- D. 慢性宫颈炎
- E. 宫颈癌

50. 此例的合适治疗为

- A. 局部用药 3 个月后复查
- B. 激光治疗 3 个月后复查
- C. 随诊
- D. 行全子宫切除术
- E. 局部用药+口服消炎药

(51~53 题共用题干) 女，38 岁。接触性出血半年。妇科检查：外阴、阴道无异常，宫颈轻度糜烂，触之易出血，子宫正常大小，宫旁组织及双侧附件未触及异常。

51. 首选的检查方法是

- A. 阴道镜检查
- B. LEEP 锥切术
- C. 宫颈活检
- D. 宫颈冷刀锥切术
- E. 宫颈细胞学检查

52. 如检查结果为鳞状上皮内高度病变 (HSIL)，首选的处理方法是

- A. 阴道镜下活检
- B. 宫颈锥形切除术
- C. 宫颈碘试验
- D. 分段诊刮术
- E. 宫颈细胞学检查

53. 如为宫颈上皮内瘤变 III 级，宜采取的处理方法是

- A. 子宫切除术
- B. 放射治疗
- C. 化学治疗

医师资格考试辅导

- D. 宫颈锥形切除术
E. 随访观察

54. 女性，45岁。血性白带2个月，妇检阴道未受肿瘤侵犯，宫颈菜花样，宫体正常大小，宫旁明显增厚，未达盆腔，宫颈活检为鳞癌。其分期是

- A. I b期
B. I c期
C. II a期
D. II b期
E. III a期

55. 女，45岁，不规则阴道流血2个月。性交后出血，宫颈锥切标本显微镜下可见低分化鳞状细胞癌，间质浸润深度2mm，宽度6mm。正确的分期为

- A. I A1期
B. I A2期
C. I B1期
D. I B2期
E. II A期

56. 女性，40岁。不规则阴道流血3个月。妇科检查：宫颈呈菜花样，约5cm×4cm×4cm大小，质脆易出血。三合诊左侧主韧带结节状增粗，已达盆壁。宫颈活检示鳞状细胞癌。合适的治疗是

- A. 宫颈癌根治术
B. 化疗
C. 化疗后行宫颈癌根治术
D. 放疗
E. 宫颈癌根治术后加化疗

57. 女，49岁，接触性出血10个月。妇科检查发现宫颈有4cm×4cm菜花状肿物，累及阴道上2/3，周围无盆腔浸润。该患者应该行的治疗是

- A. 子宫全切术
B. 宫颈锥切术
C. 手术加放疗
D. 放疗
E. 子宫切除术及盆腔淋巴结清扫术

(58~60题共用题干)女，46岁，因白带增多1年，性交后出血1周就诊。宫颈刮片病理：宫颈鳞癌，浸润深度7mm，肉眼见癌灶最大直径≤4cm。

58. 患者临床分期属于

- A. I A2期 B. I B1期
C. I B2期 D. II A期
E. II B期

59. 宜选的手术方式是

医师资格考试辅导

- A. 子宫全切术
B. 广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
C. 宫颈锥切术
D. 部分子宫切除术
E. 改良子宫根治切除术
60. 若要清扫淋巴结，下列哪组不属清扫范围
A. 髂外
B. 腹股沟浅
C. 髂总
D. 髂内
E. 闭孔
61. 女，35岁。月经周期规律，经期延长，经量增长半年，阴道大出血10天，查体：贫血貌，妇科检查发现子宫增大如8周大小，质中。B超提示宫腔实性占位，直径4cm。最可能的诊断是
A. 子宫浆膜下肌瘤
B. 子宫黏膜下肌瘤
C. 子宫颈肌瘤
D. 子宫阔韧带肌瘤
E. 子宫肌壁间肌瘤
62. 某妇女，30岁，孕1产0，宫内妊娠20周，合并子宫壁间肌瘤，主诉：下腹痛7天，合并低热，无阴道流血，WBC $9 \times 10^9/L$ ，最可能的诊断是
A. 子宫肌瘤合并感染
B. 子宫肌瘤红色变性
C. 子宫肌瘤囊性变
D. 子宫肌瘤蒂扭转
E. 妊娠合并阑尾炎
63. 60岁妇女，绝经11年，阴道流血2个月，一般状态尚好，妇检：子宫约孕8周大小，质软，分段诊刮病理报告：子宫内膜癌腺癌累及宫颈，胸片（-），心电图正常。其最佳手术方式是
A. 子宫全切术
B. 子宫全切术+双附件切除术
C. 子宫根治术
D. 子宫全切术+双附件切除术+淋巴结清扫术
E. 子宫次全切除术
- （64~66题共用题干）女性，28岁，平时月经规律，此次停经50天。行人工流产术，术中见绒毛，术后至今已3周余，阴道仍淋漓出血，4年前曾因侵蚀性葡萄胎行化疗。妇科检查：子宫丰满，前壁凸出，质软，无压痛，活动好。彩色B超检查宫腔线清晰，前壁肌层有局限性丰富血流信号，宫腔内未见有占位病灶。
64. 为明确诊断，首选的检查应是

医师资格考试辅导

- A. HCG 测定
B. 刮宫
C. 宫腔镜
D. 腹腔镜
E. 孕激素试验
65. 若此例尿 HCG 测定为阳性，最可能的诊断是
A. 不全流产
B. 月经不调
C. 肌壁间子宫肌瘤
D. 绒毛膜癌
E. 侵蚀性葡萄胎复发
66. 本例行 X 线胸部摄片未见异常，其最佳治疗方案为
A. 全子宫+附件切除
B. 全子宫切除+淋巴结清扫
C. 全子宫切除
D. 全身化疗
E. B 超下局部注射抗癌药物
67. 患者，35 岁，继发闭经 1 年，雌激素试验 (+)，FSH、LH 值均 <5U/L，多次重复垂体兴奋试验无反应，闭经的原因在
A. 丘脑下部
B. 卵巢
C. 垂体
D. 子宫
E. 输卵管
68. 45 岁，妇女，患 II 度子宫脱垂伴阴道前后壁明显膨出，2 个月前患乙型肝炎住院治疗 50 天，现来院咨询避孕方法，应选用
A. 宫内节育器
B. 口服避孕药
C. 安全期避孕
D. 外用避孕药膜
E. 男用阴茎套
69. 女性，32 岁，剖宫产术后 5 个月，不哺乳、月经已复潮，但周期不规则，平素经量多，有贫血史，宫颈糜烂。首选避孕方法为
A. 阴茎套
B. 安全期避孕
C. 宫内节育器
D. 输卵管绝育术
E. 口服短效避孕药

医师资格考试辅导

70. 42岁，妇女。患慢性肾炎3年，半年前因早孕行药物流产，现要求避孕指导。本例最正确的避孕措施应是

- A. 安全期避孕
- B. 口服短效避孕药
- C. 皮下埋植避孕
- D. 阴茎套避孕
- E. 行输卵管结扎

(71~73题共用题干)患者，27岁。早孕7周，行人工流产术中，患者突然恶心，出冷汗，查体：面色苍白，BP 70/50mmHg，P 60次/分。

71. 该患者首先考虑为

- A. 子宫穿孔
- B. 羊水栓塞
- C. 空气栓塞
- D. 人流反应综合征
- E. 漏吸

72. 该患下一步处置为

- A. 阿托品 0.5mg 肌注
- B. 异丙嗪 25mg 肌注
- C. 氯丙嗪 25mg 肌注
- D. 杜冷丁 50mg 肌注
- E. 吗啡半量肌注

73. 如何操作能减少上述情况的出现

- A. 反复吸刮以防残留
- B. 扩张宫颈要轻柔
- C. 人流手术尽量在孕40天内进行
- D. 人流手术时负压要大
- E. 人流手术时要保证足够的手术时间

74. 属于盆腔炎性疾病诊断特异性标准（2015年美国CDC诊断标准）的是

- A. 宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛
- B. 实验室证实的宫颈淋病奈瑟菌或衣原体阳性
- C. 宫颈或阴道异常黏液脓性分泌物
- D. 阴道分泌物生理性盐水涂片见大量白细胞
- E. 经阴道超声或磁共振检查显示输卵管增粗、输卵管积液

(75~77题共用题干)女，23岁，G₀P₀。右下腹隐痛半个月，加重5小时。月经不规律，查体：T 37.0℃，P 96次/分，R 23次/分，BP 105/75mmHg。妇科检查：子宫右旁可触及大小约6cm的实性包块，触痛，子宫及左侧附件未触及异常。血清AFP 900 μg/L。

75. 该患者最可能的诊断是

- A. 卵巢上皮性肿瘤
- B. 卵巢支持细胞-间质细胞瘤
- C. 卵巢颗粒细胞瘤
- D. 卵巢无性细胞瘤

E. 卵巢卵黄囊肿

76. 手术探查见右卵巢囊肿，表面光滑，未破裂，子宫及左侧附件正常，盆、腹腔未见病灶。

最适合的手术方式是

- A. 双侧附件切除术
- B. 子宫+双侧附件切除术
- C. 单纯右侧卵巢肿瘤切除术
- D. 子宫+右侧附件切除术
- E. 保留生育功能的分期手术

77. 术后首选的治疗方式是

- A. 化学治疗
- B. 放射治疗
- C. 生物治疗
- D. 内分泌治疗
- E. 随访观察