

妇产科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 12 期

【妊娠诊断】

1. 妊娠 36 周末手测宫底高度是

- A. 脐上 3 横指
- B. 脐与剑突之间
- C. 剑突下 2 横指
- D. 脐与剑突之间或略高
- E. 剑突下 3 横指

【正确答案】C

【答案解析】12 周末耻骨联合上 2~3 横指，16 周末脐耻之间，20 周末脐下 1 横指，24 周末脐上 1 横指，28 周末脐上 3 横指，32 周末脐与剑突之间，36 周末剑突下 2 横指，40 周末脐与剑突之间或略高。【医学教育网原创】

2. 关于中、晚期妊娠的特点，不正确的是

- A. 产妇于妊娠 18~20 周开始感有胎动，妊娠周数越多，胎动越活跃，直至临产
- B. 孕 18~20 周即可经腹用听筒听到胎儿心音
- C. 孕 24 周时经腹壁可触到子宫内的胎体
- D. 妊娠 24 周时多能描记到较规律的心电图图形
- E. 子宫增大与孕周相符

【正确答案】A

【答案解析】孕妇 18~20 周自觉胎动，每小时 3~5 次，妊娠周数越多，胎动越活跃，但到妊娠末期，胎动逐渐减少。【医学教育网原创】

3. 不能诊断为早孕的项目为

- A. 阴道及宫颈软，紫蓝色
- B. 黑格征阳性
- C. 黄体酮试验阳性
- D. 尿 hCG 阳性
- E. 子宫增大变软，呈球形

【正确答案】C

【答案解析】体征

1. 乳房的变化：乳房渐大，自觉乳房轻度胀痛及乳头疼痛。检查见乳头及乳晕着色加深，乳晕周围有蒙氏结节出现。

2. 生殖器官的变化：妊娠 6~8 周可见阴道壁及宫颈充血，呈紫蓝色。双合诊检查发现宫颈变软，子宫峡部极软，感觉宫颈与宫体似不相连，称为黑格征 (Hegar sign)。

#### 辅助检查

1. B 型超声显像法：在增大的子宫轮廓中，见到来自羊膜囊的圆形光环，妊娠环内为液性暗区(羊水)。最早在妊娠 5 周时见到妊娠环。若在妊娠环内见到有节律的胎心搏动和胎动，可确诊为早期妊娠活胎。

2. 妊娠试验：用酶联免疫吸附法检测，若为阳性表明受检者尿中含有 HCG，可以协助诊断早期妊娠。

3. 宫颈黏液检查：宫颈黏液涂片干燥后光镜下见到排列成行的椭圆体，则早期妊娠的可能性大。

4. 黄体酮试验：利用孕激素在体内突然撤退能引起子宫出血的原理，每日肌注黄体酮 20mg，连用 3 天，停药后观察 2~7 天，若超过 7 天仍未出现阴道流血，则早期妊娠的可能性很大。【医学教育网原创】