

医学教育网执业西药师：《答疑周刊》2021 年第 37 期

问题索引：

1. 【问题】剂型的正确使用常考知识点总结。
2. 【问题】宜多喝水的药物的总结。
3. 【问题】透析患者用药注意事项总结。

具体解答：

1. 【问题】剂型的正确使用常考知识点总结。

剂型	常考知识点总结
泡腾片	严禁直接服用或口服[医学教育网原创]
舌下片	含后 30 分钟内不宜吃东西或饮水
咀嚼片	在口腔内的咀嚼时间宜充分； 用于中和胃酸时，宜在餐后 1~2 小时服用
含漱剂	含漱后不宜马上饮水和进食，以保持口腔内药物浓度
阴道栓	给药后 1~2 小时不排尿[医学教育网原创]
直肠栓	如栓剂变软，可放入冰箱或凉水中，直到变硬为止；推入直肠，距肛门口成人 3cm，儿童 2cm；给药后 1~2 小时不排便
缓、控释制剂	一般应整片或整丸吞服，严禁嚼碎和击碎分次服用； 给药时间固定

2. 【问题】宜多喝水的药物的总结。

- (1) 平喘药：氨茶碱、胆茶碱、二羟丙茶碱
- (2) 利尿药：排石汤、排石颗粒、优克龙
- (3) 抗痛风药：苯溴马隆、丙磺舒、别嘌醇
- (4) 双膦酸盐（骨质疏松）：阿仑膦酸钠、帕屈膦酸钠、氯膦酸二钠
- (5) 电解质：补液粉、补液盐[医学教育网原创]
- (6) 磺胺类药物：磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑
- (7) 氨基糖苷类抗生素：链霉素、庆大霉素、卡那霉素、阿米卡星

- (8) 氟喹诺酮类抗生素：XX 沙星[医学教育网原创]
- (9) 利胆药：苯丙醇、去氢胆酸、熊去氧胆酸
- (10) 蛋白酶抑制剂（艾滋病）：利托那韦、茚地那韦、安普那韦、洛匹那韦

3. 【问题】透析患者用药注意事项总结。

透析常用药物	原因	注意事项
磷结合剂（钙剂）	磷不能通过透析而被清除，肾衰患者常有高磷血症，使用“磷结合剂”以减少磷的吸收	注意必须在进食的同时服用，否则无效
维生素 D（骨化三醇、阿法骨化醇）	肾脏功能发生衰竭时，就会缺乏活性形式的维生素 D	应在晚上睡前服药
铁剂	促进身体合成红细胞	宜在两餐间服用铁剂，与钙剂错开，不饮茶
维生素 B 和维生素 C	易由透析丢失，需每日补充	VC 1g；B ₁ 和 B ₆ 各 10mg
缓泻药（开塞露、乳果糖）	透析患者易形成便秘	[医学教育网原创]
促红素（EPO）	肾衰者，肾脏不能产生足够 EPO	EPO 只能采用注射方式给药
非甾体抗炎药（内服：对乙酰氨基酚；外用：双氯芬酸乳膏）	透析患者可出现骨关节疼痛或头疼[医学教育网原创]	首选对乙酰氨基酚缓解疼痛，避免应用阿司匹林