

口腔助理医师考试：《答疑周刊》2021年第53期

【口腔颌面外科学】

下列关于面部疔痈的治疗方法中，正确的是

- A. 局部热敷
- B. 苯酚、硝酸银烧灼
- C. 高渗盐水纱布局部持续湿敷
- D. 挤压、挑刺，以利于引流
- E. 溃破后立即停止局部湿敷

【正确答案】 C

【答案解析】 疔痈的局部治疗宜用高渗盐水或含抗菌药物的盐水纱布局部持续湿敷，可促进早期疔痈的局限、软化和穿破。已溃破或切开引流后，局部仍应以高渗盐水纱布持续湿敷，可收良好的提脓效果，但已脓污的盐水纱布应及时更换，湿敷一般应持续到脓液消失、创面趋于平复为止。过早停止湿敷，可因脓道阻塞而使病情反复加重。

【医学教育网原创】

【口腔颌面外科学】

关于吸入性窒息急救错误的是

- A. 应立即行气管切开术
- B. 悬吊下坠的上颌骨骨块
- C. 充分吸出进入下呼吸道的分泌物及其他异物
- D. 注意防治肺部并发症
- E. 充分吸出进入下呼吸道的血液

【正确答案】 B

【答案解析】 吸入性窒息的急救：应立即行气管切开术，通过气管导管，充分吸出进入下呼吸道的血液、分泌物及其他异物，解除窒息。此类患者要特别注意防治肺部并发症。

【口腔解剖生理学】

下颌小舌是下列哪项结构的附着位置

- A. 茎突舌骨韧带
- B. 颞下颌韧带
- C. 翼下颌韧带
- D. 茎突下颌韧带
- E. 蝶下颌韧带

【医学教育网原创】

【正确答案】 E

【答案解析】 下颌支其内侧面中央略偏后上方有下颌孔；孔的前方有下颌小舌，为蝶下颌韧带附着处。

【口腔解剖生理学】

口腔黏膜的痛觉分布不均匀，以下有关无痛区的相关描述中正确的是

- A. 与第一磨牙相对的颊黏膜区有触觉感受点而无痛觉感受点
- B. 与第一磨牙相对的颊黏膜区有痛觉感受点而无触觉感受点
- C. 与第二磨牙相对的颊黏膜区有痛觉感受点而无触觉感受点
- D. 与第三磨牙相对的颊黏膜区有触觉感受点而无痛觉感受点
- E. 自颊侧黏膜中央至口角的一段带状区痛觉较迟钝

【正确答案】 E

【答案解析】 口腔黏膜的痛觉分布不均匀，与第二磨牙相对的颊黏膜区有触觉感受点而无痛觉感受点，自颊侧黏膜中央至口角的一段带状区痛觉较迟钝，称为无痛区。

【医学教育网原创】