

2021 年《中药学综合知识与技能》考前密卷（二）

一、最佳选择题

1. 按药物自然属性分类的首部本草专著是

- A. 《新修本草》
- B. 《本草经集注》
- C. 《神农本草经》
- D. 《本草纲目》
- E. 《重修政和本草》

2. 推动和促进人体的生长发育，温煦和激发各脏腑、经络等组织器官生理活动的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 肝气

3. 某女，35 岁。出现表情淡漠，寡言少语，闷闷不乐，哭笑无常等症状，其临床意义是

- A. 失神
- B. 少神
- C. 假神
- D. 神乱
- E. 无神

4. 引起血清肌酸激酶（CK）增高的疾病是

- A. 早期急性心肌梗死
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 急性颅脑损伤
- D. 成人脑膜炎
- E. 癫痫大发作

5. 桑杏汤是治疗咳嗽的常用方剂，其针对的证候是

- A. 风寒犯肺

B. 风热犯肺

C. 痰热壅肺

D. 燥邪伤肺

E. 肺肾阴虚

6. 某男，62 岁。患胸痹 5 年，心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，入夜为甚，伴有胸闷，日久不愈，舌质紫暗，有瘀斑，其证当属于

A. 寒凝心脉

B. 痰瘀痹阻

C. 气虚血瘀

D. 心肾阳虚

E. 气滞血瘀

7. 某男，25 岁，因腹泻就诊。症见腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，伴有未消化食物，泻后痛减，噤腐吞酸，不思饮食，舌苔厚腻，脉滑，治宜选用的方剂是

A. 保和丸

B. 参苓白术散

C. 四神丸

D. 葛根芩连汤

E. 藿香正气水

8. 某女，58 岁。眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，颜面潮红，急躁易怒。舌红苔黄，脉弦。治疗应选用的治法是

A. 平肝潜阳，滋养肝肾

B. 补益气血，调养心脾

C. 滋养肝肾，益精填髓

D. 化痰祛湿，健脾和胃

E. 疏肝理气，清热利湿

9. 某女，68 岁。猝然昏仆，不省人事，半身不遂，口眼喎斜，言语不利，辨析其疾病是

A. 中风

B. 厥证

C. 痫病

D. 癲病

E. 狂证

10. 某男，23 岁，颜面、胸背皮肤油腻，皮疹红肿疼痛，有脓疱；伴口臭，便秘，溲黄。

舌质红，苔黄腻，脉滑数。治宜选用的中成药是

A. 清肺抑火丸

B. 银翘解毒片

C. 连翘败毒丸

D. 湿毒清胶囊

E. 金花消痤丸

11. 某女，48 岁。经血量多，非时而下，淋漓不净，血色紫暗有块，小腹疼痛；舌紫暗，脉弦涩有力。中医辨证是

A. 气血两虚

B. 脾不统血

C. 肝肾不足

D. 瘀血阻络

E. 冲任不固

12. 某男，6 岁，厌食，面色萎黄，神疲多汗，大便稀薄，夹有未消化的食物，形体偏瘦，肢倦乏力，治疗宜选用的方剂是

A. 消乳丸

B. 归脾丸

C. 四物汤

D. 清宁丸

E. 异功散

13. 某女，36 岁。咽部干痒灼热，微痛，有异物感，咳嗽少痰，颧红，潮热；舌质红，苔少，脉细数。应选用的中成药是

A. 清咽利膈丸

B. 玄麦甘桔颗粒

C. 板蓝根颗粒

- D. 复方鱼腥草片
- E. 利咽解毒颗粒

14. 中药番红花的正名是

- A. 红花
- B. 藏红花
- C. 西红花
- D. 草红花
- E. 红蓝花

15. 小青龙汤治疗痰多咳喘，处方为：麻黄、白芍、细辛、干姜、甘草、桂枝、半夏、五味子，方中半夏应选用的炮制品是

- A. 生半夏
- B. 清半夏
- C. 姜半夏
- D. 法半夏
- E. 半夏曲

16. 某男，32 岁。因银屑病来医院就诊，医师辨证为血虚风燥，开具的处方为：土茯苓、半枝莲、龙葵、生地黄、当归、白芍、徐长卿、牡丹皮、紫草、水牛角、炒槐花、北豆根、生侧柏、白鲜皮、地肤子、鬼箭羽。煎煮时需要后下的饮片是

- A. 牡丹皮
- B. 徐长卿
- C. 土茯苓
- D. 炒槐花
- E. 白鲜皮

17. 因贮存不当，可使饮片的颜色、气味、形态、因内部组织等出现变异，其中易虫蛀与霉变的饮片是

- A. 当归
- B. 贝母
- C. 山药
- D. 牛膝

E. 黄芪

18. 某男，56 岁。遍身浮肿，腹胀，二便不利，服用峻下逐水的舟车丸，为防伤正气，可联用的中成药是

A. 二陈丸

B. 麻仁丸

C. 四君子丸

D. 附子理中丸

E. 六味地黄丸

19. 某男，65 岁，因肾虚作喘，服用金匱肾气丸后症状稍有缓解，但出现口燥咽干等症。为进一步改善症状，执业药师建议加服的中成药是

A. 蛇胆川贝液

B. 生脉饮

C. 清气化痰丸

D. 参苏丸

E. 桂龙咳喘宁

20. 某男，28 岁，出租车司机。感冒 2 日，发热头痛，拟服药治疗。执业药师建议，该患者不宜选用含马来酸氯苯那敏的中成药是

A. 感冒软胶囊

B. 抗感灵片

C. 强力感冒片

D. 速感康胶囊

E. 新复方大青叶片

21. 婴幼儿脏腑娇嫩，形体未充。下列关于婴幼儿用药原则的表述，错误的是

A. 用量宜轻

B. 宜佐滋补之品

C. 宜用轻清之品

D. 宜佐凉肝定惊之品

E. 宜佐健脾和胃之品

22. 萜类在自然界分布广泛，种类繁多，不少萜类化合物对肝脏有明显毒副作用，可引

起急性中毒性肝炎，出现转氨酶升高、黄疸、肝肿大。其中含萜类并具有肝脏毒性的中药是

- A. 苍耳子
- B. 黄药子
- C. 蓖麻子
- D. 相思豆
- E. 望江南子

23. 某男，48 岁。因吵架暴怒而致肝火亢盛，出现咳嗽咯血等症状，其疾病传变是

- A. 相克
- B. 子病及母
- C. 相侮
- D. 母病及子
- E. 相乘

24. 某男，30 岁。发热喜凉，面红目赤，伴有口臭，牙龈肿痛，大便干燥，小便短赤，舌红，苔黄，脉数。中医辨证是

- A. 实热
- B. 虚热
- C. 虚实错杂
- D. 实寒
- E. 里寒表热

25. 根据中医常见病辨证论治的理论，时行感冒的治法是

- A. 辛温解表
- B. 辛凉解表
- C. 清热解毒
- D. 益气解表
- E. 清热凉血

26. 某男，32 岁。近 3 天所在单位多人发热，患者 1 天前突然发热，高热不退，周身酸痛，无汗，口干咽喉疼痛，舌质红，苔黄，脉浮数，应选用的中医治法是

- A. 辛温解表，凉血泻火
- B. 辛凉解表，凉血泻火

C. 清热解毒，凉血泻火

D. 益气解表，凉血泻火

E. 清热凉血，凉血泻火

27. 某女，33 岁。近几日总是精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，胸闷暖气，喜太息，不思饮食，大便不调。舌苔薄或腻，脉弦。治宜选方

A. 半夏厚朴汤

B. 柴胡疏肝散

C. 甘麦大枣汤

D. 归脾汤

E. 桃红饮

28. 某男，35 岁，口腔黏膜溃疡，周边红肿，灼痛明显，每因过食煎炒辛辣食物而发，并伴有口渴心烦，大便秘结，舌红，苔黄腻，脉数有力。治宜选用的方剂是

A. 凉膈散

B. 枳术丸

C. 龙胆泻肝汤

D. 附子理中丸

E. 玉女煎

29. 医生在中药处方中应用不同的术语，对饮片炮制、产地、质地、采时新陈、颜色、气味等有特殊要求加以注明。下列与药名有关的术语中，属于对品质有特殊要求的是

A. 田三七

B. 江枳壳

C. 陈香橼

D. 净山楂

E. 紫丹参

30. 某男，43 岁。咳嗽气粗，痰多黄稠，严重时痰中夹血或咳鲜血，伴胸闷烦热，汗出，口渴喜冷饮，舌质红，苔黄腻，脉滑数。该患者禁用的中药应是

A. 猪牙皂

B. 黄芩

C. 桑白皮

- D. 橘红
- E. 法半夏

31. 执业药师应对处方进行用药适宜性审核，如发现有不合理联用的药组，建议纠正的是

- A. 人参养荣丸与归脾丸
- B. 复方丹参滴丸与速效救心丸
- C. 四神丸与附子理中丸
- D. 脑立清胶囊与六味地黄丸
- E. 二陈丸与平胃散

32. 某男，35 岁，因患肺结核服用抗结核药治疗，出现肝功能损害。医生建议加用中药，能够减轻抗结核药肝损伤的方剂是

- A. 玉屏风散
- B. 逍遥散
- C. 六君子汤
- D. 理中汤
- E. 四逆汤

33. 关于中成药之间配伍应用主要形式的说法，错误的是

- A. 功效不同的中成药配伍应用，辅药能够提高主药的功效
- B. 含有毒成分的中成药配伍应用，可起到以毒攻毒的作用
- C. 功效相似的中成药合理配伍应用，可起到协同增效作用
- D. 两药同用，一种中成药能够抑制另一种中成药的副作用
- E. 中成药配伍应用可采用内服与外用相结合的治法

34. 某男，因患慢性心衰，长期服用强心苷类药物，现咽喉红肿疼痛，音哑失音。下列中成药中，不宜与强心苷类药物同用的中成药是

- A. 清音丸
- B. 金果饮
- C. 六神丸
- D. 黄氏响声丸
- E. 牛黄解毒片

35. 因含有马来酸氯苯那敏，司机和登高作业者患感冒时不宜服用的中成药是

- A. 强力感冒片
- B. 金羚感冒片
- C. 抗感灵片
- D. 感冒清热颗粒
- E. 舒肺糖浆

36. 因含有朱砂，如过量服用，可致急性肾功能衰竭的中成药是

- A. 牛黄上清丸
- B. 天王补心丸
- C. 牛黄降压丸
- D. 冠心苏合丸
- E. 牛黄解毒丸

37. 某男，38 岁，因“感冒”到当地诊所就诊，予维 C 银翘片口服 4 次/日，每次 4 片。3 天后，患者全身泛发红斑，自觉轻微瘙痒。前往医院就诊。查体：体温 36.8℃；，脉搏 88 次/分，血压 152/82mmHg，神志清楚；四肢躯干泛发红斑，部分融合，压之褪色，米粒至蚕豆大小，皮温不高。诊断：发疹型药疹。给予甲泼尼龙 20mg 静脉滴注，氯雷他定 10mg 口服等治疗，患者好转，症状消失。根据用药错误评估分级，该例用药错误属于

- A. H 级
- B. F 级
- C. E 级
- D. I 级
- E. D 级

38. 某患者因治疗需要使用柴胡注射液后出现过敏性休克，立即停药并及时抢救后痊愈，后该患者因使用其他药物导致原有疾病加重，出现并发症死亡。现填写该患者只用柴胡注射液的不良反应报告。对不良反应/事件的结果应填写

- A. 死亡
- B. 痊愈
- C. 未好转
- D. 不详

E. 有后遗症

39. 某男，37 岁。化脓性扁桃体炎入院，静滴穿琥宁注射液 10 分钟后，出现高热、寒战、面色苍白、呼吸困难等症状。经抢救，症状逐渐好转。此案例反映了中药注射剂存在的不合理使用情况是

- A. 药证不符
- B. 超功能主治用药
- C. 给药途径不当
- D. 超剂量使用
- E. 配伍禁忌

40. 罂粟壳中毒的典型症状是

- A. 精神亢奋
- B. 呼吸急促
- C. 血压升高
- D. 瞳孔极度缩小
- E. 心跳加速

二、配伍选择题

[41~42]

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

41. 某女，41 岁。闭经半年余，妊娠反应阴性，体检无其他疾病，来医院就诊。辨证为冲任亏虚、天癸早衰。根据藏象理论，与天癸密切相关的脏是

42. 某女，35 岁，经常情志抑郁，善太息，食少纳呆，月经不调，诊断为郁证。根据藏象理论，主司疏泄、条畅气机的脏是

[43~44]

- A. 肺朝百脉失常
- B. 脾主统血失常

C. 肾主藏精失常

D. 心主血脉失常

E. 肝主疏泄失常

43. 某男，50 岁。胸痛连背，背痛彻胸，气短，劳则尤甚；舌紫暗，脉沉涩。基于五脏的生理功能分析，其病变属于

44. 某女，35 岁。胸胁胀痛，咽中异物感；时咳，痰少黏稠；舌淡红，脉沉弦。基于五脏的生理功能分析，其病变属于

[45~46]

A. 风邪善行数变

B. 寒邪凝滞主痛

C. 湿邪湿性重着

D. 湿邪阻遏气机

E. 风为百病之长

45. 某男，39 岁。肢体关节、肌肉酸楚，重着，疼痛，肿胀散漫，关节活动不利，肌肤麻木不仁，舌质淡，舌苔白腻，脉濡缓。体现的病邪致病特点是

46. 某女，25 岁。肢体关节、肌肉疼痛酸楚，关节屈伸不利，疼痛呈游走性，初起可见恶风、发热等表证，舌苔薄白，脉浮或浮缓。所感受的病邪是体现的病邪致病特点是

[47~49]

A. 肝肾功能异常、粒细胞、白细胞和血小板减少精子数量减少

B. 急性肾功能损害、皮疹、头晕、胃肠道反应、过敏样反应

C. 肝损害、剥脱性皮炎

D. 胰腺炎、低钾血症、低氯血症、低钠血症

E. 过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘、过敏性间质性肾炎

47. 服用克银丸发生严重不良反应时可见

48. 使用清开灵注射液发生严重不良反应时可见

49. 服用珍菊降压片发生严重不良反应时可见

[50~52]

A. 眼睑、口唇或手指、足趾不时颤动

B. 足或手软弱无力、行动不灵

- C. 项背强直、角弓反张、四肢抽搐
- D. 一侧手足举动不遂，或麻木不仁
- E. 突然跌倒、昏不知人、口吐白沫

- 50. 痿证多见于
- 51. 痫病多见于
- 52. 痉病多见于

[53~55]

- A. 微脉
- B. 弱脉
- C. 滑脉
- D. 细脉
- E. 虚脉

53. 某男，70 岁。患消渴病多年饮食减少，神疲乏力，四肢倦怠；舌淡，苔白，脉来三部举按皆无力，隐隐蠕动于指下，此脉象是

54. 某男，80 岁。久病，不耐寒热，头晕神疲乏力；自汗盗汗，脉来沉细，应指无力，此脉象是

55. 某男，74 岁。久病泄泻，气短汗出，神情淡漠，面色苍白，手足逆冷；舌淡，苔白，脉来若有若无，按之欲绝，此脉象是

[56~58]

- A. 肝阳化风证
- B. 血虚生风证
- C. 肝阳上亢证
- D. 血燥生风证
- E. 阴虚生风证

56. 某男，50 岁，眩晕耳鸣，头重脚轻，腰膝酸软，辨析其证候是

57. 某女，40 岁，眩晕震颤，面色萎黄，舌淡少苔，辨析其证候是

58. 某男，70 岁，眩晕欲仆，头胀头痛，肢麻震颤，辨析其证候是

[59~60]

- A. 气虚证

B. 气血两虚证

C. 血虚证

D. 气虚血瘀证

E. 气滞血瘀证

59. 某女，28 岁。胸胁胀满走窜疼痛，性情急躁，并兼见痞块刺痛拒按，舌紫暗有瘀斑，痛经、经色紫暗有块，乳房胀痛，中医辨证是

60. 某男，55 岁。少气懒言，乏力自汗，面色萎黄，心悸失眠，舌淡而嫩，脉细弱，中医辨证是

[61~63]

A. 通宣理肺丸

B. 二母宁嗽丸

C. 二陈丸

D. 固本止咳片

E. 小青龙合剂

61. 治疗咳嗽风燥伤肺证，宜选用的中成药是

62. 治疗咳嗽风寒袭肺证，宜选用的中成药是

63. 治疗咳嗽痰湿蕴肺证，宜选用的中成药是

[64~66]

A. 血府逐瘀汤加减

B. 生脉散加减

C. 补阳还五汤加减

D. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤加减

E. 参蛤散加减

64. 某男，65 岁。胸痛胸闷，胸胁胀满，心悸，唇舌紫暗，脉涩。宜选用的方剂是

65. 某男，50 岁。胸痛隐隐，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗；舌淡暗，脉弱而涩。宜选用的方剂是

66. 某女，53 岁。胸痛彻背，感寒痛甚，胸闷气短，心悸，形寒肢冷；舌质紫暗，苔薄，脉沉迟。宜选用的方剂是

[67~70]

- A. 当归龙荟丸
- B. 芎芷石膏汤
- C. 川芎茶调散
- D. 天麻钩藤饮
- E. 通窍活血汤

67. 某男，37 岁。头部外伤后出现头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，舌质紫，苔薄白，脉细涩，治宜选用的方剂是

68. 某女，55 岁。近日偶感风寒，出现头痛症状，且起病较急，痛连项背，恶风畏寒，遇风尤剧，口不渴，苔薄白，脉浮紧。治宜选用的方剂是

69. 某女，67 岁。高血压病史 3 年，近日生气后出现头晕，头两侧胀痛，心烦易怒，夜眠不宁，胁痛，面红口苦，舌红苔薄黄，脉弦有力。治宜选用的方剂是

70. 某女，44 岁。近日天气炎热，因调摄不慎，而出现头痛而胀，甚则头痛如裂，恶风发热，面红目赤，舌红苔黄，脉浮数。治宜选用的方剂是

[71~73]

- A. 消糖灵胶囊
 - B. 参苓白术散
 - C. 生力胶囊
 - D. 补肾强身片
 - E. 麦味地黄丸
- 治疗消渴时

71. 属肾阴亏虚者，宜选用的中成药是

72. 属脾胃气虚者，宜选用的中成药是

73. 属阴虚燥热者，宜选用的中成药是

[74~76]

- A. 济生肾气丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 八正合剂
- D. 肾炎四味片
- E. 癃清片

74. 黄某，男，36 岁。小便短赤灼热，小腹胀满，口苦口黏，大便不畅，舌质红，苔黄腻，脉数。宜选用的中成药是

75. 王某，男，46 岁。小便点滴而下，尿如细线，烦躁口苦，舌紫暗，舌苔黄腻，脉涩。宜选用的中成药是

76. 李某，男，56 岁。小便排出无力，面色㿠白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝冷而酸软无力。舌淡胖，苔薄白，脉弱。宜选用的中成药是

[77~79]

- A. 薯蓣丸
- B. 四神丸
- C. 参芪十一味颗粒
- D. 补白颗粒
- E. 六味地黄丸

77. 某女，31 岁。头晕眼花，面色萎黄，口唇色淡，月经量少；舌质淡，脉细。医生辨证为虚劳血虚证。应选用的中成药是

78. 某女，45 岁。畏寒怕冷，四肢不温，口淡不渴，自汗，小便清长，大便溏薄。舌体胖，舌质淡，苔白滑，脉沉迟。医生辨证为虚劳阳虚证。应选用的中成药是

79. 某男，57 岁。神疲乏力，少气懒言，自汗；舌质淡，苔薄白，脉虚。医生辨证为虚劳气虚证，应选用的中成药是

[80~82]

- A. 吴茱萸、蛇床子
- B. 车前子、地肤子
- C. 山豆根、制川乌
- D. 马钱子、天仙子
- E. 枇杷叶、侧柏叶

根据《中国药典》对有毒中药的分类

80. “小毒”中药是

81. “有毒”中药是

82. “大毒”中药是

[83~85]

- A. 蟾酥
- B. 白降丹
- C. 生千金子
- D. 雄黄
- E. 生马钱子

毒性中药系指毒性剧烈，治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的中药。因此执业药师在审核或调剂时含有特殊管理毒性中药的处方时，掌握其用量非常重要。

83. 仅供外用的毒性中药是

84. 内服，用量 0.05~0.1g，入丸散用的毒性中药是

85. 内服，用量 0.3~0.6g，炮制后入丸散用的毒性中药是

[86~87]

- A. 涂膜剂
- B. 气雾剂
- C. 贴膏剂
- D. 凝胶剂
- E. 流浸膏剂

中成药因剂型不同，采用的贮存养护方法也不同。

86. 除另有规定外，应避光，密闭贮存，并应防冻的中成药剂型是

87. 除另有规定外，应置遮光容器内密封和阴凉处贮存的中成药剂型是

[88~90]

- A. 麝香保心丸
- B. 六味地黄丸
- C. 人参鹿茸丸
- D. 银杏叶制剂
- E. 柴胡舒肝丸

88. 老人服用地高辛时不宜同时服用的中成药是

89. 老人服用法莫替丁时不宜同时服用的中成药是

90. 老人服用二甲双胍时不宜同时服用的中成药是

三、综合分析选择题

[91~93]

某男，65 岁。哮喘 10 余年。气短乏力，痰多清稀，食纳减少，腹胀便溏，足面浮肿。舌淡苔白，脉细弱。

91. 中医辨证是

- A. 肾不纳气证
- B. 肺肾两虚证
- C. 心肾阳虚证
- D. 心肺两虚证
- E. 肺脾两虚证

92. 辨证要点要有咳喘，食少，有兼见

- A. 气虚
- B. 气滞

- C. 血虚
- D. 阴虚
- E. 阳虚

93. 根据八纲辨证，该证属于

- A. 表证
- B. 寒证
- C. 热证
- D. 虚证
- E. 阳证

[94~96]

患者男，70 岁，冠心病史 7 年。常感胸痛隐隐，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌淡黯苔白，脉弱。

94. 中医辨证为

- A. 寒凝心脉
- B. 痰瘀痹阻
- C. 气虚血瘀
- D. 气阴两虚

E. 心肾阳虚

95. 根据辨证结果，应采取的治法是

A. 温阳散寒

B. 益气活血

C. 豁痰化瘀

D. 益气养阴

E. 温补心肾

96. 根据应采取的治法，不宜选用的中成药是

A. 麝香保心丸

B. 芪参益气滴丸

C. 参桂胶囊

D. 心力丸

E. 活心丸

[97~98]

某男，70 岁，长期服用西药降糖药，血糖稳定。近日听人介绍又自行加服了中成药消渴丸。2 日后，出现低血糖反应。遂去医院就诊。

97. 医师分析出低血糖反应的原因，与过量服用降糖药有关。并告知患者，在其所服用的消渴丸中含有降糖类化学药，会与原用的降糖药产生叠加作用。消渴丸中所含有的化学药成分是

A. 二甲双胍

B. 格列本脲

C. 阿卡波糖

D. 罗格列酮

E. 瑞格列奈

98. 进入冬季，患者加服中药膏方调补，一段时间后，出现血糖波动，时有升高，分析其原因，是与其所含膏方中某些中药有关。下列中药，能使血糖升高的药组是

A. 鹿茸、甘草

B. 麦冬、沙参

C. 天冬、赤芍

- D. 肉苁蓉、肉桂
- E. 制首乌、熟地黄

[99~101]

某女，45 岁。患有类风湿性关节炎，长期服用解热镇痛药。近期咽喉肿痛、牙痛，邻居介绍服用新癢片。患者购药时向执业药师咨询，希望了解该药的更多信息。药师咨询患者的一般情况和用药目的后，结合病人既往治疗情况，阻止了该患者购买新癢片。

99. 因为新癢片含有解热镇痛药，为防止重复用药，药师阻止了患者购药。新癢片含有的化学成分是

- A. 双氯芬酸
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 布洛芬
- D. 吲哚美辛
- E. 安乃近

100. 药师进一步说明，若加服新癢片，造成解热镇痛药重复使用，会加大不良反应发生的可能性。关于该药发生不良反应的说法，错误的是

- A. 有头痛、头晕等中枢神经系统反应
- B. 发生过敏反应常为皮疹
- C. 常具有胃肠道反应
- D. 可引起肝肾损害
- E. 可引起粒细胞增高

101. 接着，药师向患者介绍，服用该药的注意事项，正确的是

- A. 孕妇慎用
- B. 肝肾功能不全者慎用
- C. 哺乳期妇女慎用
- D. 精神患者慎用
- E. 溃疡患者慎用

[102~103]

某男，68 岁。半年前因中风，遗留半身不遂，口眼喎斜，言语蹇涩，出院后常规服用阿司匹林肠溶片(每次 100mg，每日 1 次)。近 2 周，因过度劳累，患侧肢体无力、活动不便

加重，伴浮肿，面色少华：伸舌右偏，舌色淡紫，舌边有瘀斑，苔薄白，脉细涩无力。医师诊断为中风，证属气虚血瘀，处方如下：黄芪 30g，桃仁 10g，当归 6g，川芎 9g，红花 10g，赤芍 10g，地龙 6g，半夏 6g，7 剂，水煎服，每日 1 剂，早、晚分服。

102. 关于对该案例开展药学服务的说法，错误的是

- A. 建议中药处方选用炒桃仁、酒赤芍、生黄芪
- B. 建议黄芪一般用量为 30~60g，长期服用，每日用量不宜超过 120g
- C. 建议桃仁捣碎后入煎：水煎温服，每日 2 次，宜餐前服用
- D. 患者不欲服用汤剂，建议改服消栓胶囊，每次 2 粒，每日 3 次，饭后服用
- E. 建议患者加强偏瘫肢体的被动活动，进行各种功能锻炼

103. 1 周后，患者因外感风寒，内伤湿滞，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻，医师予以藿香正气水内服，执业药师应告知正确的服用方法是

- A. 餐前服用藿香正气水，餐后服用阿司匹林肠溶片
- B. 餐前服用藿香正气水，餐中服用阿司匹林肠溶片
- C. 餐中服用藿香正气水，餐前服用阿司匹林肠溶片
- D. 餐后服用藿香正气水，餐前服用阿司匹林肠溶片
- E. 餐后服用藿香正气水，餐中服用阿司匹林肠溶片

[104~106]

某患者开具的中药饮片处方中含肉豆蔻，药师调配成豆蔻，复核药师在查方时及时发现调配差错并予以纠正。

104. 以下有关豆蔻与肉豆蔻的比较，说法错误的是

- A. 豆蔻来自姜科，肉豆蔻来自肉豆蔻科
- B. 豆蔻属于芳香化湿药，肉豆蔻属于收涩药
- C. 豆蔻化湿行气，温中止呕；肉豆蔻涩肠止泻，温中行气
- D. 豆蔻可以治疗胃寒呕吐；肉豆蔻可以治疗食少呕吐
- E. 豆蔻需煨用，肉豆蔻需打碎后下

105. 此案例出现的用药错误属于

- A. A 级
- B. B 级
- C. C 级

D. D 级

E. E 级

106. 以下有关发生用药错误的风险因素的描述，说法错误的是

- A. 管理制度落实不到位，缺少专职的管理机构和人员，未建立正确的用药安全文化
- B. 医疗机构内部缺乏有效沟通，临床治疗和用药的各环节衔接不畅
- C. 工作空间宽敞，药品或给药装置等堆放整齐
- D. 人力资源不足，人员知识结构欠缺，且缺乏系统规范的培训
- E. 听似、看似易混淆药品未分开摆放并设置特殊警示标识

[107~110]

某男，32 岁。大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，小便短赤。舌红，苔黄燥，脉滑数。

107. 根据患者症状，中医应辨证为

- A. 冷秘
- B. 热秘
- C. 气秘
- D. 气虚秘
- E. 血虚秘

108. 治疗宜选用的治法是

- A. 益气润肠，通便止痛
- B. 温里散寒，通便止痛
- C. 顺气导滞，通便止痛
- D. 泻热导滞，润肠通便
- E. 补益脾阳，润肠通便

109. 治疗宜选用的方剂是

- A. 麻子仁丸
- B. 黄芪汤
- C. 温脾汤合半硫丸
- D. 肾气丸
- E. 六磨汤

110. 作为药师，指导患者在服用上述方剂时，为增强疗效，可选用的药引是

- A. 生姜煎汤送服
- B. 清茶送服
- C. 蜂蜜冲水送服
- D. 焦三仙煎汤送服
- E. 鲜芦根汤送服

四、多项选择题

111. 执业药师承接患者咨询的内容包括

- A. 药品名称、适应病证
- B. 用药方法、用药剂量
- C. 药物的稀释容积
- D. 药品价格、报销
- E. 服药后预计疗效及起效时间

112. 药学咨询服务是执业药师应用所学专业面向患者、医护人员、公众等提供直接的、负责的、与药品使用有关的服务，以期增强患者用药的依从性，减少药物不良反应，提高药物治疗的安全性、有效性与经济性。执业药师在用药咨询过程中的沟通技巧包括

- A. 认真倾听
- B. 注意口头语言的表达
- C. 注意肢体语言的运用
- D. 咨询时间宜长不宜短
- E. 提供的信息不宜过多

113. 在疾病发展过程中，病变有本质和征象一致者，有本质和征象不一致者，因此，临床治疗有正治和反治的不同，下列属于正治的有

- A. 寒者热之
- B. 寒因寒用
- C. 热者寒之
- D. 热因热用
- E. 虚则补之

114. 某女，29 岁，产后 10 天出现头晕眼花，心悸多梦，手足发麻，面色淡白无华，口

唇、爪甲色淡，舌质淡，脉细。治疗可选用的中成药有

- A. 十一味参芪胶囊
- B. 参芪十一味颗粒
- C. 归芪口服液
- D. 再造生血片
- E. 薯蓣丸

115. 中药饮片斗谱的编排是否科学、合理，直接影响配方效率和质量。处方中常以药对出现可放于同一斗中的饮片有

- A. 射干、北豆根
- B. 盐杜仲、盐续断
- C. 姜半夏、淡附片
- D. 羌活、独活
- E. 知母、浙贝母

116. 与氨茶碱合用会发生酸碱中和反应降低或失去药效的中药是

- A. 乌梅
- B. 木瓜
- C. 山楂
- D. 麻黄
- E. 女贞子

117. 肝功能不全患者因肝功能减退，药物代谢受到严重影响，在肝脏的作用时间延长，故此患者应在医师指导下慎重用药，用药时执业药师可给予的合理用药指导有

- A. 服药初始宜从小剂量开始
- B. 不能使用有肝毒性的药物
- C. 服药期间定期检查肝功能
- D. 选择肝毒性小的药物
- E. 注意观察用药后的反应

118. 属于运用五行相生关系解释疾病传变的有

- A. 肝病及肾
- B. 心病及肾

C. 肺病及肾

D. 脾病及肾

E. 肝病及脾

119. 某男，25 岁，因腹泻就诊。症见腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，伴有未消化食物，泻后痛减，噤腐吞酸，不思饮食，舌苔厚腻，脉滑。治宜可选用的中成药有

A. 连蒲双清片

B. 泻痢消胶囊

C. 加味保和丸

D. 枳实导滞丸

E. 和中理脾丸

120. 与西药抗肿瘤药联用，可以提高疗效。其中的中药可以提高天然杀伤细胞活性的能力，还可能有造血及护肝作用的中药方剂有

A. 十全大补汤

B. 补中益气汤

C. 小柴胡汤

D. 炙甘草汤

E. 加味逍遥散