

口腔执业助理医师：《答疑周刊》2022年第3期

问题索引：

1. 牙髓炎晚期最突出的症状是什么？
2. 逆行性牙髓炎临床检查结果有哪些？
3. 儿童乳前牙外伤的好发年龄段是？
4. 年轻恒牙牙脱臼再植术后弹性固定时间是多久？

具体解答：

1. 牙髓炎晚期最突出的症状是什么？

急性化脓性牙髓炎（牙髓炎晚期），最突出的症状

- A. 紧咬牙可缓解
- B. 咬合痛明显，不能对颌
- C. 不能平卧，直立可缓解
- D. 热刺激痛加重，冷水可缓解
- E. 阵发性痛加剧，无法缓解

【正确答案】D

【答案解析】“急性化脓性牙髓炎”的特殊反应是热刺激极敏感。冷刺激可缓解疼痛。[医学教育网原创] [医学教育网原创]

2. 逆行性牙髓炎临床检查结果有哪些？

对于逆行性牙髓炎，临床检查的叙述不正确的一项是

- A. 患牙没有可引发牙髓炎的牙体硬组织疾病
- B. 患牙有严重的牙周炎表现
- C. 患牙有严重的龋袋
- D. 牙齿可有不同程度的松动
- E. 可有牙周袋溢脓[医学教育网原创]

【正确答案】C

【答案解析】逆行性牙髓炎临床检查：患牙未查及可引发牙髓炎的牙体硬组织疾病。患牙有严重的牙周炎表现，如深达根尖区或根分叉的牙周袋、牙龈水肿充血、牙周袋溢脓；牙齿不同程度的松动；叩诊轻度疼痛（+）～中度疼痛（++），

叩诊浊音; X线片显示广泛的牙周组织破坏或根分叉病变。[医学教育网原创]

3. 儿童乳前牙外伤的好发年龄段是?

儿童上乳前牙外伤常见年龄为

- A. 1~2岁
- B. 3~4岁
- C. 4~5岁
- D. 6~7岁
- E. 8~9岁

【正确答案】A

【答案解析】乳牙外伤多发生在1~2岁儿童;年轻恒牙外伤多发生于7~9岁儿童;年轻恒牙外伤发生率高于乳牙;男孩发生率高于女孩。[医学教育网原创] [医学教育网原创]

4. 年轻恒牙牙脱臼再植术后弹性固定时间是多久?

全脱出的年轻恒牙再植术后弹性固定患牙的时间约为

- A. 3~5天
- B. 5~7天
- C. 7~10天
- D. 8~12天
- E. 10~15天 [医学教育网原创]

【正确答案】C

【答案解析】年轻恒牙牙齿全脱位时应该立即进行再植术。再植术的一系列步骤中,固定患牙:急诊可采取缝线固定,以后制作全牙列(牙合)垫固定。全牙列(牙合)垫既可避免咬合创伤,又有一定生理动度,有利于再植牙愈合。弹性固定7~10天为宜。[医学教育网原创]