

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2022年第41期

问题索引:

1. 【问题】预产期的计算方法?
2. 【问题】库欣综合征最常见的原因是?
3. 【问题】室温过高或过低对患者有什么影响?
4. 【问题】判断胃管是否在胃中的方法?
5. 【问题】麻疹疫苗皮肤消毒用什么消毒剂?

具体解答:

1. 【问题】预产期的计算方法?

【解答】预产期的计算方法是:预产期推算 了解末次月经(LMP)的日期以推算预产期(EDC)。[医学/教育网]

计算方法为:末次月经第1天起,月份减3或加9,日期加7。如为阴历,月份仍减3或加9,但日期加15。实际分娩日期与推算的预产期可以相差1~2周。此类题目注意2月份天数。

2. 【问题】库欣综合征最常见的原因是?

【解答】垂体分泌促肾上腺皮质激素过多。

库欣病:垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH)过多,[医学/教育网]导致双侧肾上腺增生,分泌大量的皮质醇,此类型最多见。

3. 【问题】室温过高或过低对患者有什么影响?

【解答】一般病室适宜的温度为18~22℃;婴儿室、手术室、产房等,室温调高至22~24℃为宜。室温过高时,机体散热受到影响,不利于体力的恢复,病人感到烦躁,呼吸、消化功能均受干扰。室温过低时,冷的刺激可使病人肌肉紧张,且易受凉。

4. 【问题】判断胃管是否在胃中的方法?

【解答】胃管插至所标记处,先证实胃管在胃内,方法有三种:

- 1) 将胃管末端接无菌注射器回抽, 可抽出胃液。
- 2) 将导管末端放入盛有水的碗中, 无气泡逸出。如有大量气泡, 证明已误入气管。[医学 教育网]
- 3) 将听诊器放在病人胃部, 用无菌注射器迅速注入 10ml 空气, 听到有气过水声。

5. 【问题】麻疹疫苗皮肤消毒用什么消毒剂?

【解答】麻疹疫苗属于减毒活疫苗, 接种活疫苗、菌苗时, 只用 75%乙醇消毒, 因活疫苗、菌苗易被碘酊杀死, 影响接种效果。

