



医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2022年第42期

问题索引：

1. 固定桥粘固后短时间内出现咬合痛的原因可能是哪些？
2. 哪种检查方法用于确定残髓炎最可靠？
3. 颈总动脉在哪个位置分为颈内动脉和颈外动脉？
4. 如患者拔牙时出现晕厥，应该怎么处理？

具体解答：

1. 固定桥粘固后短时间内出现咬合痛的原因可能是哪些？

固定桥粘固后短时间内出现咬合时疼痛，首先要检查的是

- A. 根尖状况
- B. 咬合状况
- C. 牙龈状况
- D. 牙槽骨状况
- E. 缺牙区牙槽嵴黏膜

【答案】B

【解析】固定桥粘固后短期内出现咬合疼痛，多为早接触点引起的创伤性牙周膜炎，经过调（牙合）处理后，疼痛会很快消失。[医学教育网原创]若未及时调（牙合），有时会因创伤而引起急性牙周膜炎，疼痛加剧，必要时需在局麻下拆除固定桥，待痊愈后重做。所以固定桥粘固后短期疼痛应首先检查的是咬合情况。

2. 哪种检查方法用于确定残髓炎最可靠？

确定残髓炎最可靠的方法是

- A. 温度测验
- B. 电活力测验
- C. 化学测验
- D. 探查根管深部
- E. 叩诊



【答案】D

【解析】残髓炎，[医学教育网原创]有牙髓治疗史，患牙牙冠见有做过牙髓治疗的充填体或暂封材料。患牙治疗后近期或远期又出现慢性牙髓炎的症状。再治疗时探查根管内疼痛感觉即可确诊。故答案为D。

3. 颈总动脉在哪个位置分为颈内动脉和颈外动脉？

颈总动脉分为颈内动脉和颈外动脉的部位是

- A. 平胸锁关节处
- B. 平甲状软骨上缘
- C. 平甲状软骨下缘
- D. 平舌骨大角尖
- E. 平下颌角处

【答案】B

【解析】面颈部的血液供应主要来自颈总动脉和锁骨下动脉。颈总动脉在约平甲状软骨上缘处分为颈内动脉和[医学教育网原创]颈外动脉。

4. 如患者拔牙时出现晕厥，应该怎么处理？

在局麻时患者出现晕厥，首先应做的处理是

- A. 立即停止注射，头低位，平卧，解开衣扣，保持呼吸道通畅
- B. 给氨水嗅闻
- C. 吸氧或静脉输高渗糖
- D. 立即注射肾上腺素
- E. 立即行人工呼吸

【答案】A

【解析】一旦发生晕厥，应立即停止注射，迅速放平座椅，置病员于头低位；松解衣领，[医学教育网原创]保持呼吸通畅。