

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2022年第47期

问题索引:

1. 【问题】电除颤的适应证?
2. 【问题】轻中重度脱水的区别?
3. 【问题】ORS 液的配比是?
4. 【问题】乳腺癌术后病人出院指导中避孕与自我检查的做题技巧?

具体解答:

1. 【问题】电除颤的适应证?

【解答】非同步电复律——适用于室颤、持续性室性心动过速。

同步电复律——适用于有 R 波存在的各种快速异位心律失常,如房颤、室性阵发性心动过速等。[医学教育/网]

2. 【问题】轻中重度脱水的区别?

【解答】轻度指失水占体重 5%以下,即 50ml/kg 以下,中度指失水占体重: 5%~10%,即 50~100ml/kg,重度指失水占体重 10%以上,即 100~120ml/kg。

	轻度	中度	重度
精神	稍差	萎靡、烦躁	表情淡漠、昏睡或昏迷
眼泪	少	明显减少	无
前囟、眼窝	稍凹陷	明显凹陷	深陷
皮肤	干、弹性可	干、弹性差	干、弹性极差
尿量	稍减少	明显减少	极少或无
末梢血循环	正常	四肢稍凉	四肢厥冷
心率	正常	快[医学教育/网]	快、弱
血压	正常	正常或稍低	血压下降
失水占体重的百分比	<5%	5%~10%	>10%


3. 【问题】ORS 液的配比是?

【解答】口服补液盐简称 ORS 液，由氯化钠 2.6g，枸橼酸钠 2.9g，氯化钾 1.5g，葡萄糖 13.5g 加水至 1000ml 配制而成。[医学/教育网]

4. **【问题】**乳腺癌术后病人出院指导中避孕与自我检查的做题技巧？

【解答】术后五年内应避免妊娠，以免促使乳癌复发。定期的乳房自查有助于及早发现乳房的病变。

题目中有“如何及早发现乳癌复发、及早发现”选择自检；“预防复发最重要的”应选五年内避免妊娠。



正保医学教育网

www.med66.com