

初级护师《相关专业知识》模考试卷

一、A1型题

1. 高钾血症是指血钾浓度超过

- A. 3.5mmol/L
- B. 4.5mmol/L
- C. 5mmol/L
- D. 5.5mmol/L
- E. 7mmol/L

2. 网织红细胞的正常值为

- A. 成人 5%~15%
- B. 成人 3%~6%
- C. 成人 0.5%~1.5%
- D. 成人 6%~8%
- E. 成人 3%~4%

3. 成年女性正常的红细胞数参考值为

- A.  $(1.5 \sim 2.5) \times 10^{12}/L$
- B.  $(3.5 \sim 5.0) \times 10^{12}/L$
- C.  $(4.5 \sim 5.5) \times 10^{12}/L$
- D.  $(3.5 \sim 5.0) \times 10^9/L$
- E.  $(4.5 \sim 5.5) \times 10^9/L$

4. 被动体位见于

- A. 哮喘
- B. 瘫痪
- C. 肺气肿
- D. 下肢水肿
- E. 肺淤血

5. 浅昏迷与深昏迷的区别是

- A. 有无自主运动
- B. 有无大、小便失禁
- C. 对声、光的反应
- D. 是否能被唤醒
- E. 角膜反射、瞳孔对光反射及防御反射是否存在

6. 交替脉见于

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 贫血
- C. 甲状腺功能减退
- D. 左心衰竭
- E. 主动脉瓣关闭不全

7. 在剑突下有明显搏动提示

- A. 左室大
- B. 肺气肿伴右室大
- C. 心包积液
- D. 右房大
- E. 左房大

8. 为减轻支气管哮喘带来的痛苦应采取

- A. 被动体位
- B. 自动体位
- C. 强迫坐位
- D. 强迫卧位
- E. 强迫俯卧位



9. 下列疾病中，可致心尖搏动增强的疾病是

- A. 左心室肥大
- B. 心肌炎
- C. 心肌梗死
- D. 左侧大量胸腔积液
- E. 肺气肿

10. 镜下血尿是指离心沉淀后的尿沉渣在每高倍镜视野中见到的红细胞数大于

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个
- E. 5 个

11. 血红蛋白尿见于

- A. 肾盂肾炎
- B. 急性肾炎
- C. 肾结石
- D. 肾结核
- E. 急性溶血

12. 正常人瞳孔直径为

- A. 1~2mm
- B. 3~4mm
- C. 2~5mm
- D. 4~5mm
- E. 5mm 以上

13. 盆腔 CT 扫描前 3 天对饮食的要求是

- A. 高热量、高蛋白饮食
- B. 高热量、低蛋白饮食
- C. 低热量、高蛋白饮食
- D. 少渣、少胀气饮食
- E. 高热量、高纤维素饮食

14. 脑血栓形成的“超早期”治疗时间一般是指发病后的

- A. 1 小时内
- B. 3 小时内
- C. 6 小时内
- D. 12 小时内
- E. 24 小时内

15. 对于吉兰巴雷综合征的患者，临床中多采用的治疗是

- A. 扩血管治疗
- B. 抗感染治疗
- C. 抗凝治疗
- D. 血浆置换疗法
- E. 脱水治疗

16. 对于癫痫持续发作患者，护士首先应做何种准备

- A. 做好约束准备
- B. 准备地西洋静脉注射
- C. 准备 20%甘露醇静脉注射
- D. 准备鼻饲抗癫痫药
- E. 准备 50%葡萄糖液静注

17. 有机磷农药中毒的诊断不包括

- A. 特殊大蒜气味

- B. 典型症状与体征
- C. 胃肠道钡餐检查
- D. 有机磷农药接触史
- E. 全血胆碱酯酶活力测定

18. 有机磷中毒的主要死因是

- A. 呼吸衰竭
- B. 心力衰竭
- C. 肾衰竭
- D. 心律失常
- E. 脑缺氧

19. 对实体肿瘤最有效的治疗方法是

- A. 手术切除
- B. 放射治疗
- C. 化疗
- D. 内分泌治疗
- E. 中医中药治疗

20. 脑瘤确诊后最先采取的治疗措施应是

- A. 立即钻孔探查
- B. 立即静脉输入降颅压药物
- C. 立即行 CT 检查
- D. 立即行 MRI 检查
- E. 立即行脑室穿刺引流脑脊液

21. 治疗患有弥漫性甲状腺肿的青少年给予甲状腺素的剂量是

- A. 10~20mg
- B. 20~40mg

- C. 30~60mg
- D. 40~80mg
- E. 50~100mg

22. 急性乳腺炎的治疗下列哪项不妥

- A. 患者暂停哺乳，严重者应予断乳
- B. 局部热敷或用微波透热
- C. 局部封闭或外敷清热解毒中草药
- D. 为防止组织坏死应尽早切开引流
- E. 全身症状重者应静点大量有效的抗生素

23. 预防乳癌根治术后皮下积液的护理措施下列说法不正确的是

- A. 伤口加压包扎
- B. 及早活动患侧肩部
- C. 局部用沙袋压迫
- D. 保持负压引流通畅
- E. 加强敷料及伤口的观察

24. 张力性气胸行胸腔闭式引流，其穿刺部位是

- A. 腋前线第 8 肋间
- B. 腋中线第 6 肋间
- C. 腋后线第 4 肋间
- D. 肩胛下角线第 3 肋间
- E. 锁骨中线第 2 肋间

25. 早期食管癌病人治疗方法首选

- A. 化学疗法
- B. 放射疗法
- C. 激光疗法

D. 手术疗法

E. 免疫疗法

26. 心导管检查术目的是

A. 发现心内畸形

B. 描记心内心电图

C. 计算心排出量

D. 测量心血管各部位的压力

E. 以上全是

27. 胃肠减压的目的不正确的是

A. 降低胃肠道内的压力

B. 改善胃肠壁血液循环

C. 有利于炎症局限

D. 预防体液丢失

E. 促进胃肠功能恢复

28. 下列哪项不是急性阑尾炎手术治疗的适应证

A. 化脓性或坏疽性阑尾炎

B. 阑尾穿孔并发腹膜炎

C. 小儿急性阑尾炎

D. 慢性阑尾炎急性发作

E. 阑尾周围脓肿

29. 有助于诊断阑尾周围脓肿的检查是

A. 腹部 B 超

B. 腹腔穿刺

C. 直肠指检

D. CT 扫描

E. X 线腹部透视

30. 诊断直肠癌最重要且简便易行的检查方法是

- A. 纤维结肠镜检查
- B. 大便潜血试验
- C. 钡剂灌肠检查
- D. 直肠指诊
- E. CEA 测定

31. 诊断直肠癌最重要且简便易行的方法为

- A. 粪便隐血试验
- B. 直肠指检
- C. 内镜检查
- D. 腔内 B 超检查
- E. 血清癌胚抗原测定

32. 直肠肛管手术后大便失禁主要是由于手术切断了

- A. 肛门内括约肌
- B. 肛门外括约肌
- C. 肛管直肠环
- D. 齿状线
- E. 阴部神经

33. 门静脉高压症并发上消化道大出血，断流手术疗效较好的方式是

- A. 食管下端横断术
- B. 胃底横断术
- C. 食管下端胃底切除
- D. 胃冠状静脉血管结扎
- E. 脾切除加贲门周围血管离断术

34. 门静脉高压患者行分流术后最易导致的并发症是

- A. 肾功能不全
- B. 肝性脑病
- C. 溶血性贫血
- D. 肝原性糖尿病
- E. 结节性动脉周围炎

35. 原发性肝癌最常见的大体病理类型是

- A. 小癌型
- B. 结节型
- C. 溃疡型
- D. 巨块型
- E. 弥漫型

36. 有关 B 超检查胆道疾病的优点的描述不正确的

- A. 确诊率高
- B. 安全，无痛苦
- C. 术前不需禁食、禁水
- D. 无任何禁忌证
- E. 是无损伤检查法

37. 属于临界性骨肿瘤的是

- A. 尤文瘤
- B. 骨肉瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 骨巨细胞瘤
- E. 肺癌骨转移



38. 早期滑膜结核与类风湿性关节炎鉴别的可靠依据是

- A. 累及关节的数目
- B. 血沉是否正常
- C. 关节间隙是否狭窄
- D. 结核菌素试验
- E. 滑膜组织病理学检查

39. 急性血源性骨髓炎可见 X 线片上发现异常的最早时间为病后

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 6 周

40. 对骨折病人不应做的检查是

- A. 肢体测量
- B. 骨擦感或骨擦音
- C. 直接压痛
- D. 间接压痛
- E. X 线拍片

41. 下列关于新生儿颅内出血的辅助检查说法正确的是

- A. 蛋白含量明显增高
- B. 脑脊液糖定量增高
- C. 首选 X 线
- D. 网织红细胞增高
- E. 蛋白含量减低

42. 为判断缺氧缺血脑病患儿预后，应做的检查是

- A. 脑电图
- B. 头颅 B 超
- C. CT 扫描
- D. 磁共振成像
- E. X 线

43. 肥胖症小儿肝超声显示有

- A. 肝硬化
- B. 脂肪肝
- C. 肝脓肿
- D. 肝内胆管结石
- E. 酒精性肝病

44. 给营养不良患儿肌注苯丙酸诺龙的目的是

- A. 增加机体的抵抗力
- B. 促进脂肪合成代谢
- C. 增强机体的糖代谢功能
- D. 促进营养物质消化吸收
- E. 促进体内蛋白质的合成

45. 判断脱水的性质有效的辅助检查是

- A. 肌张力
- B. 尿量
- C. 血钠浓度
- D. 血压
- E. 血钾浓度

46. 脱水患儿累积丢失液量补足的时间应是

- A. 30~60 分钟

- B. 1~3 小时
- C. 4~6 小时
- D. 8~12 小时
- E. 13~16 小时

47. 治疗急性感染性喉炎除控制感染外，还应同时应用下列哪种药物减轻症状

- A. 镇静剂
- B. 止咳剂
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 呋塞米
- E. 甘露醇

48. 急性肾小球肾炎的诊断根据中哪一项是关键

- A. 全身水肿
- B. 高血压
- C. 尿少
- D. 血尿及红细胞管型尿
- E. 蛋白尿及透明管型尿

49. 原发性肾病综合征治疗首选的药物是

- A. 抗生素
- B. 肾上腺糖皮质激素
- C. 免疫抑制剂
- D. 血管紧张素转换酶抑制剂
- E. 呋塞米

50. 泌尿道感染正确的处理是

- A. 严格控制钠、水的入量
- B. 抗感染

- C. 用速效强心剂
- D. 透析
- E. 鼓励多饮水

51. 化脓性脑膜炎脑脊液外观特征是

- A. 清亮透明
- B. 混浊呈脓性
- C. 毛玻璃样
- D. 呈血性
- E. 静置 24 小时有蜘蛛样薄膜形成

52. 化脓性脑膜炎和病毒性脑膜炎的脑脊液检查中根本的不同点在于

- A. 脑脊液压力
- B. 细胞数量
- C. 蛋白含量
- D. 氯化物的数量
- E. 脑脊液外观

53. 婴儿的神经反射，下列哪项不正常

- A. 觅食反射阳性
- B. 拥抱反射阴性
- C. 握持反射阳性
- D. 巴彬斯基征阳性
- E. 腹壁反射阴性

54. 急性感染性多发性神经根炎患者多采用的治疗是

- A. 血浆置换疗法或免疫球蛋白治疗
- B. 扩血管治疗
- C. 抗凝治疗

D. 抗感染治疗

E. 脱水治疗

55. 注意缺陷多动障碍的治疗原则为

A. 自发现本病起用药至青春期

B. 用药量从足量开始逐渐减少至维持量

C. 使用有效的神经抑制剂

D. 睡前顿服

E. 早餐后顿服

56. 1:5000 高锰酸钾坐浴的目的是

A. 清洁皮肤

B. 消除异味

C. 杀菌

D. 止痒

E. 增强免疫力

57. 侵蚀性葡萄胎妇科检查可见

A. 卵巢黄素囊肿

B. 阴道壁囊肿

C. 宫颈菜花样改变

D. 阴道紫蓝色结节

E. 卵巢黄体囊肿

58. 年龄超过 40 岁的葡萄胎患者切除子宫的主要原因是

A. 恶变率高

B. 预防子宫穿孔

C. 预防子宫内膜癌的发生

D. 预防宫颈癌的发生

E. 患者已无生育要求

59. 心跳骤停患儿现场急救首先应采取的措施是

- A. 开放气道
- B. 建立呼吸
- C. 胸外心脏按压
- D. 应用复苏药物
- E. 心电监测

60. 为心跳呼吸骤停的小儿行心肺复苏时首先应

- A. 心脏按压
- B. 心内注射
- C. 心前区叩击
- D. 清理呼吸道
- E. 口对口人工呼吸

61. 下列辅助检查表现符合心跳呼吸骤停的是

- A. 心电图呈一水平直线
- B. 仅有 P 波
- C. 有缓慢而无效的心室波
- D. 心室颤动
- E. 以上均可能出现

62. 肾衰竭少尿期治疗早期给

- A. 糖类
- B. 蛋白质
- C. 脂肪
- D. 维生素
- E. 补钾

63. 急性肾功能衰竭合并严重高钾血症，治疗首选

- A. 血液透析
- B. 腹膜透析
- C. 单纯超滤
- D. 11.2%乳酸钠静脉推注
- E. 降钾树脂

## 二、A2 型题

64. 某慢性肝炎病人近日腹部渐膨大，经检查认为已有腹水，支持该诊断的腹部体征是

- A. 听诊有气过水音
- B. 叩诊有移动性浊音
- C. 触诊有实物感
- D. 视诊腹部膨隆
- E. 听诊肠鸣音消失

65. 患者梁某，因持续性剧烈腹痛伴阵发性加重入院，可疑肠梗阻。为患者直肠指诊的过程中指套染血，提示最可能的肠梗阻类型是

- A. 绞窄性肠梗阻
- B. 血运性肠梗阻
- C. 痉挛性肠梗阻
- D. 麻痹性肠梗阻
- E. 机械性肠梗阻

66. 患者男性，军工厂工人。右腕上 6cm 处被机器绞断 1 小时紧急入院，软组织挫伤严重，神经血管均较骨骼短缩 2cm，该患者最佳的治疗方案是

- A. 清创后，残端缝合
- B. 清创后，残端缝合，断肢保存，待二期再植

- C. 包扎换药
- D. 立即行断肢再植术
- E. 清创后，做前臂分叉成形术

67. 某小儿 2 岁，一周前患有腹泻，体温 38.5℃，因表情淡漠、呕吐、抽搐入院治疗，查体：小儿神志不清。脑脊液检查：压力增高，中性粒细胞显著增高，诊断为病毒性脑膜炎。对于该患儿的护理措施不正确的是

- A. 可抬高小儿上半身，利于降颅压
- B. 每 2 小时翻身一次，减少坠积性肺炎发生
- C. 密切观察瞳孔及呼吸，观察是否发生脑疝
- D. 对昏迷吞咽困难患儿应禁食禁饮
- E. 患儿躁动不安时，遵医嘱使用镇静药

68. 某女的生育史为 2-1-1-3，其意义正确的是

- A. 现存 1 个子女
- B. 曾早产 2 次
- C. 曾流产 3 次
- D. 曾足月产 2 次
- E. 现存 2 个子女

69. 某女士，26 岁，婚后 3 年不孕，月经周期不规则。妇科检查无异常发现，基础体温呈双相型曲线，黄体期短，应考虑为

- A. 无排卵性功血
- B. 黄体功能不足
- C. 黄体萎缩不全
- D. 子宫内膜不规则脱落
- E. 月经不调

70. 女，28岁，14岁月经来潮，周期正常。现停经45天，阴道流血持续20天，时多时少，无腹痛。妇科检查：宫颈光滑，颈管内有透明分泌物，作涂片见羊齿植物叶状结晶，子宫前位正常大小，附件未及。可能的诊断是

- A. 异位妊娠
- B. 流产
- C. 子宫内膜不规则脱落
- D. 无排卵性功血
- E. 黄体功能不足

### 三、B型题

- A. 交替脉
- B. 水冲脉
- C. 脉搏短绌
- D. 奇脉
- E. 重搏脉

71. 脉搏骤起骤落，急促有力

72. 平静吸气时脉搏明显减弱或消失

73. 脉率少于心率

74. 脉搏一强一弱交替出现但节律正常

A. 腹部叩诊移动性浊音

B. 呕吐咖啡色液体

C. 脑膜刺激征

D. 不能唤醒，有浅反射

E. 昏迷病人呼气有烂苹果味

75. 腹部大量腹水时

76. 上消化道大出血时

77. 酮症酸中毒时

78. 浅昏迷时

- A. 尿酮体 (+)
  - B. 尿中白细胞 > 5 个/高倍镜视野
  - C. 柏油样便
  - D. 血红蛋白 < 110g/L
  - E. 大量管型尿
79. 泌尿系感染可发现
80. 上消化道出血可发现
81. 酮症酸中毒可发现
82. 贫血可发现
- A. 小于 5mm
  - B. 5~9mm
  - C. 10~19mm
  - D. 20mm 及以上
  - E. 不足 20mm, 但出现水泡
83. 判断结核菌素试验为阴性, 则皮肤硬结直径为
84. 判断结核菌素试验为弱阳性, 则皮肤硬结直径为
- A.  $\beta_2$  受体激动剂
  - B.  $\beta_2$  受体阻断剂
  - C. 抗胆碱能药
  - D. 糖皮质激素
  - E. 肥大细胞膜稳定剂
85. 沙丁胺醇属于
86. 倍氯米松属于
87. 色甘酸二钠 (色甘酸钠) 属于
88. 异丙托溴铵属于
89. 特布他林属于

- A. 耳鸣、耳聋
  - B. 胃肠道刺激症状
  - C. 黄疸、转氨酶一过性升高
  - D. 周围性神经炎
  - E. 球后视神经炎
90. 链霉素常见副作用为
91. 利福平常见的副作用为
- A. 维生素 D800IU/天，口服
  - B. 维生素 D1 万 IU/天，口服
  - C. 维生素 D 每次 80 万 IU，肌内注射，每周 1 次，共 3 次
  - D. 维生素 D 每次 30 万 IU，肌内注射
  - E. 维生素 D10 万 IU/天，口服
92. 治疗重度维生素 D 缺乏性佝偻病激期时用
93. 早产儿预防维生素 D 缺乏性佝偻病时用
- A. 白细胞总数及中性粒细胞总数增多
  - B. 白细胞总数降低
  - C. 嗜酸性粒细胞增多
  - D. 淋巴细胞减少
  - E. 小细胞增多
94. 提示病毒感染引起小儿腹泻的血常规表现为
95. 提示细菌感染引起小儿腹泻的血常规表现为
96. 过敏性肠炎引起小儿腹泻的血常规表现为
97. 寄生虫性肠炎引起小儿腹泻血常规表现为
- A. 超声心动图示冠状动脉扩张见于
  - B. 毛细血管脆性试验阳性见于

- C. 血象红细胞大小不等见于
- D. X线视关节腔变窄
- E. 血淀粉酶升高见于
- 98. 皮肤黏膜淋巴结综合征
- 99. 过敏性紫癜
- 100. 儿童类风湿

## 2022年初级护师《相关专业知识》考前模考大赛（二）答案部分

### 一、A1型题

1.

【正确答案】D

【答案解析】高钾血症是指血钾浓度超过  $5.5\text{mmol/L}$ 。

2.

【正确答案】C

【答案解析】网织红细胞成年人的正常值为  $0.5\% \sim 1.5\%$ ，绝对值  $(24 \sim 84) \times 10^9/\text{L}$ 。

3.

【正确答案】B

【答案解析】成年女性正常的红细胞数参考值为  $(3.5 \sim 5.0) \times 10^{12}/\text{L}$ ，成年男性正常的红细胞数参考值为  $(4.5 \sim 5.5) \times 10^{12}/\text{L}$ 。

4.

【正确答案】B

【答案解析】不能自己调整或变换肢体位置为被动体位，见于昏迷或瘫痪病人。身体活动自如，不受限制为自动体位。为减轻疾病痛苦而被迫采取的体位为强迫体位，见于哮喘发作病人等。

5.

【正确答案】E

【答案解析】浅昏迷生理反射存在，深昏迷深、浅反射均消失。浅昏迷与深昏迷均无自主运动，不能被唤醒，对周围事物及声、光等刺激全无反应，都可有大、小便潴留或失禁。

6.

【正确答案】D

【答案解析】交替脉：脉搏一强一弱交替出现但节律正常。交替脉是左心衰竭的重要体征。

7.

【正确答案】B

【答案解析】剑突下搏动为心前区异常搏动，该搏动可能是右心室收缩期搏动，也可由腹主动脉搏动产生。前者可见于肺气肿患者或右心室肥大者，后者常由腹主动脉瘤引起。

8.

【正确答案】C

【答案解析】强迫坐位为病人坐位，双手置于膝盖上或床边，上身稍前倾。此体位既有利于膈肌下移，增加肺换气量，又可减少下肢回心血量，减轻心脏负担。见于心、肺功能不全者。

9.

【正确答案】A

【答案解析】左心室肥大时，触诊手指会被强有力的心尖搏动抬起，称为抬举性搏动。

10.

【正确答案】C

【答案解析】离心沉淀后，镜检时每高倍镜视野红细胞平均大于3个称为镜下血尿。

11.

【正确答案】E

【答案解析】血红蛋白尿呈酱油色，见于阵发性睡眠性血红蛋白尿、血型不合的输血反应等溶血性疾病。

12.

【正确答案】B

【答案解析】内科护理学中正常人两侧瞳孔对称、等大、正圆，直径约3~4mm。

13.

【正确答案】D

【答案解析】CT扫描：一般不需特殊准备。有时为了增强被检查部位的检查效果，常需配合使用造影剂，故检查前应按照造影检查的要求进行准备。胸腹部扫描前禁食6~8小时；盆腔扫描前3天进食少渣、少胀气饮食。

14.

【正确答案】C

【答案解析】脑血栓发病6小时内可做溶栓治疗，尽快恢复缺血区的血液供应。应用溶栓药物前首先需经CT证实无出血灶，并应监测出凝血时间、凝血酶原时间等。

15.

【正确答案】D

【答案解析】血浆置换治疗：是一种较新的治疗措施，通过血浆置换可清除血中有害的抗体、免疫复合物、炎性物质，以及某些不利的补体。

16.

【正确答案】B

【答案解析】对于癫痫持续状态的患者，在给氧、防护等的同时，必须在短时间内终止发作，地西洋为首选药。

17.

【正确答案】C

【答案解析】有机磷农药接触史，典型症状和体征，特殊大蒜气味及全血胆碱酯酶活力测定均为诊断重要依据。

18.

【正确答案】A

【答案解析】有机磷中毒的死因主要为呼吸衰竭，其原因是肺水肿、呼吸肌瘫痪或呼吸中枢抑制所致，故维持正常呼吸功能极其重要。

19.

【正确答案】A

【答案解析】实体肿瘤最有效的治疗方法是手术切除。良性肿瘤手术完整切除可治愈，恶性肿瘤早中期均以手术为主，辅以化疗、放疗、内分泌治疗和中医中药治疗等综合措施。

20.

【正确答案】B

【答案解析】对于脑疝患者的处理，应立即静脉输给降颅压药物以缓解病情，同时积极明确病因，做好术前准备。

21.

【正确答案】C

【答案解析】对20岁以下的青少年患有弥漫性甲状腺肿，一般不宜手术治疗，多在青春期后自行缩小，可给予小量甲状腺素，常用剂量是30~60mg，每日2次，3~6个月为1个疗程。

22.

【正确答案】D

【答案解析】急性乳腺炎在脓肿形成前可患乳暂停哺乳，局部热敷或理疗利于早期炎症的消散，同时应用抗菌药物控制感染，在脓肿形成后应及时切开引流。故D选项是错误的，只有在形成脓肿后方可切开引流。

23.

【正确答案】B

【答案解析】乳癌根治术后近期避免用患侧上肢搬动、提取重物。

24.

【正确答案】E

【答案解析】在危急状况下可用一粗针头在伤侧第2肋间锁骨中点连线处刺入，以降低胸膜腔内压力。

25.

【正确答案】D

【答案解析】食管癌以手术治疗为主，辅以放射、化学药物等综合治疗。手术治疗适用于全身情况和心肺功能良好、无明显远处转移征象的病人。

26.

【正确答案】E

【答案解析】心导管检查术目的：①发现心内畸形；②测量心血管各部位的压力；③在各部位采血标本测量氧饱和度，以明确异常分流；④其他：可做心血管造影、描记心内心电图、计算心排出量等。

27.

【正确答案】D

【答案解析】胃肠道穿孔病人必须禁食，并留置胃管持续胃肠减压。胃肠减压可抽出胃肠道内容物和气体，减少胃肠道内容物继续流入腹腔，减轻胃肠内积气，改善胃壁血运，有利于炎症的局限和吸收，促进胃肠道恢复蠕动。但是胃肠减压会抽出胃肠道内的液体，不能预防体液丢失。

28.

【正确答案】E

【答案解析】急性阑尾炎形成堪为周围脓肿后，应当暂不手术，通过输液、抗炎治疗3个月后，待肿块消失再行阑尾切除术。

29.

【正确答案】D

【答案解析】B超检查有时可发现肿大的阑尾或阑尾周围脓肿。CT扫描有助于阑尾周围脓肿的诊断。

30.

【正确答案】D

【答案解析】直肠指检是诊断直肠癌最重要且简便易行的方法。

31.

【正确答案】B

【答案解析】直肠指检是诊断直肠癌最重要且简便易行的方法。

32.

【正确答案】C

【答案解析】由肛管内括约肌、直肠纵肌的下部、肛管外括约肌的深部和部分肛提肌共同组成肛管直肠环，具有括约肛管的功能，若手术切断后，可引起肛门失禁。

33.

【正确答案】E

【答案解析】门静脉高压症并发上消化道大出血，断流手术疗效较好的方式是脾切除加贲门周围血管离断术。

34.

【正确答案】B

【答案解析】分流术会使门静脉向肝的灌注量减少而加重肝功损害；部分或全部肝门静脉血未经肝处理而直接进入体循环，易致肝性脑病。

35.

【正确答案】B

【答案解析】原发性肝癌大体病理形态可分为结节型、巨块型和弥漫型三类。以结节型多见，常为单个或多个大小不等结节散布于肝内，多伴有肝硬化。

36.

【正确答案】C

【答案解析】由于受肠道内积气的影响，在B超检查前应禁食12小时、禁饮4小时，以保证胆囊、胆管内充盈胆汁，并减少胃肠的内容物和气体的干扰。

37.

【正确答案】D

【答案解析】骨巨细胞瘤源于骨髓结缔组织间充质细胞，以间质细胞和多核巨细胞构成，是介于良性和恶性之间的临界瘤。

38.

【正确答案】E

【答案解析】早期滑膜结核与类风湿性关节炎都可以有大关节受累，症状也类似，可以引起关节畸形，和血沉增高，故病理活检是金标准。

39.

【正确答案】B

【答案解析】急性血源性骨髓炎早期 X 线检查无改变，最少 2 周后才有所表现。

40.

【正确答案】B

【答案解析】在对病人进行检查时，不可为了测试骨擦感或骨擦音而故意搬动伤处，以免加重局部损伤，造成病人的痛苦。

41.

【正确答案】A

【答案解析】新生儿颅内出血辅助检查：1. 脑脊液检查急性期为均匀血性和皱缩红细胞，蛋白含量明显增高，严重者出生 24 小时内脑脊液糖定量降低。2. CT 和 B 超可提供出血部位和范围。

42.

【正确答案】C

【答案解析】CT 扫描有助于了解水肿范围、颅内出血类型，对预后的判断有一定的参考价值，最适合的检查时间为生后 4~7 日。

43.

【正确答案】B

【答案解析】肥胖症小儿肝超声显示有脂肪肝。

44.

【正确答案】E

【答案解析】苯丙酸诺龙为蛋白同化类固醇制剂，肌注后有促进机体对蛋白质的合成和增进食欲的作用。

45.

【正确答案】C

【答案解析】钠是构成细胞外液渗透压的主要成分，一般以血清钠的浓度将脱水分为等渗性、低渗性和高渗性脱水。

46.

【正确答案】D

【答案解析】累积损失量是指自发病到补液时所损失的水和电解质的量。累积损失量应在8~12小时内补足。

47.

【正确答案】C

【答案解析】考察急性感染性喉炎治疗原则。肾上腺皮质激素有抗炎和抑制变态反应等作用，能及时减轻喉头水肿，缓解喉梗阻。

48.

【正确答案】D

【答案解析】急性肾小球肾炎起病时几乎都有血尿，尿常规检查：镜检除大量红细胞外，尚可见尿蛋白+~+++，可见透明、颗粒和红细胞管型。

49.

【正确答案】B

【答案解析】肾上腺糖皮质激素为治疗肾病的首选药物。

50.

【正确答案】E

【答案解析】泌尿道感染时鼓励多饮水，可以通过增加尿量起到冲洗尿路的作用，减少细菌在尿路的停留时间，促进细菌和毒素的排除。

51.

【正确答案】B

【答案解析】化脓性脑膜炎脑脊液特点：（1）压力升高，外观混浊或呈脓性，白细胞数明显增多达  $1000 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞为主；蛋白升高，糖和氯化物下降。（2）涂片革兰染色找菌（阳性率 70%~90%）。

52.

【正确答案】D

【答案解析】化脓性脑膜炎脑脊液检查糖和氯化物下降，病毒性脑膜炎脑脊液检查糖和氯化物一般正常。

53.

【正确答案】B

【答案解析】小儿拥抱反射应该为阳性。

54.

【正确答案】A

【答案解析】急性感染性多发性神经根炎治疗原则：生命支持、对症处理、呼吸肌麻痹抢救。药物治疗、血浆置换和静脉滴注大剂量免疫球蛋白能明显地缩短病程，改善预后。

55.

【正确答案】E

【答案解析】注意缺陷多动障碍治疗原则：除心理治疗和教育外，有效的药物为神经兴奋剂，如哌甲酯（利他林）、苯丙胺、匹莫林。用药从小剂量开始，白天早餐后顿服，节假日停药，6岁以下及青春期以后原则上不用药。

56.

【正确答案】C

【答案解析】高锰酸钾为强氧化剂，遇有机物即放出新生态氧，杀菌力强，临床上常用高锰酸钾水溶液冲洗或坐浴治疗肛门、会阴等部位的炎症。

57.

【正确答案】D

【答案解析】侵蚀性葡萄胎易血行播散，常见部位有肺、阴道转移，转移至阴道可形成阴道紫蓝色结节。

58.

【正确答案】A

【答案解析】子宫切除术：年龄超过40岁的病人，葡萄胎恶变率较年轻妇女高4~6倍，处理时可直接切除子宫、保留附件。

59.

【正确答案】C

【答案解析】小儿心脏骤停抢救措施可归结为C、A、B、D、E、F六点，C（circulation）胸外心脏按压；A（airway）呼吸道通畅；B（breathing）建立呼吸；D（drugs）应用复苏药物；E（ECG）心电监护；F（defibrillation）消除心室颤动。抢救过后还需进行脑复苏，并对原发病及并发症进行救治，防治多器官衰竭。

60.

【正确答案】A

【答案解析】抢救的措施可归结为C、A、B、D、E、F六点，C（circulation）胸外心脏按压；A（airway）呼吸道通畅；B（breathing）建立呼吸；D（drugs）应用复苏药物；E（ECG）心电监护；F（defibrillation）消除心室颤动。抢救过后还需进行脑复苏，并对原发病及并发症进行救治，防治多器官衰竭。

61.

【正确答案】E

【答案解析】心跳呼吸骤停辅助检查心电图显示：①心脏完全停跳，呈一水平直线或仅有P波；②缓慢而无效的心室波；③心室颤动。

62.

【正确答案】A

【答案解析】急性肾衰竭少尿期治疗：①严格控制水和钠的入量；②调整热量的供给，早期只给糖类，可减少机体自身蛋白分解和酮体产生；③纠正酸中毒及电解质紊乱，及时处理高钾血症；④并发症的治疗，如高血压、心力衰竭等的治疗。

63.

【正确答案】A

【答案解析】透析治疗：早期透析可降低死亡率，可酌情选用血液透析或腹膜透析。

## 二、A2型题

64.

【正确答案】B

【答案解析】腹部大量腹水时视诊腹部膨隆，触诊腹壁紧张度增加，当腹水量>1000ml时，可叩出移动性浊音。但腹部膨隆、腹壁紧张度增加还可由其他原因造成，如气腹，而如果叩出移动性浊音则可以肯定该病人存在大量腹水。

65.

【正确答案】A

【答案解析】直肠指诊时若指套染血，提示有绞窄性肠梗阻发生。

66.

【正确答案】D

【答案解析】神经血管均较骨骼短缩2cm，这句话是延续软组织挫伤严重而来的，说明患者损伤严重，神经血管被牵拉损伤严重，使得它们比骨骼短而且患者伤处在右腕上6cm，也就是在前臂的位置，此处神经血管丰富，离断平面高，因此考虑立即再植。

67.

【正确答案】D

【答案解析】对昏迷吞咽困难患儿应尽早给予鼻饲，而不是禁食禁饮。所以选择D。

68.

【正确答案】D

【答案解析】婚育史可采用“足一早一流一存”的记录方式，因此此患者2-1-1-3，代表2次足月产、1次早产、1次流产、现存3个子女。故选D。

69.

【正确答案】B

【答案解析】根据提供的资料，病人属于有排卵性功血，其黄体期短的特点提示黄体功能不足。

70.

【正确答案】D

【答案解析】该女士短时间停经后，阴道流血持续 20 天，时多时少，是功能失调性子宫出血的病人。根据妇科检查，颈管内有透明分泌物，作涂片见羊齿植物叶状结晶的结果是雌激素作用的特点，提示病人属于无排卵性功血。

### 三、B 型题

71.

【正确答案】B

【答案解析】主动脉瓣关闭不全时可致脉压增大，脉搏骤起骤落、急促而有力，即水冲脉。

72.

【正确答案】D

【答案解析】病人吸气时脉搏显著减弱或消失的现象称为奇脉，见于心包积液和缩窄性心包炎的患者。

73.

【正确答案】C

【答案解析】心房颤动时可出现脉率少于心率的现象，即脉搏短绌。

74.

【正确答案】A

【答案解析】交替脉为节律规则而强弱交替出现的脉搏，由左心室收缩强弱不等所致，是心肌受损的表现，见于高血压性心脏病、急性心肌梗死等。

75.

【正确答案】A

【答案解析】当腹部腹水量超过 1000ml 时，腹部可叩及移动性浊音。

76.

【正确答案】B

【答案解析】上消化道大出血时多有呕血，呕血多棕褐色，呈咖啡渣样，这是血液经胃酸作用形成正铁血红素所致。

77.

【正确答案】E

【答案解析】健康人口中无特殊气味，糖尿病酮症酸中毒者有烂苹果味。

78.

【正确答案】D

【答案解析】浅昏迷患者对声、光等刺激全无反应，但对强刺激可出现痛苦表情、呻吟和下肢的防御性躲避动作。生理反射存在，生命体征一般无明显变化。大、小便可有潴留或失禁。

79.

【正确答案】B

【答案解析】一般在尿沉渣检查时，白细胞 $>5$ 个/高倍镜视野为异常，在各种泌尿系统器官炎症时均可出现。

80.

【正确答案】C

【答案解析】成形的黑色便称黑便，稀薄、黏稠、漆黑、发亮的粪便，形似柏油样，称柏油样便。见于上消化道出血等。

81.

【正确答案】A

【答案解析】糖尿病代谢紊乱加重时，脂肪动员和分解加速，形成大量酮体，超过肝外组织的氧化能力时，血酮体升高称为酮血症，尿酮体排出增多称为酮尿，临床上统称为酮症。

82.

【正确答案】D

【答案解析】单位容积循环血液中红细胞数、血红蛋白量及血细胞比容低于参考值低限，通常称为贫血。以血红蛋白为标准，成年男性血红蛋白 $<120\text{g/L}$ ，成年女性 $110\text{g/L}$ ，即可认为有贫血。

83.

【正确答案】A

【答案解析】该题考查结核菌素试验结果的判断，皮肤硬结直径小于 $5\text{mm}$ 为阴性， $5\sim 9\text{mm}$ 为弱阳性， $10\sim 19\text{mm}$ 为阳性， $20\text{mm}$ 及以上或不足 $20\text{mm}$ 但出现水泡、坏死为强阳性。

84.

【正确答案】B

【答案解析】该题考查结核菌素试验结果的判断，皮肤硬结直径小于 $5\text{mm}$ 为阴性， $5\sim 9\text{mm}$ 为弱阳性， $10\sim 19\text{mm}$ 为阳性， $20\text{mm}$ 及以上或不足 $20\text{mm}$ 但出现水泡、坏死为强阳性。

85.

【正确答案】A

【答案解析】沙丁胺醇属于 $\beta_2$ 受体激动剂。

86.

【正确答案】D

【答案解析】倍氯米松属于糖皮质激素。

87.

【正确答案】E

【答案解析】色甘酸二钠（色甘酸钠）属于肥大细胞膜稳定剂。

88.

【正确答案】C

【答案解析】异丙托溴铵属于抗胆碱能药。

89.

【正确答案】A

【答案解析】特布他林属于 $\beta_2$ 受体激动剂。

90.

【正确答案】A

【答案解析】此题考查抗结核药的副作用。链霉素主要不良反应是损害听神经，病人出现眩晕、耳鸣、耳聋和共济失调，严重者应及时停药，肾功能严重损害者不宜使用。

91.

【正确答案】C

【答案解析】此题考查抗结核药的副作用。利福平不良反应除消化道不适、流感综合征外，有肝功能损害及过敏反应。

92.

【正确答案】D

【答案解析】注射法：用于重症和合并肺炎、腹泻、急性传染病以及无法口服者，一次肌内注射维生素 $D_3$ 15万~30万IU，3个月后口服预防量。

93.

【正确答案】A

【答案解析】早产儿、双胎儿生后1月即应补充VitD800~1000IU/d，3个月后改为400~800IU/d。

94.

【正确答案】B

【答案解析】白细胞总数降低提示病毒感染。

95.

【正确答案】A

【答案解析】白细胞总数及中性粒细胞总数增多提示细菌感染。

96.

【正确答案】C

【答案解析】过敏性肠炎会引起嗜酸性粒细胞增多。

97.

【正确答案】C

【答案解析】寄生虫引起的肠炎嗜酸性粒细胞增多。

98.

【正确答案】A

【答案解析】皮肤黏膜淋巴结综合征辅助检查：有心脏受损者可见心电图和超声心动图改变。心电图主要为ST段和T波改变、P-R间期和Q-T间期延长、低电压、心律失常等。二维超声心动图是诊断及随访冠状动脉病变的最佳方法，安全、可靠、方便、重复性好。冠状动脉扩张，冠状动脉瘤样改变，于病程的第2~3周检出率最高，多在病程1~2年恢复。

99.

【正确答案】B

【答案解析】过敏性紫癜辅助检查：约半数患儿的毛细血管脆性试验阳性。外周血白细胞数正常或轻度增高，可伴嗜酸性粒细胞增高。血小板计数、出血和凝血时间、血块退缩试验和骨髓检查均正常。尿液检查与肾小球肾炎相类似，可有血尿、蛋白尿、管型。粪便隐血试验可呈阳性反应。血清IgA浓度往往增高，IgG、IgM水平升高或正常。

100.

【正确答案】D

【答案解析】幼年特发性关节炎（JIA）是儿童时期常见的风湿性疾病，X线检查，早期可见关节附近软组织肿胀；晚期可见骨质疏松和破坏，关节腔变窄，关节面融合，骨膜反应和关节半脱位。