

初级护师《专业知识》模考试卷

一、A1 型题

1. 颈静脉怒张见于

- A. 肝硬化
- B. 右心衰竭
- C. 左心衰竭
- D. 肺结核
- E. 心律失常

2. 下列哪项不是右心衰竭的体征

- A. 肝大
- B. 胸水
- C. 腹水
- D. 颈静脉怒张
- E. 肝颈静脉回流征阳性

3. 应用洋地黄类药物时应避免联合应用

- A. 氢氯噻嗪
- B. 硝酸甘油
- C. 螺内酯
- D. 哌唑嗪
- E. 维拉帕米

4. 大便次数每日超过几次为腹泻

- A. 3 次
- B. 4 次
- C. 5 次
- D. 6 次
- E. 7 次

5. 肝性脑病昏迷前期最突出的表现是
- A. 意识丧失
 - B. 轻度性格改变
 - C. 表情欣快、喜怒无常
 - D. 昏睡、精神错乱
 - E. 意识错乱、睡眠障碍
6. 肝性脑病患者昏迷期的饮食最适宜
- A. 高热量、高维生素、高碳水化合物、低蛋白质
 - B. 高热量、高糖、低盐、低脂、低蛋白质
 - C. 高热量、高糖、高维生素、无蛋白质流质饮食
 - D. 高热量、高糖、高蛋白质、少纤维饮食
 - E. 高热量、高糖、高维生素、低脂、少量蛋白质
7. 水肿型胰腺炎与出血坏死型胰腺炎的主要鉴别点是
- A. 发热
 - B. 休克
 - C. 剧烈腹痛、腹部体征
 - D. 恶心呕吐
 - E. 电解质紊乱
8. 急性胰腺炎的主要表现和首发症状是
- A. 发热
 - B. 恶心、呕吐及腹胀
 - C. 腹痛
 - D. 水、电解质及酸碱平衡紊乱
 - E. 低血压

9. 原发性肝癌患者突然出现腹部剧痛、腹膜刺激征，应考虑

- A. 肝癌腹膜移位
- B. 肝癌结节破裂
- C. 急性胃穿孔
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性胰腺

10. 严重呕血病人饮食护理正确的是

- A. 暂禁食
- B. 温热的流食
- C. 温凉的流食
- D. 软食
- E. 普食

11. 肝硬化门静脉高压最突出的临床表现为

- A. 厌油腻
- B. 消瘦乏力
- C. 齿龈出血
- D. 腹水
- E. 黄疸

12. 肝硬化患者内分泌功能异常主要是

- A. 雄激素增多
- B. 雌激素增多
- C. 肾上腺皮质激素增多
- D. 雌激素减少
- E. 甲状腺激素减少

13. 肝硬化最常见的并发症是

- A. 感染
- B. 肝性脑病
- C. 原发性肝癌
- D. 肝肾综合征
- E. 上消化道出血

14. 消化性溃疡大出血病人护理措施不包括

- A. 迅速建立静脉通路
- B. 冰盐水洗胃
- C. 应用三腔两囊管
- D. 暂禁食
- E. 观察粪便颜色及量

15. 某消化性溃疡病人，原有疼痛节律消失，变为持续上腹痛，伴频繁呕吐，呕吐物含发酵性宿食。最可能的并发症是

- A. 幽门梗阻
- B. 急性胰腺炎
- C. 穿孔
- D. 胃癌
- E. 上消化道出血

16. 消化性溃疡最常见的并发症是

- A. 出血
- B. 穿孔
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 电解质紊乱

17. 消化性溃疡的主要症状是

- A. 上腹痛
- B. 恶心、呕吐
- C. 营养不良
- D. 贫血
- E. 便血

18. 慢性肾衰竭后期病人，一旦出现下列哪种情况提示病情严重

- A. 少尿、高血钾
- B. 中度贫血
- C. 乏力、食欲减退
- D. 水肿、低钠血症
- E. 呼气有尿臭味

19. 下列哪项不是慢性肾衰竭终末期患者发生高血钾的原因

- A. 进食水果多
- B. 进食肉类多
- C. 限制含磷丰富的食物
- D. 尿少
- E. 使用保钾利尿药

20. 诊断蛋白尿的标准是

- A. 尿蛋白 1g/d
- B. 尿蛋白量持续超过 150mg/d
- C. 尿中透明管型
- D. 尿蛋白 > 3.5g/d
- E. 尿蛋白 (++++)

21. 静脉输液补钾的先决条件是

- A. 尿量在 40ml/h 以上

- B. 浓度在 0.3%以下
- C. 速度在 1.5g/h 以下
- D. 总量在 4~5g/d 以下
- E. 最多不要超过 3~6g/d

22. 有关钾代谢，下列说法错误的是

- A. 钾摄入多则排出多，摄入少则排出少
- B. 维持细胞内渗透压
- C. 血清钾值为 3.5~5.5mmol/L
- D. 大部分经肾排出
- E. 对心肌有抑制作用

23. 低磷血症时，实验室检查血清无机磷低于

- A. 0.75mmol/L
- B. 0.85mmol/L
- C. 0.92mmol/L
- D. 0.96mmol/L
- E. 0.98mmol/L

24. 肾性水肿首先出现的部位是

- A. 上肢
- B. 下肢
- C. 腹腔
- D. 眼睑
- E. 下垂部位

25. 等渗性脱水病人输入大量等渗盐水时，可出现

- A. 血钠过高
- B. 水中毒

- C. 氯化钠过剩
- D. 高氯性酸中毒
- E. 低氯性酸中毒

26. 全胃肠外营养（TPN）支持病人可能发生的最严重的代谢并发症是

- A. 钾血症
- B. 低钾血症
- C. 肝功能异常
- D. 高血糖高渗性非酮性昏迷
- E. 高氨血症

27. 关于肠内营养（EN），下列哪项措施是不恰当的

- A. EN 符合生理、并发症少
- B. 只要肠道有功能，尽量采取 EN 支持
- C. 昏迷病人不能用 EN
- D. 营养液输入初始应缓慢、低浓度
- E. 营养液的温度应接近体温

28. 不符合休克早期临床症状的是

- A. 面色苍白
- B. 四肢湿冷
- C. 尿量减少
- D. 血压不降低，脉压增大
- E. 收缩压稍升高

29. 抗休克最基本的措施是

- A. 吸氧
- B. 应用血管活性药物
- C. 纠正代谢性酸中毒

D. 补充血容量

E. 消除致病因素

30. 少尿是指 24 小时尿量少于

A. 50ml

B. 100ml

C. 200ml

D. 300ml

E. 400ml

31. 有关急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的临床表现说法不正确的是

A. 初期病人出现呼吸窘迫感

B. 初期可呈呼吸性酸中毒

C. 进展期可呈代谢性酸中毒

D. 末期病人出现深度昏迷

E. 进展期 X 线可见网状阴影

32. 防止局部麻醉出现不良反应须做到

A. 宁多勿少

B. 最小剂量、最低浓度

C. 用药最大剂量

D. 局部药物注入血管内

E. 麻药中勿加肾上腺素

33. 预防蛛网膜下腔麻醉后头痛的主要措施为

A. 术前做好心理准备

B. 术中注意头部保暖

C. 术后服用止痛药

D. 术后保持环境安静

E. 术后去枕平卧 6~8 小时

34. 麻醉前禁食禁水的主要目的是

- A. 预防术中呕吐物误吸
- B. 防止术中排便
- C. 防止术后腹胀
- D. 利于术后胃肠功能恢复
- E. 防止术后尿潴留

35. 病人全麻拔管后自主呼吸时出现“三凹征”常见于

- A. 急性支气管痉挛
- B. 呼吸暂停
- C. 肺不张
- D. 上呼吸道梗阻
- E. 误吸

36. 关于急性蜂窝织炎的描述正确的是

- A. 致病菌主要是溶血性链球菌
- B. 病变区与正常皮肤有明显界线
- C. 局部明显红肿但不痛
- D. 病程较长
- E. 不会出现全身症状

37. 破伤风的潜伏期一般为

- A. 2~3 天
- B. 4~5 天
- C. 7~8 天
- D. 13~15 天
- E. 6~20 天

38. 新生儿破伤风最早出现的临床表现是

- A. 发热
- B. 惊厥
- C. 牙关紧闭、张口困难
- D. 肌肉强直、角弓反张
- E. 苦笑面容

39. 关于急性蜂窝织炎的描述不正确的是

- A. 致病菌主要是化脓性链球菌
- B. 病变区与正常皮肤无明显界限
- C. 局部明显红肿剧痛
- D. 可由软组织损伤后感染引起
- E. 多伴有寒战、高热等全身症状

40. 下列关于全身感染的护理措施正确的是

- A. 严格执行无菌技术
- B. 严密观察病人的生命体征
- C. 监测体温变化
- D. 保证用药及时
- E. 以上说法均正确

41. 脊柱骨折病人在搬运过程中，最正确的体位是

- A. 侧卧位
- B. 俯卧位
- C. 仰卧屈曲位
- D. 仰卧过伸位
- E. 半坐卧位

42. 化脓性关节炎病人进行局部灌洗治疗的护理措施中正确的是

- A. 引流瓶低于床面 20cm
- B. 术后 12~24 小时内应慢速滴入
- C. 冲洗液为含抗生素的生理盐水
- D. 引流管的滴入管应高于床面 1m
- E. 引流液细菌培养阴性即可立即拔除引流管

43. 颈椎手术病人术前护理中不正确的是

- A. 劝病人戒烟
- B. 挑选合适围领
- C. 准备接受前路手术者需剃头
- D. 接受前路手术者练习推移气管
- E. 接受后路手术者练习术中的俯卧位

44. 腰椎间盘突出症患者术后护理正确的是

- A. 术后应用 3 人搬运法将患者移至病床
- B. 术后平卧 6 小时，不能翻身
- C. 术后清醒应进行腰肌等长收缩锻炼
- D. 引流管一般于术后 12 小时内拔除
- E. 持续卧床 3 天

45. 下列颈椎病类型中不可采用牵引方法的是

- A. 神经根型颈椎病
- B. 脊髓型颈椎病
- C. 椎动脉型颈椎病
- D. 交感神经型颈椎病
- E. 以上说法均正确

46. 中度脱水失水量为体重的

- A. 2%
- B. 3%~4%
- C. 5%~10%
- D. 10%~15%
- E. 15%~20%

47. 区别轻、重型患儿腹泻的主要指标是

- A. 病程长短
- B. 热度高低
- C. 呕吐次数
- D. 大便次数
- E. 有无水、电解质紊乱

48. 鹅口疮患儿清洗口腔时一般使用的溶液为

- A. 2%碳酸氢钠
- B. 0.1%依沙吡啶
- C. 3%过氧化氢
- D. 2%~3%硼酸溶液
- E. 0.1%醋酸溶液

49. 口服补液的禁忌证不包括

- A. 休克
- B. 轻度脱水，无呕吐者
- C. 眼睑水肿患儿
- D. 心功能不全
- E. 明显腹胀

50. 婴儿急性上呼吸道感染时，症状较突出的是

- A. 流涕

B. 咳嗽

C. 头痛、烦躁不安

D. 咽部不适

E. 咽痛

51. 重症肺炎患儿，突然口吐粉红色泡沫痰。下列处理正确的是

A. 大量间歇氧气吸入

B. 小量间歇氧气吸入

C. 吸入 20%~30%乙醇湿化的氧气

D. 持续高流量氧气吸入

E. 持续低流量氧气吸入

52. 下列关于小儿肺炎护理措施说法错误的是

A. 少量多餐，避免过饱影响呼吸

B. 防止坠积性肺炎的方法：由下向上，由内向外轻拍背部

C. 根据病变部位进行体位引流

D. 帮助患儿取合适的体位并经常更换

E. 重症不能进食者，给予静脉输液，严格控制液体入量

53. 急性支气管炎的主要症状为

A. 发热

B. 咳嗽

C. 腹泻

D. 发绀

E. 气促

54. 肺炎时易并发脓胸、脓气胸的常见病原体是

A. 铜绿假单胞菌

B. 溶血性链球菌

- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 肺炎球菌
- E. 白色念珠菌

55. 心脏病并发肺部感染，伴有咳嗽的患儿应

- A. 减少室外活动
- B. 增加体育锻炼
- C. 可在床上适当活动
- D. 绝对卧床休息
- E. 以上说法均不正确

56. 不属于风湿热诊断标准中主要表现的是

- A. 关节痛
- B. 心脏炎
- C. 舞蹈病
- D. 环形红斑
- E. 皮下结节

57. 风湿热最严重的临床表现是

- A. 心脏炎
- B. 关节炎
- C. 舞蹈病
- D. 皮下结节
- E. 环形红斑

58. 风湿热最常见的皮肤改变是

- A. 环形红斑
- B. 结节性红斑
- C. 多形性红斑

- D. 紫癜
- E. 蝶形红斑

59. 流行性腮腺炎应隔离至

- A. 体温恢复正常
- B. 腮肿完全消退后 3 日为止
- C. 腮肿完全消退，再观察 7 天
- D. 腮肿完全消退，再观察 10 天
- E. 发病后 21 天

60. 腮腺炎的常见临床表现

- A. 卵巢炎
- B. 胰腺炎
- C. 睾丸炎
- D. 脑膜脑炎
- E. 肾小球肾炎

61. 麻疹患儿最主要的死亡原因是

- A. 支气管肺炎
- B. 喉炎
- C. 心肌炎
- D. 脑炎
- E. 结核病恶化

62. 最易并发维生素 A 缺乏症的疾病是

- A. 麻疹
- B. 川崎病
- C. 咽结合膜热
- D. 风疹

E. 幼儿急诊

63. 中毒性细菌性痢疾患儿应隔离至

- A. 休克纠正后 1 天
- B. 发热减退后 3 天
- C. 临床症状消失后 7 天
- D. 腹泻减轻后 3 天
- E. 临床症状消失后 5 天

64. 中毒型菌痢的临床特点不包括下列哪项

- A. 起病急骤，高热甚至超高热
- B. 2~7 岁儿童多见
- C. 反复惊厥
- D. 患儿肠道症状严重
- E. 迅速出现呼吸和循环衰竭

65. 易感儿接触麻疹后进行被动免疫应在

- A. 接触后 5 天内
- B. 接触后 10 天内
- C. 接触后 2 周内
- D. 接触后 3 周内
- E. 接触后 1 个月内

66. 早产后如再孕应间隔

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 1 年
- D. 9 个月
- E. 2 年

67. 关于难免流产，描述正确的是

- A. 阴道流血量较多，伴阵发性腹痛
- B. 由先兆流产发展而来，经休息和治疗后流产可以避免
- C. 宫颈口关闭
- D. 子宫比正常大
- E. 不需特殊处理

68. 测孕妇血压时，提示异常的血压数值是

- A. 较基础血压高 2.9/2.0kPa (22/14mmHg)
- B. 较基础血压高 3.3/1.3kPa (25/10mmHg)
- C. 与基础血压一样
- D. 18.7/12.0kPa (140/90mmHg)
- E. 12.0/8.0kPa (90/60mmHg)

69. 下列选项中，对妊高征产妇的护理措施正确的是

- A. 孕妇应采取右侧卧位休息
- B. 监测血压变化，每 2 小时测一次
- C. 硫酸镁注射应使用长针头、深部肌内注射
- D. 硫酸镁的滴注速度以 2.5g/h 为宜
- E. 硫酸镁中毒现象首先表现呼吸抑制

70. 子痫患者使用硫酸镁解痉，用药前及持续滴注期间检测不包括

- A. 膝反射
- B. 呼吸
- C. 体温
- D. 尿量
- E. 血镁浓度

71. 为了改善子宫胎盘血循环，孕妇卧床休息时一般采取的卧位为

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 左侧卧位
- D. 俯卧位
- E. 头高脚低位

72. 下列对慢性羊水过多临床表现描述错误的是

- A. 多发生于妊娠 20~24 周
- B. 孕妇子宫大于妊娠月份
- C. 腹部膨隆、腹壁皮肤发亮、变薄
- D. 胎位不清
- E. 胎心遥远或听不到

73. 活跃期延长是指

- A. 宫颈口停止扩张 ≥ 4 小时
- B. 活跃期宫颈口扩张速度 $< 0.5\text{cm/h}$
- C. 总产程不超过 3 小时者
- D. 宫口开全后初产妇超过 2 小时，经产妇超过 1 小时尚未分娩者
- E. 从临产至宫口开大 3cm，超过 16 小时者

74. 关于病理缩复环不正确的是

- A. 是先兆子宫破裂的征象
- B. 多发生于头盆不称、持续性横位时
- C. 常伴有血尿
- D. 环痕之上宫体压痛
- E. 必须立即剖宫产，以避免子宫破裂发生

75. 整个产程中，活跃期停滞是指

- A. 活跃期内宫口不再扩张达 0.5 小时
- B. 破膜后宫颈口扩张 ≥ 6 cm
- C. 宫缩正常，宫颈口停止扩张 ≥ 2 小时
- D. 宫缩欠佳，宫颈口停止扩张 ≥ 6 小时
- E. 活跃期内宫口不再扩张达 3 小时

二、A2 型题

76. 男，84 岁，行走时突然跌倒，神志不清，经医院检查，一侧肢体瘫痪，口斜眼歪，一侧瞳孔直径 5mm，另一侧瞳孔直径 3mm。瞳孔不等大的原因是

- A. 颅内压增高
- B. 脑膜炎
- C. 脑动脉血栓形成
- D. 脑疝
- E. 脑梗死

77. 患者，女性，36 岁。癫痫大发作。预防发生窒息，护士应采取的护理措施是

- A. 卧床休息，减少探视
- B. 移走身边危险物体
- C. 将病人头位放低，偏向一侧
- D. 禁止喂食丸状食物
- E. 快速利尿和吸氧

78. 病人女性，45 岁，因煤气中毒入院，刚入院时意识不清，经积极治疗后清醒，病人清醒后仍要休息观察

- A. 1~2 天
- B. 3~5 天
- C. 1 周
- D. 2 周

E. 半年

79. 男性病人，25岁，因高热2日未能进食，自述口渴、口干、尿少色黄。查体：口舌干燥，皮肤弹性差，眼窝凹陷。实验室检查：尿比重1.028，血清钠浓度为155mmol/L。考虑病人出现

- A. 等渗性脱水
- B. 低渗性脱水
- C. 轻度高渗性脱水
- D. 中度高渗性脱水
- E. 重度高渗性脱水

80. 男性，55岁，全麻术后未清醒，突然出现鼾声，可能出现了

- A. 呼吸道被痰堵塞
- B. 舌后坠
- C. 喉痉挛
- D. 即将苏醒
- E. 麻醉过深

81. 女性，38岁，甲亢，甲状腺大部切除术后，突发呼吸困难、窒息，最大的可能是

- A. 切口内出血
- B. 喉头水肿
- C. 气管塌陷
- D. 双侧喉返神经损伤
- E. 喉痉挛

82. 女性，30岁，甲状腺大部切除术后第2天，出现面肌和手足持续性痉挛，伴疼痛，持续时间10~15分钟不等，护士应备好

- A. 苯巴比妥

- B. 氯化钾
- C. 碘化钠
- D. 碳酸氢钠
- E. 葡萄糖酸钙

83. 男，6个月，确诊化脓性脑膜炎，按医嘱静脉注射20%甘露醇。下列操作哪一项错误

- A. 用药前检查药物有无结晶
- B. 缓慢静推或快速静滴
- C. 勿将药液漏到血管外
- D. 不与其他药物混合应用
- E. 若药液中有结晶需加碱性液使其溶化

84. 患儿女，4个月。发热3天，抽搐1次入院。体检颈部略有抵抗，前囟饱满，脑脊液检查示白细胞数为 $1000 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞90%，此患儿最可能的诊断为

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 病毒性脑膜炎
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 结核性脑膜炎
- E. 病毒性脑炎

85. 8岁患儿，因面部水肿、头痛、头晕就诊。尿液检查：蛋白(++)，红细胞 20^+ 个/HP，诊断为急性肾小球肾炎。对其处理应是

- A. 给镇痛药
- B. 适当下床活动，防止血栓形成
- C. 给大剂量青霉素
- D. 低盐、高糖、高蛋白饮食
- E. 低盐、高糖、高维生素饮食

86. 3岁患儿，易患肺部感染，剧烈活动后伴气促，紫绀不明显，胸骨左缘2肋间闻及响亮的连续性机器样杂音，第4肋间闻及3/6级全收缩期杂音，可扪及震颤，心尖区闻及舒张期隆隆样杂音， P_2 亢进，可闻及股动脉枪击音，血压90/40mmHg，X线检查左房、左室、右室增大，肺动脉段凸出。应诊断为

- A. 房间隔缺损
- B. 动脉导管未闭
- C. 室间隔缺损
- D. 室间隔缺损合并动脉导管未闭
- E. 法洛四联症

87. 某产妇，26岁，第一胎，足月临产14h，肛查：宫口开全，胎膜已破，胎方位正常，先露头，双顶径达坐骨棘水平，胎心音正常。在处理中首先考虑是

- A. 陪伴在产妇身旁，指导使用腹压
- B. 观察胎头是否已达到阴道口
- C. 准备产包
- D. 消毒外阴
- E. 洗手准备接生

88. 产妇，临产4小时，宫缩25~35秒，间隔4~5分钟，胎心140次/分，先露浮，突然阴道流水，色清，宫口开1指，下列哪项处理不当

- A. 立即听胎心
- B. 记录破膜时间
- C. 鼓励产妇在宫缩时，运用腹压力加速产程进展
- D. 超过12小时尚未分娩，加用抗生素
- E. 卧床，抬高臀部

89. 24岁初产妇，规律宫缩10小时，连续观察2小时，宫口由6cm开大至9cm，胎头S+1，胎心140次/分。本例恰当的处置应是

- A. 肌注哌替啶（杜冷丁）
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 立即行剖宫产术
- D. 严密观察产程进展及营养支持
- E. 立即行人工破膜

90. 某产妇，G₂P₁，孕 39 周分娩一女婴，体重 3600g。此次分娩从规律宫缩至胎盘娩出共用时 165min。此次分娩为

- A. 正常产
- B. 急产
- C. 滞产
- D. 早产
- E. 过期产

91. 初产妇，第二产程延长，行胎头吸引，胎儿体重 4000g，胎盘娩出后 1 小时阴道出血，宫底脐上二横指，质软，测量血压 73/30mmHg，脉细，出冷汗。其最可能的出血原因是

- A. 胎盘残留
- B. 宫缩乏力
- C. 会阴损伤
- D. 凝血障碍
- E. 胎盘早剥

92. 吴女士，妊娠 35 周，胎膜早破入院，检查先露入盆。护理措施中错误的是

- A. 嘱绝对卧床休息
- B. 严密注意胎心音变化
- C. 破膜 12 小时后给予抗生素
- D. 提供心理支持
- E. 及时灌肠

93. 产妇，31岁。产后2周，下肢肿胀，疼痛，皮肤紧张、发白，该产妇可能发生的产后并发症是

- A. 产后贫血
- B. 产后下肢血栓性静脉炎
- C. 产后高血压
- D. 产后心脏病
- E. 产后糖尿病

三、A3/A4型题

女，27岁，心慌、气短8年，反复咯血2年，近2日咯血加重而就诊。查体：双颊紫红，唇发绀，呼吸困难，双肺底散在湿啰音较多，心率120次/分，律齐，心尖区第一心音前有隆隆样杂音，颈静脉无怒张，肝未触及，腹部无移动性浊音，下肢不肿。

94. 病人脉搏一强一弱提示

- A. 全心功能衰竭
- B. 右房功能衰竭
- C. 右室功能衰竭
- D. 左房功能衰竭
- E. 左室功能衰竭

95. 心尖区第一心音前隆隆样杂音为何故

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 心包炎

女，12岁。因眼睑水肿、浓茶水色尿而就诊。查体：颜面眼睑水肿，血压140/96mmHg，下肢非凹陷性水肿，尿量300ml/24h，诊断为急性肾小球肾炎。

96. 该患儿的首优护理问题是

- A. 知识缺乏
- B. 体液过多
- C. 皮肤完整性受损的危险
- D. 潜在并发症：高血压脑病
- E. 活动无耐力

97. 该患儿如不采取治疗，最易出现的并发症是

- A. 感染加重
- B. 高血压脑病
- C. 严重循环充血
- D. 急性肾衰竭
- E. 心力衰竭

98. 此时护理措施最应强调

- A. 绝对卧床休息
- B. 限制水的入量
- C. 观察24小时出入量
- D. 快速利尿
- E. 应用降压药

孕妇，31岁，孕36周，头痛，视物不清2天，今晨头痛加剧，恶心，呕吐3次，随后剧烈抽搐约1分钟渐清醒，即测血压195/120mmHg，胎心120次/分，有不规律子宫收缩，肛查：子宫口未开，骨产道正常。

99. 最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 高血压危象
- C. 子痫
- D. 瘧病
- E. 癲病

100. 正确的护理措施是

- A. 将病人安置于双人房间
- B. 留置胃管
- C. 取头高侧卧位
- D. 每日听胎心一次
- E. 留置尿管

2022年初级护师《专业知识》考前模考大赛（二）答案部分

一、A1型题

1.

【正确答案】B

【答案解析】颈静脉可以反映右心房压力及容量变化，颈静脉怒张提示上腔静脉回流受阻，是右心衰竭的主要体征。

2.

【正确答案】B

【答案解析】右心衰竭主要表现为体循环静脉淤血，其症状以食欲不振、恶心、呕吐、水肿、腹胀、少尿、肝区胀痛等为特征。

3.

【正确答案】E

【答案解析】应用洋地黄类药物时注意不与奎尼丁、普罗帕酮（心律平）、维拉帕米（异搏定）、钙剂、胺碘酮等药物合用，以免增加药物毒性。

4.

【正确答案】A

【答案解析】当大便次数超过每日3次，且稀薄、容量及水分增加时，即为腹泻。

5.

【正确答案】E

【答案解析】肝性脑病二期（昏迷前期）以意识错乱、睡眠障碍、行为失常为主。定向力和理解力均减退，不能完成简单计算。言语不清，举止反常，多有睡眠时间倒错。此期病人有明显神经系统体征，如腱反射亢进、肌张力增高、巴宾斯基征阳性，扑翼样震颤存在，脑电图表现异常。

6.

【正确答案】C

【答案解析】肝性脑病患者蛋白质的供给：一、二期病人开始数天应限制蛋白质在每天20g以内，三、四期病人应禁止从胃肠道补充蛋白质，可鼻饲或静脉注射25%的葡萄糖溶液。所以应选择C。

7.

【正确答案】B

【答案解析】低血压或休克：常见于出血坏死型病人，由于胰腺发生大片坏死，病人烦躁不安、皮肤苍白、湿冷，少数病人可在起病数小时突然出现，甚至发生猝死。

8.

【正确答案】C

【答案解析】腹痛为本病的主要表现和首发症状。

9.

【正确答案】B

【答案解析】原发性肝癌患者腹部疼痛常局限于右上腹部，呈持续性胀痛或钝痛，肝痛原因与肿瘤增长迅速使肝包膜被牵拉有关。患者突然出现腹部剧痛、腹膜刺激征，根据病史，应首先考虑肝癌结节破裂，并破入腹膜。

10.

【正确答案】A

【答案解析】呕血病人护理措施：禁食，禁食期间要保持口腔清洁，防止感染。

11.

【正确答案】D

【答案解析】肝硬化门静脉高压症的三大表现：脾大、侧支循环的建立和开放、腹水。以腹水最为常见。

12.

【正确答案】B

【答案解析】肝硬化患者内分泌功能异常主要表现为肝对雌激素灭活能力减退，导致雌激素在体内增多，通过负反馈机制，抑制腺垂体功能，促性腺激素分泌减少，男性患者可有性欲减退、睾丸萎缩、乳房发育等；女性有月经失调、闭经等。并可见肝掌和蜘蛛痣。

13.

【正确答案】E

【答案解析】上消化道出血：为最常见的并发症，多突然发生大量呕血或黑粪，常引起出血性休克，诱发肝性脑病。

14.

【正确答案】C

【答案解析】三腔两囊管适用于肝硬化食管-胃底静脉曲张患者，一般不用于单纯消化性溃疡大出血患者。

15.

【正确答案】A

【答案解析】幽门梗阻少数病例可出现，主要发生于DU或幽门管溃疡，主要表现为餐后上腹部饱胀，频繁呕吐宿食，严重时可引起水和电解质紊乱，并有营养不良和体重下降症状。根据此题干的症状可判断是幽门梗阻。

16.

【正确答案】A

【答案解析】出血是消化性溃疡最常见的并发症，DU比GU易发生。

17.

【正确答案】A

【答案解析】上腹痛为消化性溃疡的主要症状。

18.

【正确答案】A

【答案解析】本题考查慢性肾衰竭的临床表现。慢性肾衰竭病人出现少尿、高血钾的时候，会导致肌肉无力、心律失常，甚至心脏骤停。故高血钾属于慢性

肾衰竭的急重症，当血钾高于 6.5mmol/L 时，已属于透析指征。所以，当患者出现少尿、高血钾的时候提示病情严重。贫血、食欲减退、水肿、低钠和呼出尿臭味的气体等，虽然也属于慢性肾衰竭晚期的表现，但是均不会危及生命，所以不能提示病情严重。故本题的答案为 A。

19.

【正确答案】C

【答案解析】慢性肾衰竭终末期病人常发生高钾血症，主要因进食水果、肉类多，尿量少及使用保钾利尿药造成。

20.

【正确答案】B

【答案解析】本题考查蛋白尿的概念。每日尿蛋白量持续超过 150mg ，或尿蛋白定性试验持续阳性称为蛋白尿。本题中选项 D 为大量蛋白尿的标准，与题干不符。选项 A 确实达到蛋白尿的标准，但是不知道其蛋白尿发生的频度，因此也不是蛋白尿的诊断标准。选项 C 与题目无关。选项 E 为尿蛋白的定性试验，也应有频度才可以作为蛋白尿的诊断标准。故本题的答案为 B。

21.

【正确答案】A

【答案解析】静脉补钾应注意以下事项：尿量要在 40ml/h 以上；氯化钾浓度一般不超过 0.3% ；速度不超过 1.5g/h ；总量不宜超过 $3\sim 6\text{g/d}$ 。

22.

【正确答案】E

【答案解析】钾大部分在细胞内液（约为总钾的 98% ），为胞内的主要阳离子。钾的生理功能主要为：参与新陈代谢，特别是合成代谢；维持细胞的渗透压；调节酸碱平衡；维持细胞的应激性，主要是神经、肌肉细胞。钾摄入来自于食物， 90% 在小肠吸收，大部分由肾脏排泄（ 90% ），余下通过肠道，极少量

通过皮肤出汗排泄。肾脏根据钾的摄入量，调节钾的排泌，多吃多排，少吃少排，不吃也排。高血钾对心肌起抑制作用，低血钾对心肌起兴奋作用，E选项描述不够严谨。

23.

【正确答案】D

【答案解析】低磷血症时，实验室检查血清无机磷低于 0.96mmol/L 。

24.

【正确答案】D

【答案解析】肾性水肿患者体内钠水潴留明显，在组织结构疏松，皮肤伸展度大的部位（如眼睑等）容易容纳水肿液，组织结构致密的部位（如手指和足趾等），因皮肤较厚而伸展度小不易发生水肿。因此，肾性水肿不受重力的影响首先发生在组织疏松的眼睑部。

25.

【正确答案】D

【答案解析】等渗性脱水一般可用等渗盐水或平衡盐溶液补充血容量，但等渗性盐水因其氯含量高于血清氯含量，大量补充有致高氯性酸中毒的危险。而平衡盐溶液内电解质含量与血浆相似，用于治疗将更为合理和安全，常用的有乳酸钠和复方氯化钠溶液。故正确答案为D。

26.

【正确答案】D

【答案解析】最严重的代谢性并发症——非酮性高渗性高血糖性昏迷，常见原因：①单位时间内输入过量葡萄糖；②胰岛素相对不足，临床主要表现为血糖升高、渗透性利尿、脱水、电解质紊乱、中枢神经系统功能受损，甚至昏迷。尤其在老年人，有糖尿病、尿毒症及严重应激状态下，TPN 输液太快，糖浓度相对过高时易于发生。故选D。

27.

【正确答案】C

【答案解析】胃肠有一定功能的，需要营养疗法的病人均可采用肠内支持。

28.

【正确答案】D

【答案解析】休克早期，患者出现面色苍白、四肢湿冷、尿量减少、收缩压稍升高等症状。

29.

【正确答案】E

【答案解析】休克的治疗原则是：1. 迅速恢复有效循环血量，采取扩容疗法，并注意强心和调节血管张力；2. 消除休克的致病因素，这是抗休克的根本措施；3. 保护重要器官功能，纠正水电解质紊乱及酸中毒。

30.

【正确答案】E

【答案解析】成人 24 小时总尿量少于 400ml 成为少尿，不足 100ml 为无尿。

31.

【正确答案】B

【答案解析】初期时病人出现呼吸困难，呼吸频率加快，呼吸有窘迫感，检查无明显体征，X 线检查也无显著变化。血气分析动脉血氧分压下降，一般性给氧病情不能缓解。

32.

【正确答案】B

【答案解析】局部麻醉的不良反应护理：局部不良反应多为局麻药和组织直接接触所致，若局麻药浓度高或与神经接触时间过长可造成神经损害。故用药必须遵循最小有效剂量和最低有效浓度的原则。

33.

【正确答案】E

【答案解析】为预防术后头痛，蛛网膜下腔麻醉后应去枕平卧 6~8 小时。

34.

【正确答案】A

【答案解析】择期手术前应尽量常规排空胃，避免围手术期发生胃内容物的反流、呕吐和误吸，以及由此而造成的窒息和吸入性肺炎。正常人的胃排空时间约为 4~6 小时，因此病人在麻醉前应禁食 8~12 小时，禁水 4~6 小时。

35.

【正确答案】D

【答案解析】上呼吸道梗阻见于气管内插管失败、极度肥胖、静脉麻醉未行气管内插管、胃内容物误吸及喉痉挛者。病人往往在自主呼吸时出现“三凹征”，人工呼吸时呼吸囊阻力大，无胸廓起伏，短期内可致死。务必预防在先。故选 D。

36.

【正确答案】A

【答案解析】急性蜂窝织炎是一种急性弥漫性化脓性感染；易扩散迅速，与正常组织无明显界线；致病菌主要是溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌；炎症可由皮肤或软组织损伤后感染引起，亦可由局部化脓性感染灶直接扩散经淋巴、血流传播而发生；局部明显红肿、剧痛，并向四周迅速扩大，常伴发热、寒战等全身症状。故选 A。

37.

【正确答案】C

【答案解析】破伤风的潜伏期一般为7~8天。

38.

【正确答案】C

【答案解析】新生儿破伤风，因其肌肉纤弱而症状不典型，常表现为不能啼哭和吸吮乳汁、活动少、呼吸弱甚至呼吸困难。

39.

【正确答案】A

【答案解析】表浅的急性蜂窝织炎，局部明显红肿、剧痛，并向四周迅速扩大，病变区与正常皮肤无明显分界，病变中央部位常因缺血发生坏死，常伴发热、寒战等全身症状；致病菌主要是溶血性链球菌，其次为金黄色葡萄球菌，亦可为厌氧性细菌。

40.

【正确答案】E

【答案解析】全身感染的护理措施：（1）一般护理；（2）严密观察病人的面色和神志，监测生命体征等，及时发现病情变化；（3）监测体温变化；（4）保证用药及时。

41.

【正确答案】D

【答案解析】脊柱骨折病人应保持仰卧过伸位，防止骨折损伤周围神经、组织。

42.

【正确答案】C

【答案解析】化脓性关节炎在关节腔灌洗时，每日经滴注管滴入含抗生素的溶液 2000~3000ml，直至引流液清澈，细菌培养阴性为止。

43.

【正确答案】C

【答案解析】颈椎前路手术术前备皮一般无需剃头，如果进行后路手术时应剃头。

44.

【正确答案】A

【答案解析】术后搬运应注意保持患者身体轴线平直，应选用 3 人搬运法；术后应平卧 24 小时不翻身，以压迫伤口利于止血；持续卧床 1~3 周，1 周后开始进行腰肌和臀肌等长收缩锻炼。引流管一般 24~48 小时后取出

45.

【正确答案】B

【答案解析】牵引：颌枕带牵引，可坐位或卧位，牵引重量 2~6kg，每日 1~2 次，每次 1 小时，也可每日 6~8 小时，2 周为一疗程。除脊髓型外均可应用。

46.

【正确答案】C

【答案解析】中度脱水丢失水分占体重的 5%~10%。

47.

【正确答案】E

【答案解析】轻型（无脱水及中毒症状）、中型（轻、中度脱水或有轻度中毒症状）及重型（重度脱水或有明显中毒症状）腹泻。

48.

【正确答案】A

【答案解析】鹅口疮可用 2% 的碳酸氢钠溶液清洗，以饭后 1 小时清洗为宜。

49.

【正确答案】B

【答案解析】服用 ORS 液时应注意：①服用 ORS 液期间应让患儿照常饮水，防止高钠血症的发生；②如果患儿眼睑出现水肿，应停止服用 ORS 液，改用白开水；③新生儿或心、肾功能不全、休克及明显腹胀者不宜应用 ORS 液。

50.

【正确答案】C

【答案解析】婴幼儿局部症状不明显而全身症状重；年长儿全身症状轻，以局部症状为主。（1）局部症状：流涕、鼻塞、喷嚏、咳嗽、咽部不适和咽痛等。（2）全身症状：发热、畏寒、头痛、烦躁不安、拒奶、乏力等，可伴有呕吐、腹泻、腹痛，甚至高热惊厥。

51.

【正确答案】C

【答案解析】若患儿突然口吐粉红色泡沫痰，应考虑肺水肿，可给患儿吸入经 20%~30% 乙醇湿化的氧气，间歇吸入，每次不超过 20 分钟。

52.

【正确答案】B

【答案解析】小儿肺炎护理措施：帮助患儿取合适的体位并经常更换，翻身拍背，帮助痰液排出，防止坠积性肺炎。方法是五指并拢，稍向内合掌，由下向上、由外向内地轻拍背部。

53.

【正确答案】B

【答案解析】急性支气管炎临床表现：大多先有上呼吸道感染症状，咳嗽为主要症状，初为干咳，以后有痰。

54.

【正确答案】C

【答案解析】金黄色葡萄球菌肺炎：本病多见于新生儿及婴幼儿。临床起病急、病情重、发展快。多呈弛张热，婴幼儿可呈稽留热。中毒症状明显，面色苍白，咳嗽，呻吟，呼吸困难。肺部体征出现早，双肺可闻及中、细湿啰音，易并发脓胸、脓气胸。常合并循环、神经及消化系统功能障碍。

55.

【正确答案】D

【答案解析】心脏病患儿并发肺部感染者，须绝对卧床休息。

56.

【正确答案】A

【答案解析】风湿热主要表现为心脏炎、关节炎、舞蹈病、皮下结节、环形红斑。

57.

【正确答案】A

【答案解析】心脏炎是风湿热最严重的表现，小儿风湿热以心脏炎起病占40%~50%，年龄愈小，心脏受累的机会愈多，以心肌炎及心内膜炎多见，亦可发生全心炎。

58.

【正确答案】A

【答案解析】风湿热皮肤损害以环形红斑最常见。

59.

【正确答案】B

【答案解析】流行性腮腺炎应隔离至腮肿完全消退3日为止。

60.

【正确答案】D

【答案解析】脑膜脑炎是腮腺炎的最常见临床表现，发生率占15%。

61.

【正确答案】A

【答案解析】支气管肺炎：出疹1周内常见，占麻疹患儿死因的90%以上。

62.

【正确答案】A

【答案解析】麻疹患儿易并发维生素A缺乏症。

63.

【正确答案】C

【答案解析】中毒性细菌性痢疾患儿应采取肠道隔离至对患儿采取肠道隔离至临床症状消失后1周或3次粪培养阴性止。

64.

【正确答案】D

【答案解析】中毒性痢疾患者全身毒血症状严重而肠道炎症反应轻。

65.

【正确答案】A

【答案解析】接触后5日内注射人血丙种球蛋白或胎盘球蛋白，可免于发病，6日后注射可减轻症状，有效免疫期1~8周。

66.

【正确答案】B

【答案解析】至少6个月后方可再孕，再孕时应加强产前监护，避免再次发生早产。

67.

【正确答案】A

【答案解析】难免流产者是由先兆流产发展而来，表现为阴道流血量多，阵发性腹痛加剧，晚期流产者还可有羊水从阴道流出。难免流产一旦确诊，应该尽早使胚胎及胎盘组织完全排出，以防出血和感染。

68.

【正确答案】D

【答案解析】孕妇的血压在孕前或妊娠20周前不高，而至妊娠20周后血压开始升高大于或等于140/90mmHg提示血压异常。

69.

【正确答案】C

【答案解析】肌内注射作用时间长，但局部刺激性强。注射时应注意使用长针头、深部肌内注射，也可加利多卡因于硫酸镁溶液中，以缓解疼痛刺激，注射后注意预防注射部位感染。硫酸镁的滴注速度以1g/h为宜，不超过2g/h。中毒现象首先表现为膝反射减弱或消失，随着血镁浓度的增加可出现全身肌张力减退及呼吸抑制，严重者心跳可突然停止。

70.

【正确答案】C

【答案解析】硫酸镁的治疗浓度和中毒浓度相近，因此在进行硫酸镁治疗时应严密观察其毒性作用，护士在用药前及用药过程中均应监测孕妇血压，同时还

应检测膝腱反射必须存在；呼吸不少于 16 次/分；尿量每 24 小时不少于 600ml，或每小时不少于 25ml。选择答案 C。

71.

【正确答案】C

【答案解析】妊娠高血压孕妇在休息和睡眠时，以左侧卧位为宜，左侧卧位可减轻子宫对腹主动脉、下腔静脉的压迫，使回心血量增加，改善子宫胎盘的血供。

72.

【正确答案】A

【答案解析】慢性羊水过多：较多见。多发生于妊娠晚期，羊水可在数周内逐渐增多。孕妇子宫大于妊娠月份，腹部膨隆、腹壁皮肤发亮、变薄，检查时胎位不清，胎心遥远或听不到。

73.

【正确答案】B

【答案解析】从活跃期起点（4~6cm）至宫颈口开全称为活跃期。活跃期宫颈口扩张速度 $<0.5\text{cm/h}$ 称为活跃期延长。

74.

【正确答案】D

【答案解析】病理性缩复环形成后，子宫下段膨隆有明显压痛。产妇自觉疼痛难忍，因膀胱受压过久可出现排尿困难和血尿。必须立即剖宫产，以避免子宫破裂的发生。

75.

【正确答案】D

【答案解析】活跃期停滞：当破膜后宫颈口扩张 $\geq 6\text{cm}$ 后，若宫缩正常，宫颈口停止扩张 ≥ 4 小时；若宫缩欠佳，宫颈口停止扩张 ≥ 6 小时称为活跃期停滞。

二、A2型题

76.

【正确答案】D

【答案解析】老年男性，活动时发病，以意识障碍、肢体瘫痪、面瘫为主要症状，考虑脑出血可能性大。脑出血患者如果病情严重，脑内压力不均匀，脑组织从高压区向低压区移位，引起严重的并发症脑疝，患者可出现双侧瞳孔不等大的表现。

77.

【正确答案】C

【答案解析】将病人头位放低，偏向一侧，可防止患者发生窒息。

78.

【正确答案】D

【答案解析】急性CO中毒病人苏醒后，应该休息观察2周，以防迟发性脑病和心脏后发症的发生。

79.

【正确答案】D

【答案解析】病人因高热、未进食，出现体液丢失，失水多于失钠，血清钠高于正常，除口渴外，出现尿少、尿比重升高，皮肤黏膜改变，符合中度高渗性脱水特点。

80.

【正确答案】B

【答案解析】如果病人出现鼾声，说明可能出现了舌后坠，舌头阻塞了呼吸道而发出鼾声。此时可托起病人下颌，放入口咽导管并吸除分泌物，一般可缓解。

81.

【正确答案】A

【答案解析】甲状腺大部分切除手术后病人出现呼吸困难和窒息的主要原因有切口内血肿压迫、喉头水肿、气管塌陷、痰液阻塞、双侧喉返神经损伤等。甲状腺血液循环丰富，手术中和手术后容易发生切口内出血，从而引起手术后呼吸困难和窒息。

82.

【正确答案】E

【答案解析】该病人在甲状腺大部切除术后出现手足抽搐，是由于术中甲状旁腺误伤、切除或其血液供应受累所致。随着血钙浓度下降，神经肌肉的应激性显著提高。抽搐发作时，立即静脉注射 10% 葡萄糖酸钙或氯化钙 10~20ml，以提高血钙含量，降低神经肌肉的应激性。

83.

【正确答案】E

【答案解析】如药液中有结晶，使用时略微加温使其溶解后注射使用，静脉滴入时最好是用带过滤网的输血器，以免晶体进入血管，不能用碱性液体。

84.

【正确答案】A

【答案解析】化脓性脑膜炎的脑脊液检查特点为：压力升高，外观浑浊或脓性，白细胞数明显多达 $1000 \times 10^6/L$ ，以中性粒细胞为主，蛋白升高，糖和氯化物均下降。

85.

【正确答案】E

【答案解析】急性肾小球肾炎饮食管理：少尿时，应限制水和钠盐的摄入，每日食盐量1~2g，严重病例钠盐限制于每日60mg/kg，有氮质血症时，限制蛋白质的入量，给优质动物蛋白每日0.5g/kg；供给高糖饮食以满足热量的需求；严重水肿、尿少时应限制水的摄入。尿量增加、水肿消退、血压正常后，可恢复正常饮食，以保证小儿生长发育的需要。

86.

【正确答案】D

【答案解析】患儿的心脏听诊有两处杂音，X线检查左房、左室、右室增大。根据患儿的临床表现判断为室间隔缺损合并动脉导管未闭。

87.

【正确答案】A

【答案解析】该产妇宫口开全，正进入第二产程阶段。此时，需要护士陪伴在产妇身旁提供心理支持，并指导其正确使用腹压，减少体力消耗，配合分娩过程。B、C、D、E的内容是第一产程阶段的工作。

88.

【正确答案】C

【答案解析】第一产程应在宫缩时指导作深呼吸动作，或多用双手轻揉下腹部。若腰骶痛用手拳压迫腰骶部常能减轻不适感。宫口开全进入第二产程后才能指导产妇正确运用腹压，而本题产妇尚处于第一产程，所以C不正确。胎膜破裂超过12小时尚未分娩，应该用抗生素来预防感染。

89.

【正确答案】D

【答案解析】题中孕妇产程未见有异常。故选D。

90.

【正确答案】B

【答案解析】急产，即总产程不超过 3h。

91.

【正确答案】B

【答案解析】该产妇因为胎儿体重过大导致继发性宫缩乏力。继发性宫缩乏力指产程开始子宫收缩正常，在产程进行到某一阶段（多在活跃期或第二产程），子宫收缩力较弱，产程进展缓慢，甚至停滞。

92.

【正确答案】E

【答案解析】胎膜早破患者需住院待产，严密注意胎心音变化。胎先露部未衔接者应绝对卧床休息，抬高臀部，避免不必要的肛诊与阴道检查。

93.

【正确答案】B

【答案解析】产后，来自胎盘剥离处的感染性栓子，可经血行播散，引起下肢血栓性静脉炎，血液回流受阻，引起下肢水肿、发白。选择答案 B。

三、A3/A4 型题

94.

【正确答案】E

【答案解析】本题考查了慢性心功能不全患者的体征。脉搏一强一弱提示为交替脉。交替脉为节律规则而强弱交替的脉搏。一般认为为左室收缩力强弱交替所致，为左心衰竭的重要体征之一。患者表现出脉搏强弱交替，即轻度者，仅在测血压时能够发现。常见于高血压性心脏病、急性心肌梗死和主动脉瓣关闭不全等。

95.

【正确答案】A

【答案解析】本题又考查了二尖瓣狭窄的诊断。心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音，是最重要的体征。只是本题在这里没有直接提示考生杂音出现的时间，而是指出杂音出现在“第一心音前”，故考生应该可以通过所学的身体评估知识，判断出该杂音出现于舒张期。现在本题可以这样分析：二尖瓣听诊区位于心尖部，故心尖部出现的杂音，主要反映的是二尖瓣的问题，在舒张期主要是左心房射血进入左心室的过程，此时二尖瓣应该处于开放状态，因而这个过程出现的杂音只能是二尖瓣的开放出现了问题，即瓣膜的狭窄。

96.

【正确答案】B

【答案解析】目前患儿最主要的问题是肾小球滤过率下降所引起的水肿和少尿，故该患儿的首优护理问题是体液过多。

97.

【正确答案】C

【答案解析】该患儿如不采取治疗会出现严重水肿，由于水钠潴留，血浆容量增加而出现严重的循环充血。

98.

【正确答案】A

【答案解析】目前患儿的首优护理问题是体液过多。休息可减轻心脏负担，改善心功能，增加心排血量，使肾血流量增加，提高肾小球滤过率，减少水钠潴留，减少潜在并发症发生；同时由于静脉压下降，降低了毛细血管血压，而能使水肿减轻。故此时护理措施最应强调的是使患儿绝对卧床休息。

99.

【正确答案】C

【答案解析】该孕妇血压明显高于正常值，有自觉症状头痛、视物不清等2天，今晨头痛加剧，恶心、呕吐3次，随后剧烈抽搐约1分钟说明是子痫病人。

100.

【正确答案】E

【答案解析】病人清醒后应该严密观察并记录生命体征、病情变化、宫内胎儿状况及出入量等情况，所以需要留置尿管。