

妇产科主治医师《相关专业知识》模考试卷

一、A1

1. 痛经患者口服避孕药治疗，其目的是为了
  - A. 降低雌激素的水平
  - B. 降低孕激素的水平
  - C. 使子宫内膜萎缩
  - D. 抑制排卵
  - E. 增加子宫肌张力、缓解痛经
  
2. 关于排卵性功能性出血的治疗，下列哪项是正确的
  - A. 排卵期出血可从月经第 1 天起服雌激素
  - B. 排卵性月经过多用大量雌激素止血
  - C. 内膜脱落不全用氯芪酚胺(克罗米芬)治疗
  - D. 黄体功能不全可在体温升高第 3 天起用 hCG 治疗
  - E. 黄体功能不全亦可给甲基睾丸素治疗
  
3. 关于子宫内膜异位症的描述中，错误的是
  - A. 异位内膜对激素不敏感
  - B. 最常见的转移部位为卵巢
  - C. 盆腔内异症确诊的金标准为腹腔镜
  - D. 极少发生恶变
  - E. 痛经不是内异症诊断的必需症状
  
4. 子宫内膜异位症引起的盆腔疼痛的特点错误的是
  - A. 与病变程度不完全平行
  - B. 多为继发性痛经
  - C. 疼痛程度与 AFS 分期一致
  - D. 非经期疼痛为慢性盆腔疼痛
  - E. 有大便困难疼痛和性交痛

5. 进行性痛经病人出现肾积水最可能的原因是

- A. 宫颈癌
- B. 泌尿系结核
- C. 盆腔炎性包块压迫
- D. 输尿管子宫内异位症
- E. 卵巢癌

6. 测定雌激素对下列无临床意义的是

- A. 判断闭经原因
- B. 检测卵泡发育
- C. 诊断子宫内膜异位症
- D. 诊断无排卵月经
- E. 女性性早熟

7. 关于子宫内膜异位症痛经的特点正确的是

- A. 原发性痛经
- B. 继发性痛经
- C. 运动性痛经
- D. 偶发痛经
- E. 功能性痛经

8. 下列关于子宫内膜异位症发病机制，被公认的是

- A. LUFS 学说
- B. 种植学说
- C. 移植学说
- D. 良性转移学说
- E. 体腔上皮化生学说

9. 关于子宫内膜异位症的临床特点，错误的是
- A. 痛经是子宫内膜异位症的典型症状
  - B. 痛经多随局部病变加重而逐年加剧
  - C. 疼痛多位于下腹部及腰骶部
  - D. 疼痛在经期第一日最剧，以后逐渐减轻，月经干净消失
  - E. 疼痛程度与病灶大小成比例
10. 关于子宫内膜异位症的药物治疗，下列哪项叙述是错误的
- A. 一般主张连续应用 6 个月
  - B. 短效避孕药对轻度子宫内膜异位症有效
  - C. 药物对肝脏有一定影响，治疗同时定期检查肝功能情况
  - D. 达那唑有致畸作用，要求生育者不用
  - E. 高效孕激素疗法停药后妊娠率较高，未孕患者宜选用
11. 子宫内膜异位症临床表现，错误的是
- A. 腹痛始于经前数小时，经血通畅后腹痛缓解
  - B. 持续性下腹痛，不与月经同步
  - C. 腹痛与病变严重程度不一致
  - D. 异位内膜累及子宫直肠陷凹，可有性交痛
  - E. 继发性和渐进性加重性痛经
12. 考虑不孕的患者首先进行的辅助检查手段应是
- A. 宫颈碘试验及阴道镜检查
  - B. 腹腔镜检查
  - C. 胎儿镜检查
  - D. 子宫输卵管造影
  - E. 子宫内膜活组织检查
13. 以下关于输卵管阻塞造成的不孕，错误的是

- A. 阑尾炎
- B. 盆腔炎
- C. 先天性输卵管发育不全
- D. 结核性腹膜炎
- E. 结肠炎

14. 关于胎儿生长受限的诊断，叙述错误的是

- A. 仔细询问有无引起 FGR 的高危因素
- B. 必须准确确定胎龄
- C. B 超测定胎头双顶径有助于诊断
- D. 测定尿 E 和 E/C 比值有助于诊断
- E. 一次测量数值即可确诊

15. 以下不是早产原因的是

- A. 孕妇患急性肾盂肾炎
- B. 孕妇患慢性肾炎
- C. 双子宫的一侧妊娠
- D. 胎膜早破
- E. 胎儿脑积水

16. 以下不属于治疗早产先兆的药物是

- A.  $\beta$  肾上腺素受体激动药
- B. 前列腺素合成酶抑制药
- C. 硫酸镁静脉缓慢滴注
- D. 硝苯地平舌下含服
- E. 肌内注射苯甲酸雌二醇

17. 对于过期妊娠孕妇，需迅速终止妊娠的情况是

- A. B 型超声显示羊水最大平段 4cm

- B. 2 小时胎动 12 次
- C. 缩宫素激惹试验阴性
- D. 无应激试验为有反应型
- E. 尿雌三醇值为 6mg/24h

18. 下列导致早产的可能原因哪项除外

- A. 胎膜早破
- B. 下生殖道感染
- C. 羊水过少
- D. 双角子宫
- E. 多胎妊娠

19. 下列哪项不是治疗早产的药物

- A. 利托君
- B. 吲哚美辛
- C. 肾上腺糖皮质激素
- D. 他巴唑
- E. 沙丁胺醇

20. 下列哪项可诊断为早产

- A. 妊娠 32 周规律腹坠 2 小时，查：宫口开大 0.5cm
- B. 妊娠 33 周见红，不规律腹坠，查：颈管未消失
- C. 妊娠 34 周规律腹坠 3 小时，查：宫口开大 3cm
- D. 妊娠 38 周规律腹坠 1 小时，查：宫口开大 3cm
- E. 妊娠 27 周规律腹坠 2 小时，查：宫口开大 3cm

21. 下列哪项与自然流产无关

- A. 宫颈重度裂伤
- B. 黄体功能不足

C. 甲状腺功能低下

D. 子宫畸形

E. 经产妇

22. 关于妊娠合并心脏病孕妇分娩期血流动力学变化，叙述错误的是

A. 第一产程：规律宫缩使周围循环阻力增加，回心血量减少

B. 第二产程：宫缩加上腹压，周围阻力增大

C. 第二产程：腹压增高使内脏血流涌向心脏，回心血量增加

D. 第三产程：子宫迅速缩小，腹压减低，大量血液流回内脏血管，回心血量减少

E. 第三产程：胎儿娩出后子宫胎盘循环停止，大量血液进入体循环，回心血量增加

23. 关于病毒性肝炎，下述哪项是不恰当的

A. 以乙型肝炎最常见

B. 病原主要包括甲、乙、丙、丁、戊五型

C. 常见发生于妊娠中晚期

D. 孕妇肝炎的发生率高于非孕妇女

E. 暴发性肝炎的发生率明显高于非孕妇女

24. 关于肺结核对妊娠的影响，下述哪项是不恰当的

A. 非活动性肺结核病变范围不大，对妊娠经过和胎儿发育影响不大

B. 肺结核患者除非同时患有生殖器结核，一般不影响受孕

C. 活动性肺结核患者妊娠，可致流产、胎死宫内

D. 严重肺结核合并妊娠，围产儿死亡率可高达 30%~40%

E. 结核病孕妇在产前不会将结核菌传给胎儿

25. 关于急性肾盂肾炎对妊娠的影响，下列哪项不恰当

A. 妊娠早期高热可使胎儿神经管发育障碍

- B. 高热可引起流产、早产
- C. 无脑儿的发生率较正常者高
- D. 患急性肾盂肾炎孕妇中有 3%可发生中毒性休克
- E. 患急性肾盂肾炎孕妇中有 10%可发生中毒性休克
26. 关于妊娠合并肺结核者产褥期注意事项，下述哪项不恰当
- A. 活动性肺结核患者产后不可哺乳
- B. 活动性肺结核患者产后应与新生儿严格隔离
- C. 产褥期应加强营养，延长休息时间
- D. 新生儿不需接种卡介苗
- E. 产后 6 周及 3 个月应复查肺部 X 线
27. 关于妊娠合并糖尿病，下述哪项是不恰当的
- A. 孕期控制饮食
- B. 用胰岛素控制血糖，不影响胎儿
- C. 已有严重心血管病史，肾功能减退不宜妊娠
- D. 产后继续用产前所用胰岛素剂量
- E. 孕晚期估计胎儿成熟度
28. 关于妊娠期及产褥期并发急性肾盂肾炎，下列叙述哪项是不恰当的
- A. 单侧时以右侧多见
- B. 发病率约占病人的 2%
- C. 症状包括厌食、恶心呕吐
- D. 大肠埃希菌是主要致病菌
- E. 常合并自体免疫缺乏
29. 关于妊娠期糖尿病，下述哪项是恰当的
- A. 如果一次筛查结果阴性，即不用再重复检查
- B. 一般情况孕妇应在 32 周左右进行糖筛查

- C. 如果 2 次空腹血糖  $\geq 5.8\text{mmol/L}$ , 则不用进行口服糖耐量试验, 即可确诊
- D. 妊娠期糖尿病患者产后均可恢复正常
- E. 如果孕妇任何一次血糖  $\geq 11.1\text{mmol/L}$ , 即可诊断

30. 急性盆腔腹膜炎应采取的体位是

- A. 平卧位
- B. 半卧位
- C. 侧卧位
- D. 膝胸卧位
- E. 俯卧位

31. 急性盆腔结缔组织炎最常见的病变部位在

- A. 子宫直肠陷凹处
- B. 盆腔腹膜
- C. 子宫旁结缔组织
- D. 膀胱旁结缔组织
- E. 直肠旁结缔组织

32. 膀胱膨出与直肠膨出的主要原因是

- A. 先天性发育不良
- B. 骨盆及盆底外伤
- C. 分娩损伤, 产褥期过早参加体力劳动
- D. 慢性咳嗽
- E. 长期便秘

33. 阴道前壁完全膨出于阴道口外为

- A. 阴道前壁 I 度脱垂
- B. 阴道前壁 II 度脱垂
- C. 阴道前壁 III 度脱垂



D. 阴道后壁脱垂

E. 肠膨出

34. 关于粪瘘哪项不正确

A. 分娩时第二产程延长，胎头长期压迫所致

B. 肿瘤放射治疗后可引起

C. 会阴III度裂伤后，直肠裂伤愈合不良引起

D. 缝合会阴伤口时，缝线通过直肠黏膜引起

E. 一旦发现粪瘘后，即行手术治疗

35. 对于尿瘘的手术时机，不恰当的是

A. 上次尿瘘修补失败，再次手术应3个月后进行

B. 妇科手术中输尿管缺血损伤引起的输尿管阴道瘘，应立即修补

C. 妇科手术中切断输尿管，应立即修补

D. 未绝经女性，应月经干净后3~7天手术

E. 合并泌尿系感染者，应先控制感染再手术

36. 妇科手术中剥离过度引起的缺血坏死型尿瘘产生漏尿的时间是

A. 术后1个月

B. 术后3~7天

C. 手术当中

D. 术后2个月

E. 术后3个月

37. 为了解膀胱瘘孔位置和数目及输尿管阴道瘘位于何侧，选择

A. 亚甲蓝试验

B. 膀胱镜检查

C. 输尿管镜检查

D. 静脉肾盂造影

E. 肾图

38. 有关不孕症的概念，以下错误的是哪一项

- A. 不孕症指有正常性生活，未避孕，同居 1 年而未能受孕者
- B. 不孕主要原因在男方
- C. 原发不孕指婚后从未受孕
- D. 曾经怀孕而后又不孕者称继发不孕
- E. 根据不孕的原因可分为相对不孕及绝对不孕

39. 关于进行性交后精子穿透力试验，下列哪项是正确的

- A. 应先测基础体温（BBT），根据基础体温确定的排卵日进行
- B. 试验前 3 天内应该用消炎药预防生殖道炎症
- C. 试验前 3 天内应进行阴道冲洗，以防感染
- D. 试验前 3 天内禁止性交
- E. 为了解精子穿透力，应在性交后 10 小时取材

40. 在我国，因输卵管梗阻导致不孕的常见原因是

- A. 输卵管炎症
- B. 输卵管畸形
- C. 子宫内膜异位症
- D. 子宫肌瘤的压迫
- E. 生殖器结核

41. 黄体功能不足、卵泡期过长选用

- A. LHRH
- B. 溴隐亭
- C. 氯米芬
- D. hCG
- E. hMG

42. 为诱发排卵，首选哪种药物为宜

- A. 绒毛膜促性腺激素
- B. 雌激素
- C. 克罗米芬
- D. 类固醇制剂
- E. 孕激素

43. 为受孕具备的条件中，以下哪项不正确

- A. 精液正常并含有正常的精子
- B. 卵巢排出正常的卵子
- C. 卵子及精子能够在输卵管峡部相遇结合成为受精卵
- D. 受精卵能顺利地进入子宫腔
- E. 子宫内膜为受精卵着床做好充分准备

44. 下列符合临产诊断的是

- A. 阴道排液
- B. 尿频腹胀
- C. 胎头已达坐骨棘水平
- D. 阴道有少量血性黏液
- E. 规律宫缩，宫颈扩张，胎头下降

45. 确诊为输卵管妊娠破裂、出血性休克，应采取的紧急措施是

- A. 输血
- B. 给血管活性药物
- C. 扩容
- D. 纠正休克后手术
- E. 立即手术

46. 产后轻型子宫内膜炎很少出现

- A. 子宫压痛
- B. 下腹隐痛
- C. 子宫复旧延迟
- D. 恶露混浊而臭
- E. 体温 39℃ 以上

47. 下列不属于妊娠滋养细胞疾病的是

- A. 葡萄胎
- B. 绒毛膜癌
- C. 侵袭性葡萄胎
- D. 合体细胞子宫内膜炎
- E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

48. 典型滴虫性阴道炎的临床表现是

- A. 黄色白带，外阴不痒
- B. 脓白带，阴道灼痛
- C. 血性白带，奇痒难忍
- D. 白带呈豆腐渣样，外阴奇痒
- E. 白带呈灰黄泡沫状，外阴瘙痒

49. 妊娠合并心脏病孕妇的高危时期是

- A. 妊娠 24~27 周
- B. 妊娠 28~31 周
- C. 妊娠 32~34 周
- D. 妊娠 35~38 周
- E. 产褥期 7 天以后

50. 关于妊娠合并再障的分娩方式，下列处理不恰当的是

- A. 产后仔细检查软产道
- B. 可适当助产，防止产伤
- C. 尽量阴道分娩，缩短第二产程
- D. 当分娩方式采用剖宫产术时一并切除子宫
- E. 可放宽剖宫产指征以避免用力造成颅内出血

## 二、A2

51. 患者，女，34岁。月经紊乱5年，诊刮结果为子宫内膜样高分化腺癌。行筋膜外子宫切除加双附件切除后，切开子宫，见宫底部有1.3cm癌灶，术中冰冻活检无肌层浸润，该患者下一步处理应是

- A. 行盆腔淋巴结清扫和（或）取样
- B. 行腹主动脉旁淋巴结取样
- C. 不再进行其他手术处理
- D. 再切除1cm阴道及2cm宫旁组织
- E. 行腹股沟深浅淋巴结清扫和（或）取样

52. 女，29岁，已婚未孕，月经紊乱2年。妇科检查：宫颈光滑，子宫正常大小，双附件无异常，诊刮结果为子宫内膜中度不典型增生。应选择哪项处理

- A. 大剂量孕激素治疗3个月后复查
- B. 建议行子宫切除
- C. 半年后复查
- D. 宫腔镜行内膜电切
- E. 进一步行CT检查

53. 45岁，G<sub>1</sub>P<sub>1</sub>，月经过多继发贫血2年。妇科检查：宫颈轻度糜烂，子宫孕3个月大小，凹凸不平，双附件无异常。血红蛋白65g/L。患者最可能的诊断是

- A. 子宫内膜癌
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫肌瘤

D. 子宫内膜息肉

E. 功能失调性子宫出血

54. 女性，31岁，生育史1-0-0-1，因诊断为葡萄胎收入院。当天行刮宫术，吸出多量水泡样组织，7天行第2次刮宫术，术后2周尿hCG(-)，血βhCG<3.0U/L。该患者出院后应该何时再复查

A. 1周后

B. 1个月后

C. 3个月后

D. 半年后

E. 1年后

55. 女性，停经90天；近8阴道有少量不规则出血，小腹隐痛。妇科检查见子宫高达脐；未能及胎体。B型超声子宫腔内为落雪状图像。应考虑为下列哪项情况

A. 葡萄胎

B. 羊水过多

C. 先兆流产

D. 子宫肉瘤

E. 子宫肌瘤

56. 患者26岁，不规则阴道出血3个月。妇科检查：子宫如孕3个月大小；左侧可触及7cm大小囊性肿物。彩超提示宫内未见胎儿，见落雪状回声。接下来首先应完善以下哪项检查

A. 盆腔CT检查

B. 血hCG

C. 尿hCG

D. 盆腔MR

E. 颅脑MR

57. 48 岁经产妇，葡萄胎清宫后 8 周，阴道不规则流血 7 日。近 3 周血 hCG 持续上升，入院时为 3500U/L。检查子宫如孕 2 个月大。B 型超声检查见子宫肌层内多个直径 2~3cm 的蜂窝状病灶，双侧附件区阴性。肺 CT 阴性。本例可选择的处理是

- A. 放射治疗
- B. 化放疗
- C. 联合化疗
- D. 子宫全切除术及单药化疗
- E. 随访观察

58. 患者女性，55 岁。绒癌化疗 1 疗程后失访，2 个月后因腹腔内大量出血、子宫穿孔、休克急诊入院。不正确的处理

- A. 纠正休克
- B. 立即联合化疗
- C. 开腹探查，全子宫切除术
- D. 补充血容量和输新鲜血
- E. 双侧子宫动脉栓塞术

59. 28 岁，未婚，闭经 2 年。肛查子宫正常大，行黄体酮试验(-)。下一步最佳检查方法是下列哪项

- A. 垂体兴奋试验
- B. 基础体温测定
- C. 染色体检查
- D. 雌激素试验
- E.  $T_3$ 、 $T_4$ 测定

60. 女，28 岁，结婚 5 年未孕。自月经初潮起即 35~60 天行经一次，毛发浓密，面部痤疮明显，身高 158cm，体重 76kg。最可能的诊断是

- A. Asherman 综合征
- B. 闭经泌乳综合征
- C. 多囊卵巢综合征
- D. 对抗性卵巢综合征
- E. 特纳综合征

61. 女，30岁。月经不规律3年，闭经7个月，溢乳2个月。对诊断最有价值的测定项目是

- A. 孕激素
- B. 雄激素
- C. 泌乳素
- D. 雌激素
- E. 促甲状腺激素

62. 女，36岁，继发性痛经5年，检查见子宫后倾、均匀增大且质硬，本例不可能出现的临床表现为

- A. 不孕
- B. 经量增多
- C. 性交痛
- D. 月经稀发
- E. 经期延长

63. 40岁妇女，月经周期延长，经量增多及经期延长，此次月经量多，持续15天，妇科检查子宫稍大稍软。以下哪种止血措施更为有效

- A. 静脉注射止血
- B. 刮宫术
- C. 口服大量安宫黄体酮
- D. 口服大剂量雌激素
- E. 口服甲基睾丸素



64. 患者，女，38岁。继发性痛经进行性加重5年，月经周期正常，量中等。结婚2年，未避孕未怀孕。妇科检查外阴阴道正常，宫颈光滑，子宫后位，稍大，活动不好。双附件增厚。B超见子宫稍大，肌壁有短线回声，双附件单纯囊肿，与周围组织粘连。该患者的诊断是

- A. 子宫腺肌病
- B. 子宫肌瘤，双卵巢子宫内膜异位囊肿
- C. 卵巢肿物
- D. 子宫腺肌病、双卵巢子宫内膜异位囊肿
- E. 子宫腺肌病、卵巢生理性囊肿

65. 23岁女性，停经48天，阴道流血10天，同月经量，晨起突然下腹痉挛性疼痛伴流血增多，检查发现宫口可通过1指，最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 输卵管妊娠
- C. 痛经
- D. 难免流产
- E. 过期流产

66. 子痫前期重度，血细胞比容0.41，心率80次/分，血红蛋白110g/L，白蛋白28g/L，血钾、钠、氯正常。选用何种扩容剂比较好

- A. 低分子右旋糖酐
- B. 白蛋白
- C. 全血
- D. 平衡液
- E. 5%葡萄糖

67. 25岁已婚妇女，停经48日，阴道流血1日，下腹隐痛5小时。检查：子宫前倾如鹅卵大，宫口闭。对确诊最有价值的检查项目应是

- A. 黄体酮试验
- B. 测量基础体温
- C. 尿妊娠试验
- D. B 型超声检查
- E. 诊断性刮宫

68. 27 岁经产妇，足月妊娠在家自然分娩，胎儿娩出 1 小时后胎盘未娩出而入院。主诉产时顺利，娩出一中等大小男婴，分娩至现在阴道出血量中等。前次妊娠有人工剥离胎盘史。检查：宫底平脐，轮廓清晰，膀胱空虚，宫口可容 3 指，软产道完整，脐带外露，此时最主要的处理

- A. 加强宫缩
- B. B 超检查
- C. 抗感染治疗
- D. 人工剥离胎盘
- E. 导尿

69. 26 岁女性，月经规律。停经 50 天，少量阴道出血 6 天，偶有腹痛。妇科检查：宫颈软，宫体稍大而软，附件无异常。最可能的诊断是

- A. 功能性子宫出血
- B. 子宫肌瘤
- C. 宫外孕
- D. 先兆流产
- E. 子宫内膜炎

70. 26 岁初产妇，妊娠 42 周，规律宫缩 10 小时。检查胎儿较大估计体重 3000g，枕左前位，胎头高浮，胎心率 166 次/分。骨盆不小，宫口开大 2cm，尿雌激素/肌酐比值为 7。本例恰当的分娩方式应是

- A. 静脉滴注缩宫素加速产程
- B. 等待宫口开全行产钳术助娩

C. 等待宫口开全行胎头吸引术助娩

D. 左侧卧位，吸氧，静注 10%葡萄糖液

E. 尽快行剖宫产术

71. 28 岁妇女，停经 56 天，阴道中等量流血两日，伴阵发性下腹痛。查：子宫稍大，宫口可通过 1 指，见组织物阻塞宫口。本例恰当处理是

A. 测尿 hCG 值

B. 肌内注射黄体酮 20mg

C. 立即输液输血

D. 紧急做凝血功能检查

E. 立即行吸宫术

72. 女，37 岁，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>。停经 3 个月，既往曾诊为先天性心脏病，室间隔缺损，能胜任日常工作。此病人以何种方式结束分娩最好

A. 维持至孕足月，阴道分娩

B. 维持至孕 36 周，静点缩宫素阴道分娩

C. 根据孕晚期心功能状况，决定分娩方式

D. 维持至孕足月，剖宫产分娩

E. 维持至孕 36 周

73. 初孕 33 岁，妊 40 周。足先露，宫缩 50s/3~4min。胎心 148 次/min，先露浮。宫口 3cm，胎儿双顶径 10cm，测对角径长 11cm。最恰当的处理是

A. 静脉滴入稀释催产素

B. 葡萄糖静注

C. 宫口开全臀助产术

D. 宫口开全臀牵引术

E. 剖宫产

74. 26 岁经产妇，妊娠 38 周，肩左前位，胎膜刚破，宫口开大 9cm，胎心 140 次/min，未见病理缩复环。此时最恰当的处理应是

- A. 立即行剖宫产术
- B. 乙醚深麻醉下行内转胎位术
- C. 在全麻下行断头术
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 静注地西洋

75. 中度妊娠高血压疾病孕妇，26 岁，妊娠 38 周，因胎膜早破入院，入院时血压 21.3/14.6kPa(160/110mmHg)，尿蛋白 (+)，宫缩强，总产程 2 小时 50 分钟。产后检查胎盘胎膜完整，阴道与宫颈裂伤处经修补阴道内仍有阵阵暗红色血流出伴有血块，子宫时软时硬，失血量已超过 300ml。此产妇产后出血原因可能是

- A. 产道损伤
- B. 凝血功能障碍
- C. 胎盘残留
- D. 子宫收缩不良
- E. 胎盘滞留

76. 某产妇产后阴道流血较多，查子宫轮廓不清，按压宫底后见大量血块及暗红色血液流出。此时该产妇产后出血最可能的原因为

- A. 胎盘残留
- B. 产道损伤
- C. 子宫收缩乏力
- D. 凝血功能紊乱
- E. 羊水栓塞

77. 患者, 女, 27 岁, 人工流产后 5 日出现发热, 体温 38℃。查体: 外阴(-), 阴道内少许血性分泌物, 子宫颈充血, 子宫正常大, 压痛明显。双侧附件区未触及明显增厚, 无压痛。应首先考虑为

- A. 盆腔腹膜炎
- B. 不全流产
- C. 输卵管卵巢炎
- D. 子宫内膜炎及子宫肌炎
- E. 吸宫不全

78. 女性, 62 岁。未孕, 绝经 6 年, 少量阴道流血 2 周。妇科检查: 宫颈正常, 子宫如妊娠 6 周大, 稍软, 双附件正常。本例确诊方法是

- A. B 超
- B. 腹腔镜
- C. 宫颈刮片
- D. 分段诊刮
- E. 血清肿瘤标志物检查

79. 20 岁已婚妇女, 停经 60 日, 阴道不规则流血 10 日。妇科检查: 子宫如孕 3 个月大, 软, 双侧附件区触及手拳大囊性肿物, 活动良好。最合适的检查方法是

- A. 盆腔 X 线摄片和血 hCG 测定
- B. 盆腔 CT 检查和血 hCG 测定
- C. 盆腔磁共振检查和血 hCG 测定
- D. 盆腔 PET 检查和血 hCG 测定
- E. 盆腔 B 型超声检查和血 hCG 测定

80. 36 岁已婚妇女, 闭经 8 个月。查子宫稍小。肌内注射黄体酮 20mg 连用 3 日, 未见撤药性流血, 再给予己烯雌酚 1mg 连服 20 日, 后 3 天加用甲羟黄体酮 10mg, 出现撤药性流血。本例应诊断为

- A. 子宫性闭经
- B. I 度闭经
- C. II 度闭经
- D. 垂体性闭经
- E. 下丘脑性闭经

81. 28 岁女性，结婚 4 年不孕，月经规律，量中等，痛经 2 年，需服镇痛药物。末次月经近干净时突然发生剧烈性下腹痛就诊。妇科检查：子宫后位稍大活动欠佳，双侧卵巢增大约  $6\text{cm} \times 4\text{cm} \times 4\text{cm}$  大小，右侧宫骶韧带可触及 2 个黄豆大小硬结，有触痛。本例应首先考虑

- A. 肿物蒂扭转
- B. 巧克力囊肿破裂
- C. 并发急性盆腔炎
- D. 异位妊娠
- E. 痛经

82. 25 岁女性，已婚，结婚 3 年未孕。现停经 55 日。查子宫与停经日数相符，质软。左附件区触及直径约 12cm、表面光滑、壁厚质韧肿物，活动良好。B 型超声提示肿物包膜完整，厚度较均匀，瘤内回声多样化，可见面团征。尿妊娠试验阳性。对该肿物恰当的处理应是

- A. 立即行人工流产术，观察附件肿物是否增大
- B. 妊娠 12 周后行剖腹手术切除肿物
- C. 妊娠 24 周后行剖腹手术切除肿物
- D. 立即行剖腹手术切除肿物
- E. 待产后切除附件区肿物

83. 患者，女，28 岁。主诉停经 8 周，感觉疲乏，乳房触痛明显。患者平素月经规律，3~4 天/28 天。若考虑怀孕，除以上体征外，此时常见的临床表现是

- A. 妊娠纹

- B. 胎动感
- C. 恶心
- D. 妊娠斑
- E. 以上均是

84. 患者，女，28岁。G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，合并先天性心脏病，胎儿娩出后应立即采取的措施是

- A. 腹部放置沙袋
- B. 静注麦角新碱
- C. 鼓励下床活动
- D. 抗感染
- E. 行绝育手术

85. 32岁初产妇，妊娠35周，既往产检无发现妊娠合并症及并发症，今日出现少量阴道流血，无明显下腹痛。体检：宫底高31cm，LOA，胎心率：150次/min，无宫缩，无阴道流液，宫口未开，一般情况好。恰当的处理是

- A. 静脉点滴宫缩抑制剂安胎
- B. 人工破膜
- C. 静脉点滴催产素
- D. 密切监测胎儿情况，无需特殊处理
- E. 肌内注射地塞米松促胎肺成熟

三、B

- A. 阿奇霉素
- B. 螺旋霉素
- C. 阿昔洛韦
- D. 三氯醋酸
- E. 头孢曲松钠治疗

86. 淋病应给予



87. 尖锐湿疣应给予

88. 生殖器疱疹应给予

89. 沙眼衣原体感染应给予

90. 弓形虫病应给予

A. 髂嵴上 2 横指

B. 髂嵴下 2 横指

C. 髂嵴水平

D. 右髂前上棘至脐连线中外 1/3 处

E. 胆囊区

91. 妊娠 12 周阑尾位置为

92. 妊娠 40 周阑尾位置为

93. 产后 15 天阑尾位置为

A. 禁食无脂肪食物

B. 内科药物治疗，包括解痉、镇痛、抗炎

C. 尽可能切除胆囊

D. 胆囊造口引流术

E. 尽可能切除胆囊并行胆管探查术，内科药物治疗，病情缓解后行胆囊切除术

94. 妊娠 24 周，第一胎，诊断妊娠期胆囊炎，第一次发作，病情较轻，治疗方案为

95. 如果内科药物治疗有效，但间断发作，可以选择外科治疗，术中应

96. 如果胆囊切除困难，应行

A. 口服叶酸

B. 口服硫酸亚铁

C. 肌内注射右旋糖酐铁

D. 少量多次输血

E. 肌内注射维生素 B<sub>12</sub>



97. 患者，女，26岁，孕39周，合并中度贫血，对该患者的首选处理方式是
98. 患者，女，28岁，孕32周，自觉头晕、乏力及食欲差半个月。查体：胎位、胎心及骨盆外测量均正常，血红蛋白80g/L，血细胞比容25%，对该患者的处理方式是
- A. 11~12小时
- B. 6~8小时
- C. 2~3小时
- D. 1~2小时
- E. 5~15分钟
99. 初产妇第一产程约需
100. 初产妇的第三产程约需

## 2022年妇产科主治医师《相关专业知识》考前模考大赛（二）答案解析

### 一、A1

1. 【正确答案】 D

【答案解析】 痛经患者口服避孕药治疗，其目的是为了抑制排卵，缺乏黄体，从而使月经前列腺素浓度降低，降低子宫肌张力，缓解痛经。

2. 【正确答案】 D

【答案解析】 排卵型功能性出血的治疗为：下次月经前10~14日开始，每日口服甲羟孕酮10mg。作用是调节下丘脑-垂体-卵巢轴的功能，使黄体及时萎缩，内膜及时完整脱落。还可促卵泡发育和排卵，以利于正常黄体的形成。基础体温上升后3天起注射hCG 2000~3000U肌注，隔日一次，共5次，有刺激及维持黄体功能的作用。

3. 【正确答案】 A

【答案解析】 子宫内膜异位性疾病包括子宫内膜异位症和子宫腺肌病，两者均由具有生长功能的异位子宫内膜所致，临床上常可并存。但两者的发病机制及

组织发生学不尽相同，临床表现及其对卵巢激素的敏感性亦有差异，前者对孕激素敏感，后者不敏感。

4. 【正确答案】 C

【答案解析】 痛经和持续下腹痛：继发性痛经是子宫内膜异位症的典型症状，且多随局部病变加重而逐年加剧。疼痛多位于下腹部及腰骶部，可放射至会阴部、肛门或大腿，常于月经来潮前1~2日开始，经期第一日最剧，以后逐渐减轻，至月经干净时消失。疼痛的程度与病灶大小并不一定成正比。病变严重者如较大的卵巢子宫内膜异位囊肿可能疼痛较轻，而散在的盆腔腹膜小结节病灶反可导致剧烈痛经。偶有周期性腹痛出现稍晚而与月经不同步者。少数晚期患者诉长期下腹痛，至经期更剧。疼痛程度与AFS分期不一致。

5. 【正确答案】 D

【答案解析】 进行性痛经病人出现肾积水最可能的原因是内异症。异位病灶侵犯和（或）压迫输尿管时，引起输尿管狭窄、阻塞，出现腰痛和血尿，甚至形成肾积水和继发性肾萎缩。

6. 【正确答案】 C

【答案解析】 子宫内膜异位症的发生与雌激素有关，但雌激素不是诊断子宫内膜异位症的因素，腹腔镜检查是目前诊断子宫内膜异位症的最佳方法。超声检查和血清CA125测定可以起到辅助诊断的作用。

7. 【正确答案】 B

【答案解析】 继发性痛经是子宫内膜异位症的典型症状，主要原因包括卵巢子宫内膜异位囊肿破裂刺激腹膜；腹膜粘连刺激神经；子宫内膜异位症病灶位于宫骶韧带以及盆腔神经走行引起的疼痛。

8. 【正确答案】 B

【答案解析】 关于子宫内膜异位症发病机制主要是种植学说。

9. 【正确答案】 E

【答案解析】 疼痛程度与病灶大小不成比例。

10. 【正确答案】 D

【答案解析】 达那唑无致畸作用，但停药后 4~6 周恢复月经，子宫内膜的恢复还不健全，最好恢复 2 次月经后再考虑受孕。

11. 【正确答案】 A

【答案解析】 子宫内膜异位症的临床表现为继发性痛经，进行性加重，疼痛部位多在下腹及腰骶部。可放射至阴道、会阴、肛门或大腿，于月经来潮前 1~2 天开始，经期第 1 天最剧，以后逐渐减轻，至月经干净时消失。经量增多或经期延长。还可因输卵管粘连、闭锁、蠕动减弱引起不孕。

12. 【正确答案】 D

【答案解析】 盆腔因素占不孕不育症病因的 35%。其中生殖道发育畸形包括子宫畸形、先天性输卵管发育异常等，可能引起不孕和流产。

13. 【正确答案】 E

【答案解析】 结肠炎不影响输卵管，其他均可以影响输卵管，所以选 E。

14. 【正确答案】 E

【答案解析】 FGR 的准确诊断，应基于准确核对孕周，包括核实母亲月经史、相关的辅助生殖技术的信息，以及早孕或中孕早期的超声检查。根据各项衡量胎儿生长发育指标及其动态情况，结合子宫胎盘的灌注情况及孕妇的产前检查结果，尽早诊断 FGR。测量子宫底高度，推测胎儿大小，简单易行，可用于低危人群的筛查。子宫底高度连续 3 周测量均在第 10 百分位数以下者，为筛选 FGR 指标，预测准确率达 13%~86%。妊娠 26 周后宫高测量值低于对应标准 3cm 以上，应疑诊 FGR；宫高低于对应标准 4cm 以上，应高度怀疑 FGR。

15. 【正确答案】 E

【答案解析】 胎膜完整早产为最常见类型，约占 45%。发生的机制主要为：①宫腔过度扩张，如双胎或多胎妊娠、羊水过多等；②母胎应激反应，由于孕妇精神、心理压力过大，导致胎盘-胎儿肾上腺-内分泌轴紊乱，过早、过多分泌促肾上腺皮质激素释放激素（CRH）和雌激素，使宫颈过早成熟并诱发宫缩；③宫内感染，最常见的病原体有阴道加德纳菌、梭形杆菌、人型支原体、解脲支原体等。

胎膜早破早产病因及高危因素包括：PPROM 史、体重指数 $<19.0$ 、营养不良、吸烟、宫颈机能不全、子宫畸形（如纵隔子宫、单角子宫、双角子宫等）、宫内感染、细菌性阴道病、子宫过度膨胀、辅助生殖技术受孕等。

16. 【正确答案】 E

【答案解析】 常用的宫缩抑制剂如下：钙通道阻滞剂（硝苯地平），前列腺素合成酶抑制剂（吲哚美辛）， $\beta$ -肾上腺素能受体激动剂（利托君），阿托西班，硫酸镁。排除法选 E。

17. 【正确答案】 E

【答案解析】 一旦妊娠过期，则应终止妊娠。过期妊娠时，胎盘功能减退，胎儿储备能力下降，需适当放宽剖宫产指征。无应激试验（NST）和缩宫素激惹试验（OCT）用于预测胎儿宫内储备能力。胎动计数 $<10$ 次/2小时或减少 50%者提示有胎儿缺氧可能。OCT 阴性：没有晚期减速或重度变异减速。无应激试验为有反应型属正常反应。24 小时尿雌三醇 $>15\text{mg}$  为正常值， $10\sim 15\text{mg}$  为警戒值， $<10\text{mg}$  为危险值。也可测尿雌激素/肌酐比值， $>15$  为正常值， $10\sim 15$  为警戒值， $<10$  为危险值。测游离雌三醇值，正常足月妊娠时临界值为  $40\text{mmol/L}$ ，低于此值提示胎盘功能低下。

18. 【正确答案】 C

【答案解析】 胎膜完整早产为最常见类型，约占 45%。发生的机制主要为：①宫腔过度扩张，如双胎或多胎妊娠、羊水过多等；②母胎应激反应，由于孕妇精神、心理压力过大，导致胎盘-胎儿肾上腺-内分泌轴紊乱，过早、过多分泌促肾上腺皮质激素释放激素（CRH）和雌激素，使宫颈过早成熟并诱发宫缩；③宫内感染，最常见的病原体有阴道加德纳菌、梭形杆菌、人型支原体、解脲支原体等。

胎膜早破早产病因及高危因素包括：PPROM 史、体重指数 $<19.0$ 、营养不良、吸烟、宫颈机能不全、子宫畸形（如纵隔子宫、单角子宫、双角子宫等）、宫内感染、细菌性阴道病、子宫过度膨胀、辅助生殖技术受孕等。

19. 【正确答案】 D

【答案解析】 常用的宫缩抑制剂如下：钙通道阻滞剂（硝苯地平），前列腺素合成酶抑制剂（吲哚美辛）， $\beta$ -肾上腺素能受体激动剂（利托君、沙丁胺醇），阿托西班，硫酸镁。排除法选 D。地塞米松可促进胎儿肺成熟，可用于早产的治疗。

20. 【正确答案】 C

【答案解析】 早产指妊娠达到 28 周但不足 37 周分娩者。先兆早产指有规则或不规则宫缩，伴有宫颈管进行性缩短。早产临产需符合下列条件：①出现规则宫缩（20 分钟 $\geq 4$  次，或 60 分钟 $\geq 8$  次），伴有宫颈的进行性改变；②宫颈扩张 1cm 以上；③宫颈容受 $\geq 80\%$ 。

21. 【正确答案】 E

【答案解析】 胚胎或胎儿染色体异常是早期流产最常见的原因。生殖器异常：子宫畸形（如子宫发育不良、双子宫、双角子宫、单角子宫、纵隔子宫等）、子宫肌瘤（如黏膜下肌瘤及某些肌壁间肌瘤）、子宫腺肌病、宫腔粘连等，均可影响胚胎着床发育而导致流产。宫颈重度裂伤、宫颈部分或全部切除术后、宫颈内口松弛等所致的宫颈机能不全，可导致胎膜早破而发生晚期流产。内分



泌异常：女性内分泌功能异常（如黄体功能不全、高催乳素血症、多囊卵巢综合征等），甲状腺功能减退，糖尿病血糖控制不良等，均可导致流产。

22. 【正确答案】 A

【答案解析】 分娩期为心脏负担最重的时期。子宫收缩使孕妇动脉压与子宫内压之间压力差减小，且每次宫缩时有 250~500ml 液体被挤入体循环，增加了全身血容量；每次宫缩时心排血量约增加 24%，同时有血压增高、脉压增宽及中心静脉压升高。第二产程时由于孕妇屏气，先天性心脏病孕妇有时可因肺循环压力增加，使原来左向右分流转为右向左分流而出现发绀。胎儿胎盘娩出后，子宫突然缩小，胎盘循环停止，回心血量增加。加之腹腔内压骤减，大量血液向内脏灌注，造成血流动力学急剧变化。此时，患心脏病孕妇极易发生心力衰竭。

23. 【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠期、产褥期肝脏结构、功能均发生变化并不增加肝脏对肝炎病毒的易感性，但由于妊娠期、产褥期的生理变化，可加重病情。妊娠对肝炎的影响——妊娠加重肝脏负担，易导致重症肝炎（10 倍）病毒性肝炎对妊娠的影响：①早期可使早孕反应加重，流产、胎儿畸形发生率高 2 倍；②中晚期可导致 PIH、肝性脑病、早产、死胎、垂直传播、DIC 等；③分娩期可因凝血因子合成减少而导致产后出血。

24. 【正确答案】 E

【答案解析】 肺结核对妊娠的影响肺结核患者除非同时有生殖器结核，一般不影响受孕。一般认为，非活动性结核或病变范围不大、肺功能无改变者，对妊娠经过和胎儿发育多无大影响。而活动性肺结核的妇女发生流产、胎死宫内、早产、低体重儿的可能性增大。结核病的治疗药物可能对母儿有不良作用。孕妇可在产前、产时及产后将结核菌传给下一代。活动性肺结核未经治疗的母亲，其新生儿在生后第一年有 50% 感染的可能性。因此，产后需隔离新生儿。

25. 【正确答案】 E

【答案解析】 急性肾盂肾炎与妊娠的相互影响。妊娠后患急性肾盂肾炎的危险增加；残余尿增多，为细菌在膀胱的繁殖创造了条件；增大的子宫压迫输尿管，形成机械性梗阻，易造成排尿不畅、尿潴留或尿液反流；妊娠期常有生理性糖尿，有利于细菌生长。致病菌以大肠埃希菌最多见。临床上起病急骤，突然出现高热、寒战，体温有时可高达 40℃。伴有头痛、周身酸痛、恶心及腰痛，出现尿频、尿急、尿痛、排尿未尽感等膀胱刺激症状。排尿时常有下腹部疼痛。患急性肾盂肾炎孕妇中有 3% 可发生中毒性休克。高热可引起流产、早产。若在妊娠早期，高热还可使胎儿神经管发育异常，无脑儿发病率明显增高。

26. 【正确答案】 D

【答案解析】 活动性肺结核未经治疗的母亲，其新生儿在生后第一年有 50% 感染的可能性。因此，产后需隔离新生儿并接种卡介苗。

27. 【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠期糖尿病产后处理：大部分 GDM 患者在分娩后即不再需要使用胰岛素，仅少数患者仍需胰岛素治疗。胰岛素用量应减少至分娩前的 1/3~1/2，并根据产后空腹血糖值调整用量。产后 6~12 周行 OGTT 检查，若仍异常，可能为产前漏诊的糖尿病患者。

28. 【正确答案】 E

【答案解析】 妊娠期及产褥期并发急性肾盂肾炎单侧时以右侧多见，发病率约占 2%，症状包括厌食、恶心、呕吐等，主要致病菌是大肠埃希菌。

29. 【正确答案】 C

【答案解析】 （1）推荐医疗机构对所有尚未被诊断为 PGDM 或 GDM 的孕妇，在妊娠 24~28 周及 28 周后首次就诊时行 75g OGTT。75g OGTT 的诊断标准：空腹及服糖后 1 小时、2 小时的血糖值分别低于 5.1mmol/L，10.0mmol/L、8.5mmol/L。任何一点血糖值达到或超过上述标准即诊断为 GDM。（2）孕妇具

有GDM高危因素或者医疗资源缺乏地区，建议妊娠24~28周首先检查FPG。

FPG $\geq$ 5.1mmol/L，可以直接诊断为GDM，不必行75g OGTT。

30. 【正确答案】 B

【答案解析】 急性盆腔腹膜炎应采取的体位是半卧位。

31. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性盆腔结缔组织炎最常见的病变部位在子宫旁结缔组织。

32. 【正确答案】 C

【答案解析】 膀胱膨出与直肠膨出的主要原因是分娩损伤，产褥期过早参加体力劳动。

33. 【正确答案】 C

【答案解析】 阴道前壁完全膨出于阴道口外为阴道前壁Ⅲ度脱垂。

34. 【正确答案】 E

【答案解析】 粪瘘均需要手术治疗，手术损伤立即修补，压迫坏死性粪瘘待3~6个月再行手术治疗，高位巨大直肠阴道瘘合并尿瘘或者前次手术失败者，先行暂时性乙状结肠造瘘，1个月后再进行修补。

35. 【正确答案】 B

【答案解析】 妇科手术中输尿管缺血损伤引起的输尿管阴道瘘，不可以立即修补。

36. 【正确答案】 B

【答案解析】 妇科手术中剥离过度引起的缺血坏死型尿瘘产生漏尿的时间是术后3~7天。



37. 【正确答案】 D

【答案解析】 为了解膀胱瘘孔位置和数目及输尿管阴道瘘位于何侧，选择静脉肾盂造影。

38. 【正确答案】 B

【答案解析】 不孕的原因男方、女方均有。

39. 【正确答案】 D

【答案解析】 进行性交后精子穿透力试验时，试验前3天内禁止性交。

40. 【正确答案】 A

【答案解析】 在我国，因输卵管梗阻导致不孕的常见原因是输卵管炎症。

41. 【正确答案】 D

【答案解析】 黄体功能不足、卵泡期过长选用 hCG。

42. 【正确答案】 C

【答案解析】 为诱发排卵，首选克罗米芬为宜。

43. 【正确答案】 C

【答案解析】 卵子及精子能够在输卵管壶腹部相遇结合成为受精卵。

44. 【正确答案】 E

【答案解析】 临产的重要标志为有规律且逐渐增强的子宫收缩，持续30秒或以上，间歇5~6分钟，同时伴随进行性宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降。

45. 【正确答案】 D

【答案解析】 输卵管妊娠的治疗原则是以手术为主，酌情应用保守治疗。如有休克，应在积极抢救休克的同时进行急诊手术。

46. 【正确答案】 E

【答案解析】 产后轻型子宫内膜炎的表现主要就是下腹部非常轻微的隐痛，同时可以出现白带增多、白带污浊，甚至有白带的发黄、有味道、有臭味，有的时候也有可能是脓性的白带，一般不会出现体温 39℃ 以上。

47. 【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠滋养细胞疾病分为葡萄胎、侵蚀性葡萄胎、绒毛膜癌和胎盘部位滋养细胞肿瘤。

48. 【正确答案】 E

【答案解析】 滴虫性阴道炎的临床表现是阴道黏膜发炎，呈鲜红色，上覆斑片状假膜，常伴泡沫样分泌物，自觉不同程度瘙痒，少数有灼热感。白带呈灰黄泡沫状，外阴瘙痒。

49. 【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠合并心脏病孕妇的高危时期是妊娠 32~34 周。

50. 【正确答案】 E

【答案解析】 妊娠合并再障的分娩时有剖宫产术指征者，可采用手术止血措施，以减少产后出血。

二、A2

51. 【正确答案】 C

【答案解析】 该患者最后诊断子宫内膜癌 I 期，并且没有行盆腔及腹主动脉旁淋巴结取样和（或）清扫术的指征，故不需其他手术处理。

52. 【正确答案】 A

【答案解析】 年轻或渴望生育的子宫内膜不典型增生患者，可试用大剂量高效孕激素治疗 3 个月/12 周，然后再次诊刮，病理评估内膜是否被逆转，最好结合 ER、PR 的检查。

53. 【正确答案】 C

【答案解析】 子宫肌瘤常见于 40~50 女性，主要表现为月经量增多，导致贫血，子宫增大。

54. 【正确答案】 A

【答案解析】 考察葡萄胎的随访时间，葡萄胎清宫术后每周复查 hCG，直到 hCG 连续 3 次阴性，以后每个月一次共 6 个月，然后每 2 个月一次共 6 个月，自第一次阴性后共计 1 年。

55. 【正确答案】 A

【答案解析】 停经后阴道流血，不能触及胎体，结合 B 超结果，最符合葡萄胎的特点。

56. 【正确答案】 B

【答案解析】 子宫增大，但彩超内未见胎儿，见落雪状回声，需完善血 hCG 检查。

57. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据滋养细胞肿瘤解剖学分期，病变仅局限于子宫，属于 I 期，患者 48 岁绝经无生育要求，可以选择子宫全切除及单药化疗。

58. 【正确答案】 B

【答案解析】 目前患者处于休克，应首先进行抗休克治疗，不是选择立即化疗。

59. 【正确答案】 D

【答案解析】 考虑患者子宫性闭经的可能性最大。雌激素试验证明是否为子宫性闭经。

60. 【正确答案】 C

【答案解析】 患者典型的外貌特征：肥胖、毛发浓密、痤疮、不孕、月经失调，因此首先考虑的诊断多囊卵巢综合征。

61. 【正确答案】 C

【答案解析】 患者闭经、溢乳，首先考虑测定泌乳素水平。

62. 【正确答案】 D

【答案解析】 继发性痛经在初潮后数年才出现，多有月经过多、不孕、放置宫内节育器或盆腔炎病史，妇科检查易发现引起痛经的器质性病变，腹腔镜检查是最有价值的辅助诊断方法。

63. 【正确答案】 B

【答案解析】 对大量出血者，要求6小时内明显见效，24~48小时内血止。宜住院行诊断性刮宫，刮出物送病检，既达到止血目的，又能明确诊断。

64. 【正确答案】 D

【答案解析】 结合病史，患者继发性痛经，继发不孕，查体及辅助检查支持卵巢子宫内膜异位囊肿和子宫腺肌病诊断。

65. 【正确答案】 D

【答案解析】 腹痛伴阴道流血，宫口已经开放，考虑为难免流产。

66. 【正确答案】 B

【答案解析】 本题主要异常是白蛋白下降，所以扩容剂选白蛋白就可以。

67. 【正确答案】 D

【答案解析】 确诊早孕，最有价值的检查项目是B超。因为超声不仅能确定是否怀孕，还可以确定是宫内孕还是宫外孕。

68. 【正确答案】 D

【答案解析】 胎儿娩出后超过30分钟，胎盘仍不能自行剥离，伴或不伴阴道流血，行徒手取胎盘。

69. 【正确答案】 D

【答案解析】 停经、腹痛、阴道流血，提示先兆流产可能性大。功血一般没有腹痛、子宫肌瘤一般不会腹痛，宫外孕的话附件会有异常，子宫内膜炎应该有感染的表现。所以本题选D。

70. 【正确答案】 E

【答案解析】 尿雌激素/肌酐比值， $>15$ 为正常值， $10\sim15$ 为警戒值， $<10$ 为危险值。本题为7提示胎盘功能低下，需尽快终止妊娠，目前宫口只开2cm，经阴道分娩较慢。所以选剖宫产。

71. 【正确答案】 E

【答案解析】 本题考虑为流产，且有组织物阻塞宫口，宫口开1指，子宫稍大，提示为难免流产。所以恰当的处理是清宫或吸宫。

72. 【正确答案】 C

【答案解析】 产妇高龄初产，既往有先心病史，孕前及孕早期心功能尚好，但在孕34周左右心脏负担达到高峰，分娩方式应根据孕晚期心功能状况决定。

73. 【正确答案】 E

【答案解析】 患者为高龄初产；胎位异常（足先露易发生脐带脱垂）；胎儿双顶径10cm提示为巨大儿；角径长11cm（ $<11.5\text{cm}$ ）提示为扁平骨盆；“宫缩

50秒/3~4分宫口3cm”示处于第一产程的潜伏期。再根据“先露浮”进行综合分析，可知该患者最恰当处理是剖宫产。

74. 【正确答案】 B

【答案解析】 因破膜不久，羊水尚未流尽，宫口已开大9cm，可在乙醚深麻醉下行内转胎位术，转成臀先露，待宫口开全助娩。

75. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据题干信息，此产妇产后出血最可能的原因是子宫收缩不良。产道损伤的特点是胎儿娩出后立即出现阴道流血，色鲜红；凝血功能障碍时，表现为持续性阴道流血，血液不凝固；根据“产后检查胎盘胎膜完整”也可排除“胎盘残留和胎盘滞留”。

76. 【正确答案】 C

【答案解析】 子宫收缩乏力时，宫底升高，子宫质软、轮廓不清，阴道流血多。

77. 【正确答案】 D

【答案解析】 患者有宫腔操作史，有诱发盆腔炎性疾病的高危因素，子宫颈充血，子宫压痛明显，加上发热，提示有盆腔炎性疾病的可能性。查体附件区无阳性发现，提示无输卵管卵巢炎，子宫颈无举痛，提示无腹膜刺激征，故子宫内膜炎及子宫肌炎可能性大。若为不全流产，阴道流血较多，查体子宫往往较大，若未合并感染，压痛不明显，超声检查能进一步排除诊断。

78. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据“绝经后阴道流血，宫颈正常，子宫如妊娠6周大，稍软，双附件正常”，应首先考虑到子宫内膜癌的可能，分段诊刮是确诊内膜癌最常用、最可靠的方法。

79. 【正确答案】 E

【答案解析】 根据病史需考虑葡萄胎，诊断葡萄胎最可靠的检查方法是盆腔B型超声检查结合血hCG测定。其余影像学检查均不是首选的方法。

80. 【正确答案】 C

【答案解析】 根据孕激素（黄体酮）试验阴性（未见撤药性流血），可排除I度闭经；而进一步的雌、孕激素序贯试验阳性（出现撤药性流血），说明该患者的闭经为II度闭经，闭经原因不在子宫。

81. 【正确答案】 B

【答案解析】 不孕、痛经、急性剧烈性下腹痛、双侧卵巢增大、右侧宫骶韧带触及硬结触痛结节，是子宫内膜异位症的典型症状与体征。

82. 【正确答案】 B

【答案解析】 本例肿物最大可能是卵巢成熟畸胎瘤。卵巢妊娠黄体功能于妊娠10周后则由胎盘取代，故应在妊娠12周后手术。

83. 【正确答案】 C

【答案解析】 患者停经8周，若考虑怀孕，则处于孕早期，常见的临床表现有停经、早孕反应、尿频、乳房轻度胀痛、乳头刺痛、子宫增大变软等。

84. 【正确答案】 A

【答案解析】 先心病患者产后立即放置沙袋，防止腹压骤减，回心血量增多，增加心脏负荷。

85. 【正确答案】 D

【答案解析】 本例患者出现先兆早产症状，但由于已超过34周，应顺其自然，不必干预，只需密切监测胎儿情况即可。

三、B



86. 【正确答案】 E

【答案解析】 淋病治疗以及时、足量、规范化用药为原则。为提高疗效和减少耐药性，推荐联合使用头孢菌素和阿奇霉素。首选头孢曲松钠。

87. 【正确答案】 D

【答案解析】 尖锐湿疣治疗主要目的是缓解症状。外阴较小病灶，用 80%~90%三氯醋酸涂擦局部，每周 1 次。

88. 【正确答案】 C

【答案解析】 生殖器疱疹治疗原则是减轻症状，缩短病程，减少 HSV 排放，控制其传染性。妊娠早期应用阿昔洛韦，除短暂中性粒细胞减少症外，未发现对胎儿或新生儿的其他副作用。

89. 【正确答案】 A

【答案解析】 沙眼衣原体感染妊娠期感染首选阿奇霉素 1g 顿服，或阿莫西林 500mg 口服，每日 3 次，连用 7 日，不推荐使用红霉素。孕妇禁用多西环素、喹诺酮类和四环素。性伴侣应同时治疗。治疗 3~4 周后复查 CT。

90. 【正确答案】 B

【答案解析】 弓形虫病妊娠早期急性感染的孕妇，给予乙酰螺旋霉素每日 3g 口服，治疗 7~10 日。

91. 【正确答案】 B

92. 【正确答案】 E

93. 【正确答案】 D



【答案解析】 妊娠初期阑尾的位置与非孕期相似，其根部在右髂前上棘至脐连线中外 1/3 处。随妊娠周数增加，盲肠和阑尾的位置向上、向外、向后移位。妊娠 3 个月末位于髂嵴下 2 横指，妊娠 5 个月末达髂嵴水平，妊娠 8 个月末上升至髂嵴上 2 横指，妊娠足月可达胆囊区。盲肠和阑尾在向上移位的同时，阑尾呈逆时针方向旋转，一部分被增大子宫覆盖。产后 14 天恢复到非孕时的位置。

94. 【正确答案】 B

【答案解析】 妊娠期胆囊炎，第一次发作，且症状比较轻，选择保守治疗。选 B。

95. 【正确答案】 C

【答案解析】 反复发作的妊娠合并急性胆囊炎，选择择期手术治疗，术中尽量切除胆囊。

96. 【正确答案】 D

【答案解析】 如果胆囊切除困难，应行胆囊造口引流。缓解症状。

97. 【正确答案】 D

【答案解析】 孕妇合并缺铁性贫血时，应多食富含铁的食物，如瘦肉、家禽、动物肝脏及绿叶蔬菜等。铁剂的补充应首选口服制剂，补充铁剂的同时服维生素 C 及稀盐酸可促进铁的吸收。如血红蛋白  $< 60\text{g/L}$ ，接近预产期或短期内行剖宫产术者，宜少量多次输血，同时积极预防产后出血和产褥感染。

98. 【正确答案】 B

【答案解析】 孕妇合并缺铁性贫血时，应多食富含铁的食物，如瘦肉、家禽、动物肝脏及绿叶蔬菜等。铁剂的补充应首选口服制剂，补充铁剂的同时服维生素 C 及稀盐酸可促进铁的吸收。如血红蛋白 $<60\text{g/L}$ ，接近预产期或短期内行剖宫产术者，宜少量多次输血，同时积极预防产后出血和产褥感染。

99. 【正确答案】 A

【答案解析】 第一产程指临产开始直至宫口完全扩张即开全（10cm）为止。初产妇的宫颈较紧，宫口扩张缓慢，需 11~12 小时；经产妇宫颈较松，宫口扩张较快，需 6~8 小时。

100. 【正确答案】 E

【答案解析】 初产妇的第三产程约需 5~15 分钟。