

全科主治医师《专业实践能力》模考试卷

一、案例分析题

女性，31岁，G<sub>1</sub>P<sub>1</sub>，因“继发不孕2年”就诊，患者12岁月经初潮，周期28天，否认性传播疾病史，查体：子宫大小形态正常，宫骶韧带触痛结节。基础体温双相型，HSG示输卵管走行、弥散可，宫腔正常，男方34岁，精液分析正常。

1. 该例不孕最可能的原因是

- A. 子宫腺肌病
- B. 子宫内膜异位症
- C. 原因不明性不孕
- D. 多囊卵巢综合征
- E. 高雄激素血症
- F. 全身性疾病

2. 确诊最好的检查方法是

- A. 超声检查
- B. 基础内分泌检查
- C. 男方内分泌检查
- D. 宫腔镜检查
- E. 腹腔镜检查
- F. 男方超声检查
- G. CA125
- H. CEA
- I. AFP

3. 该例患者以下哪项检查可能有异常

- A. FSH
- B. LH

- C. E2
- D. PRL
- E. T0
- F. LH/FSH
- G. CA125
- H. CEA
- I. AFP

4. 该例还可能有以下哪些表现不包括

- A. 痛经
- B. 性交痛
- C. 大便疼痛
- D. 子宫后位、固定
- E. 卵巢囊肿
- F. 肥胖

5. 该例不孕的机制可能是

- A. 子宫、输卵管、卵巢粘连，影响卵子的排出、捡拾以及精子和受精卵的：运行而导致不孕
- B. 黄体功能不全
- C. 卵泡黄素化未破裂综合征
- D. 宫颈黏液性状改变
- E. 细胞或体液免疫功能异常
- F. 卵巢功能下降
- G. 高雄激素血症

6. 以下哪些药物治疗该病有效

- A. 抗生素

- B. 二甲双胍
- C. 孕三烯酮
- D. 达那唑
- E. 戈舍瑞林
- F. 去氧孕烯炔雌醇
- G. 米非司酮
- H. 雌激素
- I. 人工周期

7. 有关该例不孕的治疗，哪些正确

- A. 腹腔镜检查+治疗有效
- B. 术后尽快妊娠
- C. 病灶未切净，术后可辅助药物治疗后再妊娠
- D. 术后应避孕半年，促进刀口愈合
- E. 术后 2 年未孕，应积极采用辅助生育技术
- F. 术后采用辅助生育技术不能提高妊娠率
- G. 可采用促排卵、AIH 或 IVF-ET
- H. 该例应行 ICSI
- I. 腹腔镜手术治疗意义不大

男性，56 岁，发现血压升高 6 年，血脂增高 1 个月。患者 6 年前体检时发现血压升高，最高达 160/100mmHg，无头晕、头痛、胸闷、心悸等，不规律服药，血压控制不理想。1 个月前查血清 TC 7.25mmol/L，TG 3.1mmol/L，LDL-C 4.7mmol/L，HDL-C 1.10mmol/L，否认有糖尿病、冠心病病史。平时缺乏运动。查体：BP 150/96mmHg，心肺未发现异常，心电图正常。

8. 该患者考虑的诊断是

- A. (1) 高血压病 1 级 高危；(2) 混合型高脂血症

- B. (1) 高血压病 2 级高危； (2) 混合型高脂血症
- C. (1) 高血压病 2 级高危； (2) 高三酰甘油血症
- D. (1) 高血压病 2 级极高危； (2) 高胆固醇血症
- E. (1) 高血压病 2 级极高危； (2) 混合型高脂血症

9. 该病例的诊断依据是

- A. 不规律服药
- B. 高血压史 6 年，查体 BP 150/96mmHg
- C. 无糖尿病史及靶器官损害
- D. 男性患者，年龄大于 55 岁，缺乏运动
- E. 胆固醇及三酰甘油升高，低密度胆固醇偏高，高密度胆固醇偏低

10. 该患者应首选以下哪种降脂药物进行治疗

- A. 他汀类药物
- B. 贝特类药物
- C. 烟酸+贝特类药物
- D. 烟酸
- E. 贝特类药物+他汀类药物

11. 服用上述首选降脂药物后，应注意监测哪些项目的变化

- A. 血脂
- B. 肝功能
- C. 肾功能
- D. 肌酸激酶
- E. 以上均是

12. 高血压患者出现以下哪些症状时应转诊

- A. 头晕、头痛
- B. 恶心、呕吐
- C. 视物模糊、眼痛
- D. 心前区疼痛
- E. 心悸、胸闷
- F. 四肢麻木、水肿、间歇性跛行

患者，男，35岁。阵发性腹痛5天，伴有恶心、呕吐，起病以来未排气排便，3年前因胆囊结石行胆囊切除术。查体：血压90/60mmHg，脉搏120次/分，腹饱满，右侧腹部较对侧膨隆，有压痛、反跳痛及肌紧张。右下腹穿刺抽出少量暗红色液体。血红蛋白110g/L。

13. 该患者诊断与鉴别诊断应考虑

- A. 绞窄性肠梗阻
- B. 急性重症胰腺炎
- C. 胃炎
- D. 急性阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎
- E. 急性粘连性肠梗阻
- F. 弥漫性腹膜炎
- G. 感染中毒性休克
- H. 胃十二指肠溃疡急性穿孔

14. 请问患者需要做的进一步的处理包括

- A. 胰腺CT
- B. 急测血电解质
- C. 胃肠减压
- D. 禁食
- E. 给予胃黏膜保护剂

F. 监测生命体征

G. 纠酸扩容

H. 纠正休克

15. 下列处理方式正确的是

A. 肠造瘘

B. 剖腹或腹腔镜探查

C. 肠切除肠吻合

D. 回肠造瘘术

E. 密切观察、暂不手术

中年患者，两个月前开始逐渐心慌、乏力，上楼吃力，家人发现面色不如以前红润，病后饮食正常，但有时上腹不适。不挑食，大便不黑，小便正常，睡眠可，略见消瘦，既往无胃病史。查体：T36.5℃，P 96 次/分，R 18 次/分，BP 130/70mmHg，贫血貌，皮肤无出血点和皮疹，浅表淋巴结不大，巩膜无黄染，心界不大，心率 96 次/分，律齐，心尖部 II/6 级收缩期吹风样杂音，肺无异常，腹平软，无压痛，肝脾未及，下肢不肿。化验：Hb75g/L，RBC  $3.08 \times 10^{12}/L$ ，MCV 76fl，MCH 24pg，MCHC 26%，网织红细胞 1.2%，WBC  $8.0 \times 10^9/L$ ，分类中性分叶 69%，嗜酸 3%，淋巴 25%，单核 3%，Plt:  $136 \times 10^9/L$ ，大便隐血 (+)，尿常规 (-)，血清铁蛋白  $6 \mu g/L$ ，血清铁  $7.0 \mu mol/L$ ，总铁结合力  $102 \mu mol/L$ 。

16. 患者初步诊断是

A. 胃溃疡

B. 十二指肠溃疡

C. 消化道肿瘤

D. 缺铁性贫血

E. 克罗恩病

F. 肠结核

17. 为明确诊断，在下列选项中还需要完善的检查有

- A. PPD 试验
- B. 肠吸收功能试验
- C. 幽门螺杆菌检查
- D. 出凝血时间
- E. 胃镜
- F. 钡餐造影
- G. CEA
- H. 腹部 B 超或 CT
- I. 骨髓象检查

18. 经胃镜+活检检查提示患者为胃黏膜内癌，中度分化，直径 $<2\text{cm}$ ，无转移；下一步治疗适合的选择有

- A. 内镜下黏膜切除术
- B. 内镜下黏膜剥离术
- C. 毕 I II 式
- D. 毕 II 式
- E. Roux-en-Y 式
- F. 化疗+放疗
- G. 生长抑素类似物支持治疗

患者女，28岁。因多食、消瘦、怕热、突眼2年多，加重伴2周而入院。病程中时常有每日大便次数增多或者腹泻的现象，近来加重。入院检查：消瘦，突眼。甲状腺肿大，可触及震颤。伸舌及伸手可见细震颤。T 37.8℃，P 116次/min，呼吸平稳，BP 130/80mmHg；HR 118次/min，偶闻早搏；双肺未闻及明

显湿啰音；腹软，肝脾未明显触及。入院后经一系列检查，考虑诊断为甲状腺功能亢进症。

19. 考虑患者为良性突眼。良性突眼表现为

- A. 轻度突眼
- B. 无明显眼睛不适感
- C. 重度突眼
- D. 眼睛的异物感明显
- E. 通常不会引起失明
- F. 通常导致失明

20. 患者出现大便次数增多或者腹泻现象的原因是

- A. 饮食不洁
- B. 受凉所致
- C. 药物的副作用
- D. 水土不服
- E. 病变本身导致
- F. 进食刺激性食物

21. 患者因亲人突然离世而情绪极度悲伤。2 小时前出现高热、烦躁、大汗、呼吸急促伴恶心呕吐及腹泻。查体：脱水貌，烦躁不安，大汗淋漓，嗜睡。T 39.5℃，P 150 次/min，呼吸急促，BP130/80mmHg；唇舌干燥，皮肤弹性差；偶闻早搏，双肺未闻及明显湿啰音。腹软，肝脾未明显触及。神经系统检查未见明显定位体征。患者目前出现的问题是

- A. 急性感染
- B. 急性胃肠炎
- C. 脑部感染
- D. 肺炎
- E. 甲状腺功能亢进症

F. 甲状腺危象

22. 在明确甲状腺危象的诊断后，应立即采取的治疗措施有

- A. 降温、给氧，必要时人工冬眠
- B. 纠正水电解质和酸碱平衡紊乱
- C. 抑制甲状腺激素合成，首选 PTU，首剂 600mg
- D. 口服或静脉碘制剂应用
- E. 激素的应用
- F. 血浆置换、血液透析

23. 患者出院后，有关健康教育的内容正确的是

- A. 高热量、高蛋白、高维生素饮食
- B. 注意心态的调整
- C. 当脉搏减慢、体重增加是治疗有效的指标
- D. 患有甲亢的女患者不能妊娠
- E. 服药开始的 3 个月内每周查血象 1 次
- F. 外出戴深色眼镜

患者中年男性，因进食油腻食品后上腹部持续疼痛 12 小时入院。既往有冠心病、十二指肠球部溃疡和胆囊结石病史。体检：T37.8℃，P 110 次/min，血压 BP 130/90mmHg。巩膜轻度黄染，腹软，上腹部明显压痛，无反跳痛，肠鸣音减弱，墨菲征可疑阳性。

24. 入院第一时间必须紧急检查的项目有

- A. 血常规
- B. 血淀粉酶
- C. 尿淀粉酶
- D. 腹部平片

- E. 腹部 B 超
- F. 血肌酐
- G. 肌钙蛋白
- H. 胃镜
- I. 心电图
- J. 消化道钡餐

25. 急查结果显示患者白细胞、血、尿淀粉酶均升高，患者诉腹痛、腹胀明显，可进行的处理是

- A. 禁食
- B. 静注质子泵抑制剂
- C. 静滴生长抑素
- D. 肌注吗啡
- E. 输血
- F. 输液
- G. 静滴抗生素
- H. 肌注 654-2

26. 患者腹部 B 超提示胆总管上段扩张，进一步可选的检查有

- A. 腹腔镜检查
- B. 磁共振胰胆管造影（MRCP）
- C. 上消化道钡餐
- D. 经内镜逆行性胰胆管造影（ERCP）
- E. 腹部 X 线
- F. 胶囊内镜

患者男，50岁。有胃溃疡病史10年，近3个月上腹痛加剧，无节律性，伴暖气，无反酸及呕吐，口服法莫替丁和奥美拉唑无效，体重减轻5kg。查体：浅表淋巴结无肿大，腹平软，上腹部轻压痛，可触及包块。

27. 最可能的诊断是

- A. 胃溃疡复发
- B. 胃溃疡癌变
- C. 伴穿透性溃疡
- D. 伴幽门梗阻
- E. 复合性溃疡
- F. 胃淋巴瘤

28. 患者需进一步做的检查是

- A. X线钡餐检查
- B. 胃镜检查结合活检
- C. 腹部超声检查
- D. 腹部CT检查
- E. 腹部MRI检查
- F. 大便潜血试验
- G. 血CEA检查
- H. 内镜超声检查

29. 胃癌的并发症有

- A. 贫血
- B. 幽门梗阻
- C. 贲门梗阻
- D. 功能性消化不良
- E. 胃泌素瘤
- F. 呕血

患者男，43岁，因“持续高热、咽喉疼痛1周”就诊。查体：体温39.5℃，贫血貌，咽部充血，双侧扁桃体III度肿大，可见脓肿，全身浅表淋巴结及肝脾未触及，胸骨无压痛。实验室检查：Hb 50g/L，RBC  $1.8 \times 10^{12}/L$ ，WBC  $1.9 \times 10^9/L$ ，PLT  $19 \times 10^9/L$ 。

30. 患者可能的诊断是

- A. 巨幼细胞贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 骨髓增生异常综合征
- D. 急性白血病
- E. 系统性红斑狼疮
- F. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- G. 淋巴瘤

31. 若患者白细胞计数  $1.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞计数  $0.13 \times 10^9/L$ ，淋巴细胞百分比70%，红细胞计数  $1.8 \times 10^{12}/L$ ，网织红细胞0.1%，骨髓提示多部位增生减低，活检显示造血组织均匀减少，脂肪组织增加。患者最可能的诊断是

- A. 巨幼细胞贫血
- B. 非重型再生障碍性贫血
- C. 骨髓增生异常综合征
- D. 急性白血病
- E. 系统性红斑狼疮
- F. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- G. 重型再生障碍性贫血

32. 为明确诊断，最有价值的检查是

- A. 骨髓检查

- B. Ham 试验
- C. Coombs 试验
- D. 自身抗体检测
- E. 红细胞寿命测定
- F. 染色体检查

## 2022 年全科主治医师《专业实践能力》考前模考大赛（二）答案解析

### 一、案例分析题

#### 1. 【正确答案】 B

【答案解析】 患者继发不孕，子宫大小、形态正常，宫骶韧带有触痛性结节，基础体温双相，说明有排卵。该患者不孕最可能的原因是子宫内膜异位症。

#### 2. 【正确答案】 E

【答案解析】 腹腔镜是目前国际公认的子宫内膜异位症诊断的最佳方法。

#### 3. 【正确答案】 G

【答案解析】 中、重度子宫内膜异位症的患者血清 CA125 值可能会升高，但一般均为轻度升高，多低于 200IU/ml。但 CA125 的特异性均局限，且与多种疾病有交叉阳性反应，因此不能单独用作诊断或鉴别诊断。

#### 4. 【正确答案】 F

【答案解析】 子宫内膜异位症的临床表现包括：痛经、慢性盆腔痛、性交痛、月经异常和不孕。较大的卵巢子宫内膜异位症囊肿在腹部可扪及囊性包块。盆腔检查可发现子宫多后倾固定，直肠子宫陷凹、宫骶韧带或子宫后壁下段等部位扪及触痛性结节。

5. 【正确答案】 BCE

【答案解析】 子宫内膜异位症导致不孕的因素有：盆腔解剖结构异常；盆腹腔内微环境的改变；免疫功能异常；卵巢功能异常；未破裂卵泡黄素化综合征。该患者基础体温双相型，月经史正常，证明卵巢功能正常，并没有出现功能异常。因为题干描述：HSG 示输卵管走行、弥散可，所以目前还没有导致选项 A 这种情况，所以不选。

6. 【正确答案】 CDEFG

【答案解析】 子宫内膜异位症的药物治疗包括：假孕治疗（避孕药、孕激素类药物）、假绝经治疗（GnRHa、达那唑）其他治疗（孕三烯酮、米非司酮）。

7. 【正确答案】 ABCEG

【答案解析】 对希望妊娠者，术后不宜应用药物巩固治疗而应行促排卵等治疗，争取尽早妊娠。手术后 2 年内不能妊娠者，再妊娠的机会甚微。已有报道表明，对子宫内膜异位症导致不孕的患者，经保留生育功能手术后即采用辅助生殖技术，可明显提高妊娠率。

8. 【正确答案】 B

【答案解析】

单位：mmHg

分类	收缩压	和	舒张压
正常血压	<130	和	<85
正常高值血压	130~139	和/或	85~89
1级高血压	140~159	和/或	90~99
2级高血压	≥160	和/或	≥100

其他危险因素、HMOD 或疾病	正常高值	1级高血压	2级高血压
无其他危险因素	低危	低危	中危/高危
1~2个危险因素	低危	中危	高危
≥3个危险因素	低危/中危	高危	高危
HMOD、CKD3期、糖尿病、CVD	高危	高危	高危

高脂血症简单分为四类：①高胆固醇血症：血清 TC 水平增高；②混合型高脂血症：血清 TC 与 TG 水平均增高；③高甘油三酯血症：血清 TG 水平增高；④低高密度脂蛋白血症：血清 HDL-C 水平减低。

9. 【正确答案】 BCDE

【答案解析】 高血压和高脂血症与病人是否规律服药无关。

10. 【正确答案】 A

【答案解析】 混合型高脂血症首选他汀类药物。

11. 【正确答案】 E

【答案解析】 药物治疗过程中，应根据医生的要求监测：血脂、肌酸激酶、肝功能、肾功能。

12. 【正确答案】 ABCDEF

【答案解析】 （1）急、重症高血压，如高血压危象或脑病。

1) 高血压危象：①血压急剧上升高达（180/120mmHg）以上；②继发性高颅压：

剧烈头痛呕吐、视物模糊；③外周缺血：尿少、面色苍白、手足抖动、心绞痛等；④偶发急性左心衰、肺水肿。

2) 高血压脑病：①急剧血压增高；②颅压急剧增高：剧烈头痛呕吐、头晕、意识障碍、继发性呼吸困难。

(2) 急进性高血压出现严重并发症或并发症者。

1) 血压持续性严重增高。

2) 早发心脏、脑及肾脏并发症。

3) 早发严重的视网膜病变。

(3) 顽固性高血压或高血压诊断不明确，如不能除外继发性高血压存在者。

13. 【正确答案】 AEFG

【答案解析】 患者既往有腹部手术史，目前表现为阵发性腹痛，伴恶心、呕吐、停止排气排便。应考虑急性粘连性肠梗阻可能。同时患者血压降低、脉搏增快，腹饱满，右侧腹部较对侧膨隆，有压痛、反跳痛及肌紧张。右下腹穿刺抽出少量暗红色液体，应考虑绞窄性肠梗阻并弥漫性腹膜炎、感染中毒性休克，所以选择 AEFG。

14. 【正确答案】 BCDFGH

【答案解析】 患者诊断上考虑绞窄性粘连性肠梗阻、急性腹膜炎、感染中毒性休克，应暂予胃肠减压、禁食、严密监测、扩容、纠正休克状态等处理，并急测血电解质、血气，明确是否存在水电酸碱平衡紊乱，无需做胰腺 CT 和给予胃黏膜保护剂。

15. 【正确答案】 ABCD

【答案解析】 绞窄性肠梗阻病情重，危及生命，应行急诊探查手术，探查方式可选择常规开腹或腹腔镜探查；具体手术方式视探查结果而定，如病变肠管为小肠，且肠管局部出现失活坏死，可行病变肠管切除肠吻合术、肠造瘘术等。

16. 【正确答案】 CD

【答案解析】 患者短期内（近两个月），出现心慌、乏力、消瘦、上腹不适感（偶发），同时大便潜血试验阳性，最可能是消化道肿瘤疾病；消化性溃疡一般病程较长，有规律的腹痛病史，呈周期性发作，发作时剑突下又局限性压痛。克罗恩病和肠结核都有腹痛、腹泻、腹部包块的特点所以均不考虑。另外诊断缺铁性贫血成立，标准：Hb 成人男性 $<120\text{g/L}$ ，女性 $<110\text{g/L}$ ，本例患者MCV小于 $80\text{fl}$ ，MCHC小于 $32\%$ ， $\text{MCH}<27\text{pg}$ 提示小细胞低色素型，血清铁蛋白低于 $12\mu\text{g/L}$ ，血清铁低于 $8.95\ \mu\text{mol/L}$ ，总铁结合力大于 $64.44\ \mu\text{mol/L}$ ，综合考虑属缺铁性贫血。

17. 【正确答案】 DEFGHI

【答案解析】 目前高度怀疑消化道肿瘤，所以胃镜、消化道造影、癌胚抗原、腹部B超、CT都是需要进一步完善的检查，另外患者有贫血和出血表现，需要完善骨髓检查和出凝血时间检查。

18. 【正确答案】 ABG

【答案解析】 胃黏膜内癌属于早期胃癌，一般选择内镜下黏膜切除术或内镜下黏膜剥离术均可，这两种术式适用于高或中度分化，无溃疡，直径小于 $2\text{cm}$ 且无淋巴转移的患者。另外生长抑素类似物能抑制胃癌生长，改善患者生活质量。

19. 【正确答案】 ABE

【答案解析】 良性突眼无明显眼睛不适感，轻度突眼，通常不会引起失明。

20. 【正确答案】 E

【答案解析】 甲状腺激素（TH）可促使胃肠蠕动增快，消化吸收不良而排导致便次数增多。

21. 【正确答案】 EF

【答案解析】 患者在就诊时虽有中枢神经系统症状，但相关体征并不支持中枢神经系统的疾病；患者有明确的甲亢病史，在有明确的应激状态下，出现典型的甲状腺危象表现，F 为关键选项。

22. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 此问要回答“应立即采取的治疗措施有”，因此 F 不选。

23. 【正确答案】 ABCEF

【答案解析】 妊娠可以加重甲亢的病情，应在病情控制平稳/治愈后考虑妊娠，同时要注意观察。

24. 【正确答案】 ABCDGI

【答案解析】 本提问突出特点为“紧急”，指在最短时间内以最快速度完成对诊断有帮助的检查项目。本问共有 10 个备选答案，究竟哪些检查项目是急需做的？要解决好这个问题，首先要有一个明确的思路，即诊断考虑什么病，需要排除什么致命的疾病。根据患者起病前进食油腻食品后上腹痛、发热、黄疸等特点，既往有胆囊结石病史，诊断应首先考虑胆道疾患，又因为胆管和胰管共同开口的特点，胆道结石时胆石嵌顿阻塞或 Oddi 括约肌的痉挛，所以，还应想到有合并急性胰腺炎的可能性。同时不能忽略的是患者既往有冠心病和十二指肠球部溃疡病史，所以检查应围绕着如何确定患者属急性胆道病还是急性胰腺病，以及排除急性心肌梗死和溃疡穿孔的可能来选择检查项目。

淀粉酶检查方便快捷，又能反映胰腺病变。血中淀粉酶在起病 6 小时后即可升

高，24小时达高峰，尿淀粉酶的升高比血中淀粉酶升高迟2小时，此患者发病已12小时，因此血、尿淀粉酶的检查对本病有重要价值。

根据以上特点，B、C为诊断急性胰腺炎的主要依据，故必须选做，为关键选项。

A血常规对诊断有帮助，可确定是否合并感染，也应该检查。而第D项除了对胰腺炎、胆石症诊断有较大帮助外，还能排除胃肠穿孔及肠梗阻，又是简便检查，故必须选做。E腹部B超并非多数单位急诊时都能进行的检查项目，所以属于有条件便可急查，但不是一定必须急查的项目为无关选项，F肌酐对诊断无直接帮助，H和J胃肠造影可观察胃、十二指肠情况，但此时检查可加重病情，应在急性炎症控制后进行，F和I可以排除心肌梗死，也是必须急查的项目。

25. 【正确答案】 ABCFG

【答案解析】 选答之前，必须明确诊断。显然，血、尿淀粉酶升高支持急性胰腺炎的诊断。胰腺炎的治疗原则应为抑制胰腺分泌及胰酶活性、解痉镇痛、纠正水电解质紊乱、防止休克，必要时抗感染。抑制胰腺分泌是治疗急性胰腺炎非常关键的环节，因此应尽快禁食、减少食物、胃酸对胰腺的刺激。对于禁食患者，必须给予静脉输液解决营养、热量及水、电解质平衡问题。质子泵抑制剂和生长抑素可减少胃酸分泌，从而减少胰液分泌，故可以应用。患者白细胞升高，结果胆囊结石病史，考虑胆源性胰腺炎可能性大，故可使用抗生素。根据以上分析，第A、B、C、F、G项为正确答案，A为关键选项。吗啡可引起Oddi括约肌痉挛，导致胰液、胆汁反流，加重胰腺炎，且可扩张血管，导致血压下降，并能掩盖病情，所以不能使用。本例无明显失血倾向，也非消耗性疾病，不需输血。患者有腹胀，肌注654-2有加重腹胀，麻痹性肠梗阻的风险，故不使用。

26. 【正确答案】 BD

【答案解析】 腹部 B 超对胆总管下段由于受肠道气体影响，难以观察清楚，但从胆总管上段扩张可推测下段梗阻可能性大，故可选无创的 MRCP 和有创的 ERCP 检测了解胆道情况，而 A、C、E 检测不能了解胆道梗阻情况，故不选。

27. 【正确答案】 B

【答案解析】 患者为中年男性，有胃溃疡病史 10 年，近 3 个月上腹痛加剧，无节律性，伴暖气，无反酸及呕吐，口服法莫替丁和奥美拉唑无效，上腹部轻压痛，可触及包块，故首先考虑癌变。

28. 【正确答案】 ABH

【答案解析】 X 线检查对胃癌的诊断依然有较大的价值。近年应用气钡双重对比法、压迫法和低张造影技术，并用高密度钡粉，能清楚显示黏膜的精细结构，有利于检查到微小病变。胃 X 线钡餐检查有利于胃癌和胃淋巴瘤的鉴别。胃镜及活检是目前诊断胃癌最可靠的方法，为关键选项。内镜超声检查具有胃镜和实时超声检查两者的优点，对胃壁各层肿瘤的浸润状况、邻近器官及淋巴结转移的诊断有独到之处。

29. 【正确答案】 ABCF

【答案解析】 胃癌可发生出血，穿孔，梗阻等。

30. 【正确答案】 ABCDEF

【答案解析】 本题主要考点是能引起全血细胞减少的疾病有哪些，以上除了淋巴瘤外均可能引起全血细胞减少。

31. 【正确答案】 G

【答案解析】再障的骨髓象：多部位骨髓增生减低，粒、红系及巨核细胞明显减少且形态大致正常，淋巴细胞、网状细胞及浆细胞等非造血细胞比例明显增高。骨髓小粒无造血细胞，呈空虚状，可见较多脂肪滴。骨髓活检显示造血组织均匀减少，脂肪组织增加。

32. 【正确答案】 A

【答案解析】再障患者行骨髓检查时，多部位骨髓增生减低，粒、红系及巨核细胞明显减少且形态大致正常，淋巴细胞、网状细胞及浆细胞等非造血细胞比例明显增高。骨髓小粒无造血细胞，呈空虚状，可见较多脂肪滴。骨髓活检显示造血组织均匀减少，脂肪组织增加，因此最佳选项为 A。