

中西医内科主治医师《专业知识》模考试卷

一、A1 型题

1. 肺结核气阴耗伤证，治疗应首选的方剂是

- A. 保真汤
- B. 生脉饮
- C. 增液汤
- D. 沙参麦冬汤
- E. 石斛夜光丸

2. 发现肺癌的最基本检查是

- A. 胸部 X 线检查
- B. 痰脱落细胞学检查
- C. 放射性核素扫描检查
- D. 癌标志物检测
- E. 纤维支气管镜检查

3. 治疗慢性肺源性心脏病痰热郁肺证选用的方药是

- A. 涤痰汤
- B. 苏子降气汤
- C. 越婢加半夏汤
- D. 真武汤合五苓散

E. 沙参麦冬汤合五味消毒饮

4. 治疗原发性支气管肺癌中医证型之阴虚毒热证选用的方药是

- A. 导痰汤
- B. 保真汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 沙参麦冬汤合五味消毒饮
- E. 百合固金汤合秦艽鳖甲散

5. 肺脓肿与癌性空洞继发感染的鉴别主要是

- A. 咳嗽，咳脓痰
- B. 血的白细胞检查

- C. 发热的轻重
- D. 脓痰的多少
- E. X线检查或痰液细胞学检查
6. β_2 受体激动剂治疗支气管哮喘时的作用机制不正确的是
- A. 舒张气道平滑肌
- B. 降低微血管的通透性
- C. 减少嗜酸性粒细胞脱颗粒
- D. 增加气道上皮纤毛的摆动
- E. 减少肥大细胞介质的释放
7. 肺结核的好发部位是
- A. 左下肺及肺上叶
- B. 右中肺及左下肺
- C. 肺上叶后段及下叶背段
- D. 肺叶间及右下肺
- E. 右上肺及左上肺
8. 引起慢性心力衰竭的心肌炎和心肌病最常见的是
- A. 糖尿病心肌病
- B. 病毒性心肌炎
- C. 心肌淀粉样变性
- D. 继发于甲减的心肌病
- E. 继发于甲亢的心肌病
9. 常见下垂性水肿的是
- A. 肾性水肿
- B. 心源性水肿
- C. 肝病性水肿
- D. 营养不良性水肿
- E. 原因不明性水肿
10. 不属于心脏性猝死的临床过程分期的是
- A. 前驱期

- B. 发病期
- C. 缓解期
- D. 心脏骤停期
- E. 生物学死亡期
11. 心脏神经症的疼痛多为
- A. 闷痛
- B. 隐痛
- C. 绞痛
- D. 空痛
- E. 灼痛
12. 心肌梗死的并发症不包括
- A. 心脏破裂
- B. 室壁瘤
- C. 乳头肌功能不全
- D. 主动脉瓣穿孔
- E. 栓塞
13. 病毒性心肌炎之阴阳两虚证首选
- A. 甘露消毒丹
- B. 葛根芩连汤
- C. 天王补心丹
- D. 炙甘草汤合生脉散
- E. 参附养荣汤
14. 心脏瓣膜病二尖瓣狭窄中, 最常见的病因为
- A. 风湿热
- B. 腱索过长
- C. 二尖瓣脱垂
- D. 乳头肌脓肿
- E. 乳头肌坏死
15. 肝硬化患者最严重的并发症和最常见死亡原因是

- A. 上消化道出血
- B. 原发性肝癌
- C. 感染
- D. 肝肾综合征
- E. 肝性脑病
16. 下列属于溃疡性结肠炎的主要临床表现的是
- A. 腹痛、腹泻、腹胀
- B. 腹痛、腹泻、恶心
- C. 腹痛、腹泻、黏液脓血便
- D. 腹痛、腹胀、黏液脓血便
- E. 暖气、早饱、呕血
17. 溃疡性结肠炎的腹痛特点是
- A. 疼痛-饮食-便后缓解
- B. 饮食-疼痛-便后缓解
- C. 疼痛-休息-便后缓解
- D. 疼痛-便意-便后缓解
- E. 疼痛-缓解-便后便意
18. 治疗溃疡性结肠炎阴血亏虚证首选
- A. 四神丸
- B. 驻车丸
- C. 痛泻要方
- D. 芍药汤
- E. 膈下逐瘀汤
19. 目前认为哪种细菌是慢性胃炎的一个重要原因
- A. 大肠杆菌
- B. 链球菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 幽门螺杆菌

20. 以下上消化道出血所属的中医范畴正确的是

- A. 呕血、便血
- B. 尿血、呕血
- C. 咳血、吐血
- D. 便血、尿血
- E. 咳血、尿血

21. 胃癌的中医病因病机中，无关的脏腑是

- A. 胃
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

22. 关于十二指肠溃疡的治疗最重要的是

- A. 中枢镇静
- B. 保护黏膜
- C. 抑制胃酸和根除幽门螺杆菌
- D. 早期手术
- E. 少食多餐

23. 原发性肝癌最有效的治疗方法是

- A. 放射治疗
- B. 免疫治疗
- C. 抗癌药物局部治疗
- D. 冷冻治疗
- E. 手术治疗

24. 急性肾衰急诊透析的指征不包括

- A. 无尿 2 天
- B. 代谢性酸中毒
- C. 尿毒症症状明显
- D. 血钾超过 5.5mmol/L

E. 肌酐清除率较正常下降超过 50%

25. 急性肾衰竭病人由少尿期进入多尿期, 尿量超过

- A. 300ml
- B. 400ml
- C. 500ml
- D. 250ml
- E. 350ml

26. 下列不属于急性肾衰竭病因的是

- A. 血容量增多
- B. 肾缺血
- C. 肾毒性物质损伤肾小管上皮细胞
- D. 急性尿路梗阻
- E. 肾内血流动力学改变

27. 下列哪项说法是正确的

- A. 血液透析能够代替内分泌和代谢功能
- B. 腹膜透析可以代替代谢功能但不能代替内分泌功能
- C. 肾脏移植不能够代替内分泌和代谢功能
- D. 血液透析不能替代内分泌但能替代代谢功能
- E. 肾脏移植能够代替内分泌和代谢功能

28. 尿路感染最常见于

- A. 学龄前儿童
- B. 青壮年男性
- C. 中老年男性
- D. 育龄期妇女
- E. 中老年妇女

29. 治疗急性膀胱炎推荐使用

- A. 青霉素
- B. 复方磺胺甲恶唑
- C. 链霉素

- D. 氯霉素
- E. 四环素
30. 肾病综合征所表现的水肿最易损伤五脏中哪些脏器
- A. 心、肝、肾
- B. 肾、肺、脾
- C. 肺、脾、心
- D. 肝、肾、脾
- E. 心、肝、脾
31. 诊断缺铁性贫血时估计骨髓铁贮存状态的敏感的方法是
- A. 红细胞形态
- B. MCV、MCH、MCHC
- C. 血清铁及血清运铁蛋白饱和度
- D. 血清铁蛋白测定
- E. 骨髓铁染色
32. 下列各项，表现为全血细胞减少，骨髓细胞增生低下，三系造血细胞减少的疾病是
- A. 脾功能亢进
- B. 白细胞减少
- C. 严重的缺铁性贫血
- D. 骨髓纤维化
- E. 再生障碍性贫血
33. 再生障碍性贫血血象和骨髓象的特点是
- A. 全血细胞减少，少数呈两系细胞或血小板减少
- B. 细胞大小不等，中心淡染区扩大
- C. 可见巨核细胞增多，血片中血小板计数减少，可见畸形血小板
- D. 粒细胞停滞于早幼粒阶段，细胞质中颗粒粗大
- E. 骨髓增生活跃，但巨核细胞减少
34. 白血病化疗期间口服别嘌醇的目的是
- A. 抑制尿素的合成

- B. 加强化疗药的疗效
- C. 抑制尿酸的合成
- D. 加强尿酸的排泄
- E. 加强尿素的排泄
35. 下列各项中, 属于正常骨髓造血功能受抑制的表现是
- A. 发热
- B. 淋巴结肿大
- C. 肝脾大
- D. 关节疼痛
- E. 眼球突出
36. 特发性血小板减少性紫癜血小板相关抗体主要抗体成分为
- A. IgA
- B. IgE
- C. IgM
- D. IgG
- E. IgM、IgA
37. 下列各项不属于特发性血小板减少性紫癜常见病因的是
- A. 病毒感染
- B. 内分泌异常
- C. 肝脾的作用
- D. 免疫因素
- E. 雌激素
38. 痛风慢性期典型者骨质的 X 线特征是
- A. 骨质边缘反应
- B. 多发性骨折和畸形
- C. 痛风石沉积
- D. 圆形或不整齐的穿凿样透亮缺损
- E. 骨膜下皮质吸收和颅骨斑点状脱钙
39. 下列不属痛风病因的是

- A. 风寒湿阻
B. 风湿热郁
C. 脾虚湿困
D. 痰瘀痹阻
E. 肝肾亏虚
40. 不属甲亢主要临床表现的是
- A. 眼征
B. 甲状腺危象
C. 高代谢症候群
D. 弥漫性甲状腺肿
E. 胫前黏液性水肿
41. 高钾血症是指血清钾高于
- A. 3.5mmol/L
B. 4.0mmol/L
C. 4.5mmol/L
D. 5.0mmol/L
E. 5.5mmol/L
42. 中度高渗性失水, 失水量相当于体重的
- A. 2%~3%
B. 3%~4%
C. 4%~6%
D. 6%~7%
E. 7%~8%
43. 诊断代谢性酸中毒的主要依据是
- A. 呼吸深长, 血浆 HCO_3^- 下降
B. 呼吸深长, 血浆 CO_2CP 上升
C. 呼吸困难, 血浆 HCO_3^- 上升
D. 呼吸浅慢, 血浆 CO_2CP 下降
E. 呼吸浅慢, 血压高, 神志不清

44. 痛风诊断的金标准为

- A. 血尿酸测定
- B. 尿尿酸测定
- C. 滑囊液检查
- D. X 线检查
- E. 超声检查

45. 痹证属风寒湿偏盛不明显者，治疗宜选用的方剂是

- A. 防风汤
- B. 羌活胜湿汤
- C. 独活寄生汤
- D. 蠲痹汤
- E. 当归四逆汤

46. 治疗血管性痴呆肝肾阴虚证，应首选的方剂是

- A. 洗心汤
- B. 还少丹
- C. 七福饮
- D. 通窍活血汤
- E. 知柏地黄丸

47. 治疗癫痫之瘀阻脑络证首选的方剂是

- A. 定痫丸
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 涤痰汤
- D. 通窍活血汤
- E. 归脾汤

48. 短暂性脑缺血发作持续时间为

- A. 数秒至数分钟
- B. 数分钟至 1 小时
- C. 1~2 小时
- D. 2~6 小时

E. 6~24 小时

49. 治疗短暂性脑缺血发作痰瘀互结, 阻滞脉络证首选的方剂是

- A. 镇肝熄风汤
- B. 补阳还五汤
- C. 黄连温胆汤合桃红四物汤
- D. 通窍活血汤
- E. 知柏地黄丸

50. 治疗脑血栓形成之阴虚风动证首选的方剂是

- A. 镇肝熄风汤
- B. 补阳还五汤
- C. 星蒺承气汤
- D. 通窍活血汤
- E. 真方白丸子

51. 脑栓塞病情进展达高峰的时间多在

- A. 十几分钟内
- B. 几分钟内
- C. 几小时内
- D. 几天内
- E. 几周内

52. 腔隙性梗死最有效的检查手段是

- A. CT
- B. MRI
- C. PET
- D. SPECT
- E. 脑电图

53. 蛛网膜下腔出血确诊的依据是

- A. 突然剧烈头痛、呕吐
- B. 脑膜刺激征阳性
- C. 偏瘫

D. CT 示蛛网膜下腔内高密度影

E. 脑电图检查

54. 治疗血管性痴呆髓海不足证首选的方剂是

A. 洗心汤

B. 还少丹

C. 七福饮

D. 通窍活血汤

E. 知柏地黄丸

55. 防止急性 CO 中毒后脑水肿首选

A. 甘露醇

B. 安体舒通

C. 皮质激素

D. 脑营养药

E. 降血压药

56. 急性一氧化碳重度中毒临床上主要表现为

A. 头痛

B. 头晕

C. 恶心

D. 呕吐

E. 反射消失

57. 使组织缺氧产生中毒的是

A. 镇静剂

B. 有机磷杀虫药

C. 一氧化碳

D. 氰化物

E. 乙醇

58. 诊断中毒的重要依据是

A. 毒物接触史

B. 不明原因的昏迷

- C. 难以解释的精神改变
- D. 年轻患者不明原因的心律失常
- E. 不明原因的心脏骤停
59. 诊断有机磷杀虫药中毒时, 全血胆碱酯酶活性应
- A. $<100\%$
- B. $\leq 90\%$
- C. $\leq 80\%$
- D. $\leq 75\%$
- E. $\leq 70\%$
60. 减轻毒蕈碱样症状的药物是
- A. 氯磷定
- B. 阿托品
- C. 碘解磷定
- D. 双复磷
- E. 双解磷
61. 肝硬化患者, 出现肾功能衰竭, 最可能的原因是
- A. 脾功能亢进
- B. 大量腹水
- C. 感染
- D. 肝肾综合征
- E. 上消化道出血
62. 溃疡性结肠炎的实验室检查中最有价值的检查手段是
- A. 血液检查
- B. 粪便检查
- C. 纤维结肠镜检查
- D. 钡剂灌肠检查
- E. 黏膜组织学检查
63. 慢性胃炎的特异性症状是
- A. 呕吐苦水

- B. 饥饿时中上腹痛
C. 上消化道反复出血
D. 进食后中上腹痛
E. 以上都不是
64. 复合性溃疡是指
A. 胃大、小弯溃疡
B. 胃与十二指肠溃疡
C. 胃体、胃窦溃疡
D. 胃底与胃小弯溃疡
E. 胃小弯与幽门溃疡
65. P 波消失, 代之以大小不等、形态不同、间隔不等的畸形波, 频率 360 次/分, QRS 波正常, 律绝对不规则, 为
A. 阵发性房性心动过速
B. 阵发性交界性心动过速
C. 阵发性室性心动过速
D. 心房扑动
E. 心房颤动
66. CO 中毒的主要机理是
A. 与含二价铁的肌球蛋白结合, 损害线粒体功能
B. 与红细胞的 Hb 结合, 引起组织缺氧
C. 抑制细胞色素氧化酶的活性
D. 产生高铁血红蛋白
E. 影响呼吸链的电子传递

二、B 型题

(67~68 共用备选答案)

- A. 多巴胺
B. 美托洛尔
C. 硝普钠
D. 硝酸甘油

E. 卡托普利

67. 既能扩张动脉, 又能扩张静脉的药物是

68. 主要扩张静脉的药物是

(69~70 共用备选答案)

- A. 右上腹疼痛, 进食油脂食物常加重
- B. 上腹扭痛, 板样强直, 肝浊音界消失
- C. 发作性上腹疼痛, 有周期性和节律性
- D. 脐周阵痛, 伴有压痛, 肠鸣音亢进, 有肠型
- E. 上腹部胀痛, 伴有胃型及振水声

69. 胆石症及急性胆囊炎可见

70. 消化性溃疡可见

(71~72 共用备选答案)

- A. 保真汤
- B. 生脉饮
- C. 补天大造丸
- D. 百合固金汤
- E. 月华丸

71. 肺结核肺阴亏损证, 治疗首选方剂是

72. 肺结核气阴耗伤证, 治疗首选方剂是

(73~74 共用备选答案)

- A. >5ml
- B. 50~100ml
- C. 250~300ml
- D. 400~500ml
- E. >1000ml

73. 上消化道出血患者出现呕血, 估计其出血量为

74. 上消化道出血患者出现黑便, 估计其出血量为

(75~76 共用备选答案)

- A. 丙硫氧嘧啶

B. 放射性 ^{131}I

C. 手术

D. 碘剂

E. 阿替洛尔

75. 治疗妊娠期甲状腺功能亢进症, 应首选的治疗措施是

76. 甲状腺肿大显著, 有压迫症状者, 治疗应首选的措施是

(77~78 共用备选答案)

A. 尿糖

B. 糖化血红蛋白

C. 糖化血浆白蛋白

D. 空腹血糖

E. 餐后血糖

77. 可反映患者近 8~12 周总的血糖水平的指标是

78. 可反映患者近 2~3 周总的血糖水平的指标是

(79~80 共用备选答案)

A. 0.9%氯化钠溶液+5%葡萄糖溶液+5%碳酸氢钠溶液

B. 0.9%氯化钠溶液+10%葡萄糖溶液+5%碳酸氢钠溶液

C. 0.9%氯化钠溶液+5%葡萄糖溶液

D. 0.9%氯化钠溶液+5%碳酸氢钠溶液

E. 0.45%氯化钠溶液+5%碳酸氢钠溶液

79. 治疗等渗性失水, 应首选的液体是

80. 治疗低渗性失水, 应首选的液体是

(81~82 共用备选答案)

A. 100%

B. 90%~70%

C. 70%~50%

D. 50%~30%

E. 30%以下

81. 中度急性有机磷杀虫药中毒时胆碱酯酶活性是

82. 重度急性有机磷杀虫药中毒时胆碱酯酶活性是

(83~84 共用备选答案)

- A. 溶血性贫血
- B. 出血
- C. 白细胞减少
- D. 再生障碍性贫血
- E. 血液凝固障碍

83. 阿司匹林药物中毒的表现是

84. 水杨酸类药物中毒的表现是

(85~86 共用备选答案)

- A. 形成磷酸化胆碱酯酶
 - B. 水解大量 ACh
 - C. 兴奋交感神经系统
 - D. 抑制心血管运动中枢
 - E. 引起组织缺氧
85. 有机磷杀虫药中毒的主要机制是
86. 一氧化碳中毒的主要病理改变是

(87~88 共用备选答案)

- A. 补阳还五汤
- B. 镇肝熄风汤
- C. 安宫牛黄丸合羚羊角汤
- D. 涤痰汤送服苏合香丸
- E. 星萎承气汤

87. TIA 肝肾阴虚，风阳上扰证，治疗应首选的方剂是

88. TIA 气虚血瘀，脉络瘀阻证，治疗应首选的方剂是

(89~90 共用备选答案)

- A. 五皮饮
- B. 小半夏加茯苓汤
- C. 桃红四物汤

D. 天麻钩藤饮

E. 羚角钩藤汤

89. 治疗慢性肾衰肝风证, 应首选的方剂是

90. 治疗慢性肾衰血瘀证, 应首选的方剂是

(91~92 共用备选答案)

A. 动脉硬化

B. 风湿性心脏病

C. 高血压

D. 左房室瓣关闭不全

E. 动脉瘤

91. 脑栓塞的常见病因是

92. 蛛网膜下腔出血的常见病因是

(93~94 共用备选答案)

A. 丙戊酸钠

B. 氯硝西洋

C. 卡马西平

D. 苯妥英钠

E. 乙琥胺

93. 治疗癫痫强直性发作, 应首选的药物是

94. 治疗癫痫阵挛性发作, 应首选的药物是

(95~96 共用备选答案)

A. 导痰汤

B. 补阳还五汤

C. 大定风珠

D. 地黄饮子

E. 八珍汤合天麻钩藤饮

95. 帕金森病风痰阻络证治疗首选方剂是

96. 帕金森病血瘀动风证治疗首选方剂是

(97~98 共用备选答案)

A. 洗心汤

B. 还少丹

C. 七福饮

D. 通窍活血汤

E. 知柏地黄丸

97. 血管性痴呆脾肾两虚证, 治疗首选方剂是

98. 血管性痴呆肝肾阴虚证, 治疗首选方剂是

(99~100 共用备选答案)

A. 局灶性癫痫

B. 梅尼埃病

C. 心脏疾病

D. 发作性睡病

E. 颅内肿瘤

99. 常表现为持续数秒至数分钟的肢体抽搐, 从躯体的一处开始并向周围扩散的疾病是

100. 以发作性眩晕、恶心、呕吐为主要表现, 但每次发作持续时间往往超过 24 小时的疾病是

答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 A

【答案解析】 肺结核之气阴耗伤证的治法：益气养阴。方药：保真汤加减。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】 胸部 X 线检查是发现肺癌的最基本方法。

3. 【正确答案】 C

【答案解析】 慢性肺心病痰热郁肺证

证候：喘息气粗，烦躁，胸满，咳嗽，痰黄或白，黏稠难咳，或身热，微恶寒，有汗不多，溲黄便干，口渴，舌红，舌苔黄或黄腻，边尖红，脉数或滑数。

治法：清肺化痰，降逆平喘。

方药：越婢加半夏汤加减。

4. 【正确答案】 D

【答案解析】 肺癌阴虚毒热证

证候：咳嗽，无痰或少痰，或有痰中带血，甚则咯血不止，肺中积块，心烦，少寐，手足心热，或低热盗汗，或邪热炽盛，羁留不退，口渴，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉细数或数大。

治法：养阴清热，解毒散结。

方药：沙参麦冬汤合五味消毒饮。

5. 【正确答案】 E

【答案解析】 原发性肺脓肿起病急，伴高热，咳大量脓痰，中毒症状明显，胸片上表现为薄壁空洞，内有液平，周围有炎症改变。癌性空洞常先有咳嗽、咯血等肿瘤症状，后出现咳脓痰、发热等继发感染症状。胸片可见癌肿块影有偏心空洞，壁厚，内壁凹凸不平。故二者主要是通过 X 线检查或痰液细胞学检查来鉴别。

6. 【正确答案】 C

【答案解析】 β_2 受体激动剂通过对气道平滑肌和肥大细胞等细胞膜表面的 β_2 受体的作用,舒张气道平滑肌、减少肥大细胞和嗜碱性粒细胞脱颗粒和介质的释放、降低微血管的通透性、增加气道上皮纤毛的摆动等,缓解哮喘症状。

7. 【正确答案】C

【答案解析】肺上叶后段和下叶背段的是结核好发部位。

8. 【正确答案】B

【答案解析】各种类型的心肌炎及心肌病均可导致心力衰竭,以病毒性心肌炎及原发性扩张型心肌病最为常见。

9. 【正确答案】B

【答案解析】心源性水肿常始于身体的低垂部位,称为“下垂性水肿”,并伴有颈静脉怒张、肝-颈静脉反流征阳性等上腔静脉回流受阻的体征;肾性水肿则首先出现于皮下的疏松组织如眼睑等处;肝病性水肿突出的表现为腹水,营养不良性水肿则常伴有低蛋白血症等。

10. 【正确答案】C

【答案解析】心脏性猝死的临床过程常分为4期:前驱期、发病期、心脏骤停期和生物学死亡期。

11. 【正确答案】B

【答案解析】心脏神经症:隐痛或短暂刺痛,部位多变,胸痛多在活动后或劳累后出现,而非运动当时发生。多数做轻微体力活动可有所缓解,硝酸甘油治疗无效或10钟后起效,常伴有其他神经衰弱症状,心脏检查均为阴性。

12. 【正确答案】D

【答案解析】心肌梗死的并发症:(1)乳头肌功能不全或断裂;(2)心室壁瘤;(3)心肌梗死后综合征;(4)栓塞;(5)心脏破裂。

13. 【正确答案】E

【答案解析】病毒性心肌炎之阴阳两虚证的方药是:参附养荣汤加味。

14. 【正确答案】A

【答案解析】心脏瓣膜病二尖瓣狭窄最常见病因为风湿热。先天性畸形或结缔组织病,如系统性红斑狼疮心内膜炎为二尖瓣狭窄的罕见病因。

15. 【正确答案】E

【答案解析】肝性脑病是肝硬化最严重的并发症，亦是最常见的死亡原因。主要临床表现为性格行为失常、意识障碍、昏迷。

16. 【正确答案】C

【答案解析】溃疡性结肠炎是一种直肠和结肠慢性非特异性炎症性疾病，病变主要累及大肠黏膜和黏膜下层。主要表现为腹泻、腹痛和黏液脓血便。

17. 【正确答案】D

【答案解析】溃疡性结肠炎有“疼痛-便意-便后缓解”的规律。

18. 【正确答案】B

【答案解析】溃疡性结肠炎阴血亏虚证治法为滋阴养血，清热化湿，方药首选驻车丸。

19. 【正确答案】E

【答案解析】幽门螺杆菌（HP）感染是慢性胃炎的最主要病因。

20. 【正确答案】A

【答案解析】上消化道出血可归属于中医学“呕血”、“黑便”、“便血”等范畴。

21. 【正确答案】D

【答案解析】本病发病一般较缓，病位在胃，与肝、脾、肾等脏关系密切。

22. 【正确答案】C

【答案解析】十二指肠溃疡腹痛多于进食或服用抗酸药后缓解，消化性溃疡患者中幽门螺杆菌感染率高，所以十二指肠溃疡的治疗最重要的是抑制胃酸和根除幽门螺杆菌。

23. 【正确答案】E

【答案解析】手术切除仍是目前根治原发性肝癌的最好方法。

24. 【正确答案】D

【答案解析】出现下列指征的急性肾衰患者，应考虑进行急诊透析：①少尿或无尿2天；②尿毒症症状明显；③肌酐清除率较正常下降超过50%，或血尿素氮升高达21mmol/L，血肌酐升高达442umol/L；④血钾超过6.5mmol/L；⑤代谢性酸中毒，二氧化碳结合力 \leq 13mmol/L；⑥脑水肿、肺水肿或充血性心力衰竭。

25. 【正确答案】B

【答案解析】急性肾衰竭患者尿量超过 400ml 时，则由少尿期进入多尿期。

26. 【正确答案】A

【答案解析】急性肾衰竭病因

(1) 肾前性急性肾衰：血容量减少（如各种原因的液体丢失和出血）、有效动脉血容量减少和肾内血流动力学改变等。

(2) 肾性急性肾衰：肾实质损伤，常见的是肾缺血或肾毒性物质（包括外源性毒素，如生物毒素、化学毒素、抗菌药物、造影剂等和内源性毒素，如血红蛋白、肌红蛋白等）损伤肾小管上皮细胞。

(3) 肾后性急性肾衰：特征是急性尿路梗阻。

27. 【正确答案】E

【答案解析】慢性肾衰竭的治疗：肾移植：成功的肾移植会恢复正常的肾功能（包括内分泌和代谢功能），可使患者几乎完全康复。

28. 【正确答案】D

【答案解析】尿路感染最常见于育龄期妇女。

29. 【正确答案】B

【答案解析】治疗急性膀胱炎可选用磺胺类、喹诺酮类、半合成青霉素或头孢类等抗生素，任选一种药物，连用 3 天，约 90% 的患者可治愈。目前更推荐此法，与单剂量疗法相比，3 日疗法更有效；耐药性并无增高；可减少复发，增加治愈率。

30. 【正确答案】B

【答案解析】肾病综合征的发病是由脏腑功能失调、水液代谢失常所致。主要表现为肺脾肾三脏功能失调。

31. 【正确答案】E

【答案解析】贮存铁的形式主要为铁蛋白，其次是含铁血黄素，临床常用铁蛋白测定来衡量铁的贮存量。含铁血黄素是变性或部分去蛋白质的铁蛋白，骨髓中可染铁即是分布于骨髓小粒的含铁血黄素。

32. 【正确答案】E

【答案解析】再生障碍性贫血是全血细胞减少，一般无脾肿大，骨髓检查显示至少一部位增生减低或重度减低，骨髓小粒成分中见非造血细胞增多。故选择 E。

33. 【正确答案】A

【答案解析】再生障碍性贫血的血象：多呈全血细胞减少，发病早期可一系或二系减少。骨髓象：多部位骨髓增生减少，粒、红系及巨核细胞明显减少且形态大致正常。

34. 【正确答案】C

【答案解析】高白细胞性白血病在化疗同时给予别嘌醇，从而抑制尿酸合成。

35. 【正确答案】A

【答案解析】正常骨髓造血功能受抑制表现：（1）贫血，（2）发热，（3）出血。

36. 【正确答案】D

【答案解析】特发性血小板减少性紫癜血小板相关补体阳性，主要抗体成分为IgG，亦可为IgM，偶有两种以上抗体同时出现。

37. 【正确答案】B

【答案解析】特发性血小板减少性紫癜常见病因：感染、免疫因素、肝脾的作用、其他因素，如雌激素等。

38. 【正确答案】D

【答案解析】慢性期可见关节间隙狭窄、关节面不规则、痛风石沉积，典型者骨质呈类圆形穿凿样或虫噬样缺损、边缘呈尖锐的增生钙化，为尿酸盐侵蚀骨质所致。严重者出现脱位、骨折。

39. 【正确答案】C

【答案解析】痛风的中医病因为：风寒湿阻，风湿热郁，痰瘀痹阻，肝肾亏虚。

40. 【正确答案】B

【答案解析】甲亢主要临床表现有：高代谢症候群、弥漫性甲状腺肿、眼征和胫前黏液性水肿。甲状腺危象为甲亢的特殊临床表现。

41. 【正确答案】E

【答案解析】高钾血症是指血清钾浓度 $>5.5\text{mmol/L}$ 的一种病理生理状态。

42. 【正确答案】C

【答案解析】中度高渗性失水：失水量相当于体重的4%~6%。

43. 【正确答案】A

【答案解析】代谢性酸中毒是指细胞外液的 H^+ 相对过多，或者是 HCO_3^- 丧失过多

而引起的一种酸碱平衡紊乱。代谢性酸中毒代偿阶段可无症状,只有化验值改变。失代偿后,除原发病表现外,轻者可仅感头痛、乏力、心率增快、呼吸加深、胃纳不佳。呼吸增强是代谢性酸中毒的重要临床表现。

44. 【正确答案】 C

【答案解析】滑囊液检查具有确诊意义,为痛风诊断的“金标准”。

45. 【正确答案】 D

【答案解析】痹证之风寒湿阻证的治法:祛风散寒,除湿通络。方药:蠲痹汤加减。

46. 【正确答案】 E

【答案解析】血管性痴呆肝肾阴虚证的治法:补益肝肾。方药:知柏地黄丸加减。

47. 【正确答案】 D

【答案解析】癫痫之瘀阻脑络证的方药:通窍活血汤加减。

48. 【正确答案】 B

【答案解析】短暂性脑缺血发作:每次发作历时短暂,持续数分钟至1小时,在24小时内即完全恢复。

49. 【正确答案】 C

【答案解析】短暂性脑缺血发作痰瘀互结,阻滞脉络证的方药:黄连温胆汤合桃红四物汤加减。

50. 【正确答案】 A

【答案解析】脑血栓形成之阴虚风动证的方药:镇肝熄风汤加减。

51. 【正确答案】 B

【答案解析】脑栓塞无前驱症状,突然发病,病情进展迅速且多在数秒至数分钟内达高峰。

52. 【正确答案】 B

【答案解析】MRI可清晰显示脑干病灶、对病灶进行准确定位,并能区分陈旧性腔隙系由于腔隙性梗死亦或颅内小出血所致,是最有效的检查手段。

53. 【正确答案】 D

【答案解析】颅脑CT是确诊蛛网膜下腔出血的首选诊断方法。CT显示蛛网膜下腔内高密度影可以确诊蛛网膜下腔出血。

54. 【正确答案】C

【答案解析】血管性痴呆之髓海不足证的方药：七福饮加减。

55. 【正确答案】A

【答案解析】防止急性CO中毒后脑水肿首选甘露醇。

56. 【正确答案】E

【答案解析】急性一氧化碳重度中毒：血COHb浓度高于50%。呈深昏迷状态，各种反射消失。

57. 【正确答案】C

【答案解析】CO中毒主要引起组织缺氧。

58. 【正确答案】A

【答案解析】毒物接触史是诊断中毒的重要依据。

59. 【正确答案】E

【答案解析】血液胆碱酯酶活性可作为有机磷杀虫药中毒的参考指标。轻度中毒，ChE活力为50%~70%。中度中毒，ChE活力为30%~50%。重度中毒全血或红细胞ChE活力<30%。

60. 【正确答案】B

【答案解析】阿托品主要作用于外周M胆碱能受体，缓解M样症状。

61. 【正确答案】D

【答案解析】肝肾综合征指发生在严重肝病基础上的肾衰竭，但肾脏本身并无器质性损害，又称功能性肾衰竭。主要见于合并顽固腹水的晚期肝硬化或急性肝功能衰竭的患者。

62. 【正确答案】C

【答案解析】纤维结肠镜检查是溃疡性结肠炎最有价值的诊断方法。钡剂灌肠检查为溃疡性结肠炎重要的诊断方法。

63. 【正确答案】E

【答案解析】慢性胃炎起病隐匿，病程迁延，慢性病程；大多没有明显症状，无特异性；症状与病理改变分级无明显相关。

64. 【正确答案】B

【答案解析】复合性溃疡指胃和十二指肠同时发生的溃疡。

65. 【正确答案】E

【答案解析】房颤：①P波消失，代之以大小不等、形态不同、间隔不等的f波，频率为350~600次/分；②QRS波、T波形态为室上性，但QRS可增宽畸形（室内差异传导）；③心室率快而不规则，多在100次/min以上；④当心室率极快而无法辨别f波时，主要根据心室率完全不规则及QRS与T波形态为室上性诊断。

66. 【正确答案】B

【答案解析】CO中毒主要引起组织缺氧。

二、B型题

（67~68 共用备选答案）

67. 【正确答案】C

【答案解析】硝普钠是既能扩张动脉，又能扩张静脉的药物，同时减轻前后负荷。

68. 【正确答案】D

【答案解析】硝酸甘油是主要扩张静脉的药物，选择性扩张冠状动脉。

（69~70 共用备选答案）

69. 【正确答案】A

【答案解析】慢性胆囊炎和胆石症疼痛位于右上腹，多在进食油腻后加重，并放射至背部，可伴发热、黄疸、墨菲征阳性。胆囊B超和逆行胆道造影有助于鉴别。

70. 【正确答案】C

【答案解析】典型的消化性溃疡的临床特点：慢性反复发作过程、周期性发作和节律性发作。

（71~72 共用备选答案）

71. 【正确答案】E

【答案解析】肺结核之肺阴亏损证的治法：滋阴润肺。方药：月华丸加减。

72. 【正确答案】A

【答案解析】肺结核之气阴耗伤证的治法：益气养阴。方药：保真汤加减。

（73~74 共用备选答案）

73. 【正确答案】C

【答案解析】成人每日消化道出血>5ml即可出现粪便隐血试验阳性，每日出血量50~100ml可出现黑便，胃内蓄积血量在250~300ml可引起呕血。

74. 【正确答案】B

【答案解析】成人每日消化道出血 $>5\text{ml}$ 即可出现粪便隐血试验阳性，每日出血量 $50\sim 100\text{ml}$ 可出现黑便，胃内蓄积血量在 $250\sim 300\text{ml}$ 可引起呕血。

(75~76 共用备选答案)

75. 【正确答案】A

【答案解析】抗甲状腺药物适用于妊娠妇女。

76. 【正确答案】C

【答案解析】甲状腺肿大显著，有压迫症状应手术治疗。

(77~78 共用备选答案)

77. 【正确答案】B

【答案解析】糖化血红蛋白反映患者近 $8\sim 12$ 周总的血糖水平。

78. 【正确答案】C

【答案解析】糖化血浆白蛋白反映患者近 $2\sim 3$ 周总的血糖水平。

(79~80 共用备选答案)

79. 【正确答案】A

【答案解析】等渗性失水：可选用 0.9% 氯化钠溶液 $1000\text{ml}+5\%$ 葡萄糖溶液 $500\text{ml}+5\%$ 碳酸氢钠溶液 100ml 配成溶液使用。

80. 【正确答案】B

【答案解析】等渗性失水：可选用 0.9% 氯化钠溶液 $1000\text{ml}+5\%$ 葡萄糖溶液 $500\text{ml}+5\%$ 碳酸氢钠溶液 100ml 配成溶液使用。低渗性失水：以补充高渗性溶液为主。可在上述等渗性失水所配的溶液中，用 10% 葡萄糖注射液 250ml 替换 5% 葡萄糖溶液 500ml 。

(81~82 共用备选答案)

81. 【正确答案】D

【答案解析】急性 OPI 中毒时，ChE 活力值在 $70\%\sim 50\%$ 为轻度中毒， $50\%\sim 30\%$ 为中度中毒， 30% 以下为重度中毒。

82. 【正确答案】E

【答案解析】急性 OPI 中毒时，ChE 活力值在 $70\%\sim 50\%$ 为轻度中毒， $50\%\sim 30\%$ 为中度中毒， 30% 以下为重度中毒。

(83~84 共用备选答案)

83. 【正确答案】 B

【答案解析】 出血：阿司匹林、氢氯噻嗪及抗肿瘤药物等中毒。

84. 【正确答案】 E

【答案解析】 血液凝固障碍：可由水杨酸类、肝素或双香豆素过量、敌鼠和蛇毒咬伤中毒等引起。

(85~86 共用备选答案)

85. 【正确答案】 A

【答案解析】 OPI 中毒机制，主要是在人体内迅速与 ChE 结合，形成磷酰化胆碱酯酶，磷酰化胆碱酯酶不能水解 ACh，引起 ACh 蓄积，出现相应的临床表现。

86. 【正确答案】 E

【答案解析】 CO 中毒主要引起组织缺氧。

(87~88 共用备选答案)

87. 【正确答案】 B

【答案解析】 短暂性脑缺血发作之肝肾阴虚，风阳上扰证的方药是镇肝熄风汤加减。

88. 【正确答案】 A

【答案解析】 短暂性脑缺血发作之气虚血瘀，脉络瘀阻证的方药是补阳还五汤加减。

(89~90 共用备选答案)

89. 【正确答案】 D

【答案解析】 慢性肾衰之肝风证的治法：镇肝息风。方药：天麻钩藤饮加减。

90. 【正确答案】 C

【答案解析】 慢性肾衰之血瘀证的治法：活血化瘀。方药：桃红四物汤加减。

(91~92 共用备选答案)

91. 【正确答案】 B

【答案解析】 脑栓塞常见病因是风湿性心脏病、左房室瓣狭窄。

92. 【正确答案】 E

【答案解析】 蛛网膜下腔出血常见原因是动脉瘤。

(93~94 共用备选答案)

93. 【正确答案】 C

【答案解析】 根据癫痫发作类型选择用药：①GTCS 首选药物为丙戊酸钠，次选苯妥英钠、卡马西平。②典型失神发作及肌阵挛发作首选丙戊酸钠，次选乙琥胺、氯硝西洋；非典型失神发作首选乙琥胺或丙戊酸钠，次选氯硝西洋。③部分性发作和继发全面性发作首选卡马西平，其次为苯妥英钠、丙戊酸钠或苯巴比妥。④强直性发作首选卡马西平，其次为苯妥英钠、丙戊酸钠。⑤阵挛性发作首选丙戊酸钠，其次为苯妥英钠、卡马西平或苯巴比妥。

94. 【正确答案】 A

【答案解析】 根据癫痫发作类型选择用药：①GTCS 首选药物为丙戊酸钠，次选苯妥英钠、卡马西平。②典型失神发作及肌阵挛发作首选丙戊酸钠，次选乙琥胺、氯硝西洋；非典型失神发作首选乙琥胺或丙戊酸钠，次选氯硝西洋。③部分性发作和继发全面性发作首选卡马西平，其次为苯妥英钠、丙戊酸钠或苯巴比妥。④强直性发作首选卡马西平，其次为苯妥英钠、丙戊酸钠。⑤阵挛性发作首选丙戊酸钠，其次为苯妥英钠、卡马西平或苯巴比妥。

(95~96 共用备选答案)

95. 【正确答案】 A

【答案解析】 帕金森病风痰阻络证的方药：导痰汤加减。

96. 【正确答案】 B

【答案解析】 帕金森病血瘀动风证的方药：补阳还五汤加减。

(97~98 共用备选答案)

97. 【正确答案】 B

【答案解析】 血管性痴呆脾肾两虚证的方药：还少丹加减。

98. 【正确答案】 E

【答案解析】 血管性痴呆肝肾阴虚证的方药：知柏地黄丸加减。

(99~100 共用备选答案)

99. 【正确答案】 A

【答案解析】 局灶性癫痫：常表现为持续数秒至数分钟的肢体抽搐，从躯体的一处开始，并向周围扩展。24 小时脑电图监测有局限性癫痫放电则可确诊为癫痫；

CT 或 MRI 检查可发现脑内局灶性病变。

100. 【正确答案】B

【答案解析】梅尼埃病：发作性眩晕、恶心、呕吐，但每次发作持续时间往往超过 24 小时，可达 3~4 天，伴有耳鸣、耳阻塞感、听力减退等症状，除眼球震颤外，无其他神经系统定位体征。发病年龄多在 50 岁以下。



正保医学教育网

www.med66.com