

外科主治医师《专业知识》模考试卷

一、A1

1. 伤后下肢处于缩短，外展、极度外旋位。最可能的是

- A. 股骨上中段骨折
- B. 股骨髁上骨折
- C. 股骨颈骨折
- D. 股骨粗隆间骨折
- E. 股骨上 1/3 骨折

2. 髋关节的特殊检查方法不包括

- A. Thomas 征
- B. 下肢短缩试验
- C. Allis 征
- D. 抽屉实验
- E. 髂胫束挛缩试验

3. 单腿站立试验用于检查

- A. 半月板损伤
- B. 先天性髋脱位
- C. 脊柱侧弯
- D. 腰大肌脓肿
- E. 腰椎结核

4. 斜扳试验阳性说明

- A. 腰骶关节病变
- B. 髋关节病变
- C. 骶髂关节病变
- D. 坐骨神经病变
- E. 腰椎病变



5. 骨盆损伤易于并发休克，最主要的原因是

- A. 骨盆骨折患者常合并下肢骨折
- B. 骨盆处骨质为松质骨，骨折后出血多
- C. 盆壁的血管及静脉丛丰富，且静脉丛无瓣膜
- D. 盆壁的神丛丰富，有股神经及坐骨神经穿过，疼痛剧烈而出现休克
- E. 骨盆骨折患者多合并腹腔脏器损伤

6. 膝关节半月板损伤的临床表现不包括

- A. 多见于运动员与体力劳动者
- B. 膝关节剧痛，不能伸直，迅速肿胀，可有节内积血
- C. 慢性阶段活动时可有弹响
- D. 有关节交锁现象
- E. 慢性阶段的体征有膝关节屈曲痉挛和股外侧肌废用性萎缩

7. 骨盆骨折后查体，最重要的体征是

- A. 骨擦音及骨擦感
- B. 畸形
- C. 反常活动
- D. 局部压痛及间接挤压痛
- E. 肿胀及瘀斑

8. 腓总神经损伤表现为

- A. 爪形手畸形
- B. 垂腕手畸形
- C. 猿手畸形
- D. 内翻垂足畸形
- E. 仰趾畸形

9. 关于周围神经损伤的分类, 哪项是错误的

- A. 神经失用症
- B. 神经轴突中断
- C. 神经传导功能障碍
- D. 神经震荡
- E. 神经断裂

10. 肌电图或诱发电位主要是检查

- A. 肌肉损伤
- B. 肌腱损伤
- C. 骨关节损伤
- D. 炎症
- E. 周围神经损伤

11. 关于人工髋关节置换, 下列说法正确的是

- A. 化脓性髋关节炎可清创的同时行人工髋关节置换术
- B. 25 岁, 股骨头骨骺滑脱需行人工髋关节置换术
- C. 66 岁, 股骨头坏死, 髋关节损伤, 屈曲畸形, 可行人工髋关节置换术
- D. 30 岁, 转子间粉碎性骨折, 可行人工髋关节置换术
- E. 70 岁, 股骨颈头下型骨折, 不可一期行人工髋关节置换术

12. 人工髋关节置换术后股骨骨折以哪型最多见

- A. 股骨粗隆区
- B. 股骨粗隆区和人工股骨柄之间
- C. 人工股骨柄远端
- D. 混合型
- E. 对侧股骨

13. 髋关节置换术绝对禁忌证包括

006501888

- A. 糖尿病
- B. 肥胖
- C. 冠心病
- D. 全身或局部任何活动性感染
- E. 高血压

14. 人工膝关节置换术适应证不包括

- A. 骨关节炎
- B. 血友病性关节炎
- C. 类风湿性关节炎
- D. 无症状膝关节强直
- E. 大骨节病

15. 肘管综合征的治疗，错误的是

- A. 非类固醇抗炎镇痛
- B. 纠正不良姿势，防止肘关节长时间过度屈曲
- C. 纠正尺神经受压体位
- D. 予维生素 B₁、维生素 B₁₂ 治疗
- E. 严重者手术治疗，术后伸肘位支具固定 3 周

16. 肩周炎与颈椎病的鉴别，肩周炎不可能出现

- A. 三角肌萎缩
- B. 前臂和手疼痛
- C. 斜方肌痉挛
- D. 大范围活动时，疼痛加剧
- E. 肩痛及上臂痛

17. 腕管综合征的手术治疗指征不包括

- A. 腕管内腱鞘囊肿

006501888

B. 病程长的慢性滑膜炎

C. 良性肿瘤

D. 疼痛剧烈者

E. 异位的肌腹

18. 肩周炎不正确的治疗方法是

A. 服用非甾体抗炎药物

B. 封闭

C. 理疗

D. 按摩

E. 限制肩关节活动

19. 慢性腰肌劳损的临床表现，错误的是

A. 反复发作，时轻时重

B. 主要表现为患处疼痛、压痛和功能障碍

C. 腰部酸胀疼痛

D. 疼痛范围局限

E. 局部常有僵硬感，腰部活动受限

20. 中央型腰椎间盘突出症出现马尾神经受压症状，治疗方法应选择

A. 卧床休息

B. 推拿按摩

C. 手术

D. 骶管治疗

E. 腰背肌锻炼

21. 引发腰椎间盘突出症的最基本的因素是

A. 腰骶部发育异常

B. 吸烟

006501888

C. 椎间盘退行性变

D. 遗传因素

E. 外伤

22. 腰椎管狭窄的典型表现是

A. 平地行走时间歇性跛行

B. 腰痛

C. 骑自行车时无症状

D. 上楼梯时间歇性跛行

E. 腿痛

23. 有关急性骨髓炎哪项正确

A. 最常见的致病菌是乙型链球菌

B. 多发生在骨干

C. 主要的感染途径是经血液循环

D. 老年人抵抗力弱，最易发病

E. 主要的感染途径是淋巴系统

24. 形成急性血源性骨髓炎大块死骨的原因主要为

A. 骨膜血管断裂

B. 骨的滋养血管栓塞

C. 脓肿直接破坏骨组织

D. 病理骨折

E. 机体抵抗力差

25. 急性血源性骨髓炎的最常见的发病部位是

A. 尺骨、桡骨

B. 脊椎骨

C. 胫骨近端、股骨远端

006501888

D. 髌骨

E. 胫骨远端、肱骨近端

26. 慢性骨髓炎迁延不愈、反复发作的最主要原因是

A. 死骨的残留

B. 窦道的形成

C. 细菌毒力强

D. 机体抵抗力差

E. 瘢痕组织增生

27. 下列不是骨与关节结核手术适应证的是

A. 明显的死骨和脓肿形成

B. 窦道流脓经久不愈

C. 早期全关节结核，为挽救关节

D. 脊椎结核引起脊髓受压

E. 全身中毒症状严重，衰弱，重度贫血

28. 关于骨与关节结核的描述，错误的是

A. 最常见的肺外继发性结核

B. 脊柱结核最常见，其次是膝关节结核和髋关节结核

C. 结核杆菌一般通过淋巴循环到达骨与关节

D. 最初的病理变化是单纯性滑膜结核或单纯性骨结核

E. 最终可出现破溃，产生瘘管或窦道

29. 关于膝关节结核的影像学及关节镜检查中，错误的是

A. 早期 X 线示髌上囊肿胀和局限性骨质疏松

B. 后期 X 线示关节间隙消失，严重时出现胫骨前脱位

C. MRI 检查可清晰显示病灶部位、有无空洞和死骨形成

D. 关节镜检查对早期诊断具有独特价值

E. MRI 具有早期诊断价值

30. 大骨节病病情监测对象的年龄范围是

- A. 1~5 岁
- B. 5~10 岁
- C. 7~15 岁
- D. 7~12 岁
- E. 1~13 岁

31. 骨关节炎最先出现病理改变的关节组织是

- A. 骨组织
- B. 软骨组织
- C. 滑膜组织
- D. 韧带
- E. 关节囊

32. 骨关节炎的最主要症状是

- A. 疼痛
- B. 晨僵
- C. 关节肿胀
- D. 骨摩擦音
- E. 活动受限

33. 骨关节炎的药物治疗中非特异性药物不包括

- A. 解热镇痛药
- B. 非甾体类消炎药
- C. 糖皮质激素
- D. 麻醉性镇痛药
- E. 双醋瑞因

34. 类风湿性关节炎的诊断标准共计 7 项，典型病例应具备其中几项

- A. 四项
- B. 五项
- C. 六项
- D. 七项
- E. 三项

35. 颈部损伤出现呼吸困难，伤口流出带泡沫的血性液体，其原因是

- A. 动脉损伤
- B. 静脉损伤
- C. 喉上神经损伤
- D. 食管损伤
- E. 气管损伤

36. 类风湿关节炎是

- A. 关节痛：游走性，轻度红、肿、热，与天气变化有关
- B. 关节痛：多发性，有畸形及功能障碍；穿刺液：白细胞数增多，中性比例占 75%
- C. 关节痛：急性发作，高热，红肿明显，不能活动，白细胞高，关节液白细胞甚多，中性比例占 90%
- D. 关节附近痛：急性发作，高热，红肿不明显，深压痛，不愿意活动关节，白细胞明显增高
- E. 关节痛：病情缓慢，肿而不红；穿刺液：脓液

37. 强直性脊柱炎的 X 线表现特点是

- A. 常蔓延数个椎体，晚期增生明显，骨性融合成块
- B. 常累及多数椎骨，多同时伴有双骶髂关节病变。晚期韧带钙化呈“竹节样”
- C. 累及单个椎体，椎间隙正常，常有椎弓根破坏

D. 椎体破坏，可有死骨，椎体压缩呈楔形，椎间隙变窄

E. 骨质增生及间隙变窄，椎体边缘硬化，无骨质破坏

38. 有关脊柱侧凸的分类，下列选项不属于其分类的是

A. 总的分为结构性和非结构性侧凸两大类

B. 特发性脊柱侧凸最常见，又分为婴儿型、幼儿型和青少年型

C. 先天性脊柱侧凸又分为形成障碍型、分节不良型和混合型

D. 神经肌肉型脊柱侧凸包括肌营养不良、骨软骨营养不良

E. 间充质病变合并脊柱侧凸包括神经纤维瘤病合并脊柱侧凸、骨软骨营养不良合并脊柱侧凸、代谢性障碍合并脊柱侧凸、脊柱外组织挛缩合并脊柱侧凸和其他原因引起的脊柱侧凸

39. 自发性血气胸，胸腔闭式引流后有大量气体溢出，胸引量 200ml/h，持续 3 小时以上，此时应采取的处理措施为

A. 密切观察病情

B. 应用止血药物

C. 输血、输液

D. 胸腔镜探查

E. 纵隔镜探查

40. 近年来脓胸最常见的致病菌是

A. 肺炎链球菌

B. 金黄色葡萄球菌

C. 溶血性链球菌

D. 结核菌

E. 真菌

二、A2

006501888

41. 患者女，65岁，近半年反复出现头痛头晕，今晨在突然转头时感眩晕耳鸣，恶心呕吐，摔倒在地上，2分钟后缓解。既往曾有2次类似发作病史。X线检查：颈5-6椎体后缘骨折增生，椎间孔明显缩小。最可能的诊断是

- A. 椎动脉颈椎病
- B. 癫痫发作
- C. 神经根型颈椎病
- D. 脊髓型颈椎病
- E. 交感神经性颈椎病

42. 女，45岁，颈部不适，左肩及上肢放射痛伴感觉障碍，考虑神经根型颈椎病。以下治疗措施中哪一项不宜采用

- A. 颈椎牵引
- B. 局部理疗
- C. 颈肩部痛点局封
- D. 反复发作考虑手术
- E. 手法推拿

43. 男，55岁，右颈肩痛1年，伴右手麻3个月。查体：颈椎生理弧度消失，颈5~6棘突间压痛，右颈肩部肌肉紧张，右手掌桡侧皮肤感觉减退，右肱二头肌反射亢进，霍夫曼征(+)，诊断为颈椎病。在颈椎病的诊断中，以下哪一条是最可靠的依据

- A. 颈肩部疼痛
- B. X线片示有骨刺
- C. 患侧霍夫曼征(+)
- D. 手指麻木
- E. 颈部活动受限

44. 女性，40岁，连续行走时两侧臀腿痛，需间歇性下蹲休息2年。开始能连续行走半小时，随后间歇期逐渐缩短，现在行走200米就出现症状，平卧时无

症状。查体：腰椎 4~5 间隙压痛，无放射，直腿抬高左、右均达 70°，两下肢感觉、肌力均正常。其诊断考虑为

- A. 腰椎间盘突出
- B. 腰背部软组织劳损
- C. 腰椎管狭窄症
- D. 腰椎滑脱症
- E. 腰椎管肿瘤

45. 男，30 岁，左髋部疼痛 1 年，伴低热、盗汗、纳差及体重减轻。查：左髋关节呈屈曲畸形，活动受限，Thomas 征 (+)。红细胞沉降率 30mm/h。X 线片示左髋关节间隙变窄，关节面有骨质破坏，左髋臼有 2cm 大小空洞，内有坏死骨片。最可能的诊断是

- A. 化脓性髋关节炎
- B. 髋关节滑膜结核
- C. 髋关节骨型结核
- D. 全髋关节结核
- E. 类风湿性髋关节炎

46. 患者男性，60 岁，反复双膝关节疼痛 10 年，逐渐加重 3 年，活动时关节有弹响。体检：双膝关节骨摩擦音 (+)，但无明显红肿及压痛。血白细胞 $5.7 \times 10^9/L$ ，红细胞沉降率 18mm/h，RF 13.6U/L（正常值范围 0~15U/L）。首先考虑的诊断是

- A. 强直性脊柱炎
- B. 反应性关节炎
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 骨关节炎
- E. 类风湿关节炎

47. 男，20岁。左胸刀刺伤1小时。体格检查：血压60/38mmHg，心率120次/分，意识清醒，面色苍白。胸骨左缘第3肋间见1cm的伤口，无明显呼吸困难，气管略向右偏，左胸叩诊浊音，呼吸音明显减弱。心界略向右偏移，心音正常。胸片：左胸呈一片致密影，心脏外形正常。正确处理是

- A. 输液，输血并观察
- B. 纠正休克，剖胸探查
- C. 胸腔闭式引流
- D. 胸腔穿刺抽液
- E. 胸腔粗针穿刺抽气

48. 男性，27岁，晨起咳嗽后感到胸闷，并逐渐出现呼吸困难、疲软乏力。体格检查：左肺呼吸音消失。X线胸片示左肺压缩70%，并见中等量液平。为该患者行胸腔闭式引流术时，插管位置应在

- A. 锁骨中线第2肋间
- B. 锁骨中线第6肋间
- C. 腋前线、锁骨中线之间第6~8肋间
- D. 腋中线、后线之间第6~8肋间
- E. 随意定位

49. 右血胸患者，急诊入院。查体：P 120次/分，BP 10.7/6.7kPa，气管左移，输血同时做右胸闭式引流术，第1小时引流量200ml，第2小时为250ml，第3小时为180ml，血压虽经输血不见回升，此时最有效的处置是

- A. 继续输血补液
- B. 给止血药
- C. 给血管活性药
- D. 闭式引流加负压吸引
- E. 剖胸探查止血

006501888

50. 患者，男性，11岁。发热，胸痛，咳嗽约2周，近5天有呼吸困难。体温39℃，脉搏120次/分，呼吸30次/分，胸片见：第7肋高度有液平面，胸穿抽出稀薄脓汁，治疗方法主要是

- A. 全身抗生素治疗
- B. 全身支持疗法
- C. 胸腔内注入抗生素
- D. 胸腔穿刺排气
- E. 胸腔闭式引流

51. 患者，男，55岁，诊断为结节型肺泡细胞癌，其X线表现最可能是

- A. 片状阴影
- B. 多有空洞
- C. 类似肺炎
- D. 常伴有肺叶不张
- E. 与周围型肺癌相似

52. 男性，60岁，因咳嗽、痰中带血2个月来门诊就诊。胸部摄片示右上叶近肺门处有一6cm×6cm块影，形态不规则，边缘有毛刺。为进一步确诊，首选的检查方法是

- A. 支气管镜检
- B. 胸腔镜检查
- C. 痰细胞学检查
- D. 剖胸探查
- E. 抗生素、止血药治疗2周后，复查胸片

53. 男，68岁。体检胸片发现右肺下叶周围性结节，大小约2.5cm×2cm。最佳的确诊方法是

- A. 胸部CT检查
- B. 纤维支气管镜检查

006501888

C. 胸壁肺穿刺活检

D. 开胸探查

E. 胸腔镜手术探查

54. 男, 65 岁, 因左肺中央型肺癌行左全肺切除。术后 2 小时患者出现气急; 大汗淋漓, 阵阵咳嗽并咳出粉红色泡沫痰, 心率 110 次/分, 右肺闻及哮鸣音及细湿啰音; 腹部 B 超未见肝脾肿大, 此时首先要考虑的诊断是

A. 急性右心功能衰竭

B. 支气管胸膜瘘

C. 肺梗死

D. 急性肺水肿

E. 急性肺炎

55. 女性, 50 岁。因食管癌行手术切除治疗, 术后标本送病理检查。下列食管癌的病理诊断中, 不可能存在的是

A. 鳞癌

B. 腺癌

C. 鳞腺癌

D. 癌肉瘤

E. 移行细胞癌

56. 男性, 60 岁, 进行性吞咽困难 6 个月, 全面检查后确诊为晚期食管癌。下列哪一项不能作为晚期食管癌的诊断依据

A. 声音嘶哑

B. 持续胸背痛

C. 食管气管瘘

D. 完全性梗阻

E. 左锁骨上有坚硬、不能移动的肿大淋巴结

57. 女，40岁，间歇性吞咽困难半年，食管钡餐造影见食管下段半月形压迹，黏膜完整，可见“瀑布征”，提示最可能的诊断是

- A. 食管癌
- B. 食管裂孔疝
- C. 食管平滑肌瘤
- D. 贲门失弛缓症
- E. 食管良性狭窄

58. 患者，男，55岁，患颈上段食管癌。病人一般情况良好，应首选的治疗是

- A. 放疗+手术→放疗
- B. 放疗+手术→化疗
- C. 放疗→手术内分泌治疗
- D. 放疗
- E. 手术治疗

59. 女性，60岁，进行性吞咽困难3个月，钡餐食管检查示食管中段有7cm长不规则充盈缺损。最佳治疗方案为

- A. 先放射治疗后，3周内手术切除
- B. 放射治疗
- C. 手术切除
- D. 化学治疗
- E. 中医治疗

60. 患者，男，28岁。左胸刀扎伤后半小时来院就诊，胸片检查示左侧胸腔积液，行闭式引流后，即刻引出400ml不凝血，后急诊留院观察输液监测，此后4小时内，生命体征平稳，但每小时胸引流管均可引出约110ml血性液体。针对此患者，最佳的进一步处理的办法是

- A. 继续观察
- B. 开胸探查止血

006501888

C. 气管切开

D. 输血、输液、同时应用止血药物

E. 胸腔镜探查、止血治疗

61. 男性，19岁。高空坠落伤。查体：BP 70/50mmHg；HR 100次/分，躁动，双瞳孔等大，对光反射阳性，腹腔穿刺抽不出凝血，头CT检查示左额硬膜下血肿，血肿量约25ml，中线无明显移位。该病例最佳的处理方案是

A. 立即开颅清除血肿

B. 抗休克治疗的同时行开颅血肿清除术

C. 抗休克的同时先行开腹探查

D. 抗休克治疗至血压正常后再行手术

E. 开颅及开腹探查同时进行

62. 患者，女，50岁，大便时突然出现恶心呕吐、剧烈头痛、低热及畏光，2小时后出现右侧上睑下垂，意识朦胧，急诊来院。在采集病史时应特别注意询问

A. 头痛的部位

B. 家人有无类似发作

C. 有无高血压、动脉硬化史

D. 有无慢性颅内压增高，如头痛、呕吐及视力减退史

E. 有无全身慢性感染病灶

63. 患者，男性，45岁，因右侧肢体活动不利并伴感觉障碍，言语不清来院，查体：BP 180/100mmHg，右侧上、下肢活动不利，且肌力减退，向左侧看不清东西。CT看见高密度影。最可能的诊断是

A. 脑叶出血

B. 脑桥出血

C. 壳核出血

D. 颅内低压

E. 原发性脑干损伤

64. 患者，男，58岁。既往有高血压病史，在演讲时突发头痛、呕吐、右侧偏瘫。在急诊室检查时，患者出现昏迷，左侧瞳孔大，对光反射消失，考虑为

- A. 脑出血，左颞叶钩回疝
- B. 脑出血，右颞叶钩回疝
- C. 脑出血，小脑扁桃疝
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 颈内动脉血栓形成

65. 患者，男性，22岁，因从高处跌落右侧腰部摔伤，出现肉眼血尿，经保守治疗后血尿消失，但血压持续下降达80/50mmHg，血红蛋白、血细胞比容继续降低，右腰部出现肿块。下一步最重要的处理措施是

- A. 输血
- B. 继续观察
- C. 应用止血剂
- D. 抗休克+手术治疗
- E. 加强抗感染治疗

三、A3/A4

男性，38岁。右下肢麻木、发凉，间歇性跛行3年。吸烟史10年。

66. 患者初次门诊时，下列哪项对稳定患者的病情尤为重要

- A. 使用扩张血管剂
- B. 使用激素
- C. 使用免疫抑制剂
- D. 肢体保暖防寒
- E. 嘱患者戒烟

67. 1年后患者病情进一步发展，出现持续性疼痛，夜间尤甚，下肢肌肉萎缩，足背动脉搏动消失，临床诊断为血栓闭塞性脉管炎营养障碍期。其与下肢动脉硬化性闭塞症进行鉴别诊断的要点是

- A. 发病较年轻，病程长
- B. 较长的吸烟史
- C. 间歇性跛行
- D. 静息痛，夜间尤其剧烈
- E. 足背动脉搏动消失

68. 对患者行解张试验，皮温明显升高。因此，治疗宜采取

- A. 使用抑制交感神经药
- B. 使用血管扩张药
- C. 腰交感神经切除术
- D. 动脉内膜剥除术
- E. 截肢或截趾术

男性，55岁。高血压伴冠心病4年。于2天前在大排档吃饭时和人产生冲突，导致右下肢近腘窝处被刀刺伤，随后出现搏动性肿块，逐渐增大伴右下肢麻木，查体：下肢苍白，窝部搏动性肿块大小为3cm×4cm，附近有收缩期杂音。

69. 最可能的诊断为

- A. 动脉开放性损伤
- B. 动脉闭合性损伤
- C. 动静脉瘘
- D. 动脉假性动脉瘤
- E. 以上都不是

70. 动脉瘤从病理学观点可分为真性动脉瘤、假性动脉瘤和夹层动脉瘤夹层血肿三种类型。关于假性动脉瘤的概念下列说法正确的是

- A. 血管壁全层局部扩张
- B. 血管壁部分由纤维组织构成的局部扩张
- C. 动脉粥样硬化性动脉瘤
- D. 检查时有震颤并可听到连续性杂音
- E. 压迫动脉瘤出口部分出现血压升高，脉压缩小及脉率缓的现象

71. 根据患者的症状与体征，动脉瘤最典型体征是

- A. 肢体苍白
- B. 肢体感觉异常
- C. 搏动性肿块
- D. 肢体疼痛
- E. 肢体缺血

女性，42岁。6小时前经用力按压腹部包块后，腹部持续性痛伴下腹压痛入院，查体：腹股沟韧带下有一半球形突起，腹肌紧张，反跳痛，肠鸣音消失。

72. 初步诊断是

- A. 直疝
- B. 斜疝
- C. 股疝
- D. 卵巢囊肿蒂扭转
- E. 阑尾炎

73. 此时应考虑

- A. 股疝内容物血运不佳

006501888

B. 回纳疝内容物为大网膜并坏死

C. 嵌顿疝内容物未完全还纳

D. 肠坏死穿孔腹膜炎

E. 并发附件炎

74. 常用下列哪种方法给予纠正

A. McVay 法

B. Bassini 法

C. Halsted 法

D. 疝成形术

E. 手法复位

患者，男，35岁。10年来反复餐前疼痛，进食后缓解，常夜间痛，4小时前突然出现黑粪3次，总量300ml，急诊入院。

75. 患者考虑黑便原因为

A. 胃癌

B. 慢性萎缩性胃炎

C. 胃溃疡

D. 十二指肠溃疡

E. 肠息肉

76. 确诊最恰当的检查为

A. B超

B. 经食管超声

C. 纤维胃镜检查

D. 粪便潜血试验

E. 肠镜

77. 以下治疗不适宜的是

- A. 口服法莫替丁
- B. 给予止血药
- C. 立即行急诊手术
- D. 禁食水、必要时胃肠减压
- E. 补液抗休克治疗

女性，65岁。平素身体健康，近半年来食欲下降、乏力、消瘦，逐渐出现上腹部不适，进食后饱胀，胃镜检查发现胃大弯侧胃壁上2cm大小的块状肿物。与周围组织界限不清。

78. 该患者最可能的诊断是

- A. 胃溃疡
- B. 慢性胃炎
- C. 胃癌
- D. 胃大弯良性肿瘤
- E. 慢性胆囊炎

79. 如行根治手术，可以保留的淋巴结为

- A. 沿胃小弯淋巴结
- B. 肝总动脉周围淋巴结
- C. 幽门下区淋巴结
- D. 腹主动脉旁淋巴结
- E. 贲门左区淋巴结

006501888

80. 该疾病治疗最关键的是

- A. 彻底清除淋巴结
- B. 切除范围距肿瘤边缘 6~8cm
- C. 术后坚持化疗
- D. 早诊早治
- E. 设法保留部分胃底

女性，30岁。主阵发性脐周疼痛伴恶心呕吐、停止排便排气2天。2年前曾行阑尾切除术，术后间断发作腹部隐痛。查体：体温 36.9℃，脉搏 78 次/分，血压 110/70mmHg，腹部轻度膨隆，未见肠型，右下腹麦氏切口皮肤瘢痕愈合好，腹部无明显压痛，未扪及肿块，肠鸣音亢进，偶闻气过水声。白细胞 $8.1 \times 10^9/L$ 。

81. 下列各项诊断首先考虑的是

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 卵巢囊肿蒂扭转
- C. 结肠癌
- D. 粘连性肠梗阻
- E. 急性胰腺炎

82. 为明确诊断，首先应行哪一项辅助检查

- A. 纤维结肠镜检查
- B. 纤维十二指肠镜
- C. 立位腹部 X 线平片
- D. 腹部 B 超
- E. 以上均可

83. 入院治疗 24 小时后，患者感腹痛变为持续性，伴阵发性加重，排便 1 次，为暗红色稀便，查体：心率 105 次/分，血压 95/70mmHg，右下腹明显压痛、肌紧张，白细胞 $15.7 \times 10^9/L$ 。此时对该患者的处理应该

- A. 头孢类及喹诺酮类抗生素联合抗感染
- B. 加强镇痛、解痉治疗
- C. 低压灌肠、加用生植物油，观察 4 小时后再手术
- D. 急诊剖腹探查手术
- E. 不宜采取手术治疗

男，患者 50 岁。2 周前因急性阑尾炎，行手术治疗时，阑尾系膜出血，缝扎止血时致回肠末段血运障碍，行回肠部分切除吻合术，腹腔引流，间断性引出血性液每日约 200ml。查体：腹胀，右侧腹压痛，未触及肿块。肠鸣音弱，BP16/11kPa，P20 次/分，白细胞 $12 \times 10^9/L$ 。中性 80%。

84. 诊断首先应考虑为

- A. 粘连性肠梗阻
- B. 绞窄性肠梗阻
- C. 麻痹性肠梗阻
- D. 小肠吻合口狭窄，梗阻
- E. 以上都不是

85. 进一步检查首先应选择

- A. 腹部 X 线平片
- B. 超
- C. CT
- D. 钡剂灌肠
- E. 腹腔穿刺

86. 应采取主要措施

- A. 剖腹探查
- B. 支持疗法
- C. 腹腔灌洗
- D. 肠造口术
- E. 以上均不是

男，28岁。饱餐后劳动，突然腹部剧痛，恶心、呕吐6小时。痛苦面容，喜取胸膝位，血压80/60mmHg，脉搏122次/分，腹稍胀，脐左方可见一肿块，压痛、反跳痛、肌紧张，肝浊音界存在。

87. 最可能的诊断是

- A. 急性肺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性肠扭转
- D. 溃疡病急性穿孔
- E. 急性肠穿孔

88. 首选的诊断方法是

- A. 血液生化检查
- B. 腹部B超
- C. 上消化道钡透
- D. 血管造影
- E. 腹部X线片

89. 应选择的治疗措施是

- A. 胃肠减压

006501888

- B. 补液
- C. 输血
- D. 急诊手术
- E. 抗生素

患者，男性，57岁。腹部隐痛、腹胀伴便秘6个月。患者于半年前逐渐感腹部持续性隐痛，部位不确定，餐后可伴有腹胀不适。自出现上述症状以来，大便次数明显减少，曾自行服用健胃消食片未能缓解。入院后行气钡双重对比造影提示右半结肠盲肠部有充盈缺损，黏膜皱襞破坏征象。

90. 可能性最大的是

- A. 结肠癌
- B. 肠结核
- C. 克罗恩病
- D. 巨结肠
- E. 肠息肉

91. 根据题干表述，初步判断患者病理分型可能性最大的是

- A. 隆起型
- B. 浸润型
- C. 溃疡型
- D. 蕈伞型
- E. 乳头型

92. 若患者癌肿转移，最先转移的部位或器官是

- A. 肝脏
- B. 肺脏

006501888

- C. 骨骼
- D. 结肠旁淋巴结
- E. 肠系膜血管根部淋巴结

女性，63岁，因上腹隐痛并黏液血便4个月余入院，查体上腹部可扪及肿块。

X线钡剂灌肠示横结肠靠近脾曲处充盈缺损。

93. 其最可能的诊断为

- A. 结肠息肉
- B. 横结肠癌
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 肠阿米巴病
- E. Crohn病

94. 明确诊断的检查为

- A. 结肠镜
- B. 钡剂灌肠
- C. 腹平片
- D. 直肠指诊
- E. 直肠镜检

95. 确诊后选择手术治疗，其手术范围为

- A. 病变局部切除
- B. 病变肠段单纯切除
- C. 横结肠、降结肠及其系膜、大网膜
- D. 横结肠及其系膜，部分升结肠和降结肠、大网膜
- E. 升结肠造瘘并横结肠、降结肠、直肠及其系膜切除

男性，42岁。便秘2年余，1周前排便时出现肛门烧灼样痛，便后可缓解，之后又可再次出现疼痛，便纸上可见少量血迹。

96. 其最可能的诊断为

- A. 痔
- B. 肛瘘
- C. 肛裂
- D. 肛周脓肿
- E. 直肠癌

97. 此病人当前应行的治疗手段不包括

- A. 温水坐浴
- B. 口服液态石蜡
- C. 口服缓泻药
- D. 增加多纤维食物
- E. 肛管内括约肌切断术

患者，女性，30岁。3个月前体检时发现上腹包块，近半年出现上腹部胀满感，轻微压痛，恶心、呕吐。进一步检查诊断为肝包虫病。

98. 有关肝包虫病的特点，哪项不正确

- A. 牧区多，与饮食不洁有关
- B. 犬绦虫终宿主为人
- C. 肝包虫病约占棘球蚴病75%
- D. 囊肿破裂可引起过敏休克
- E. 可触及上腹肿块

99. 不属于肝包虫病的临床特征的是

- A. 男性、青壮年多见
- B. 有牧区工作或牛羊接触史
- C. 常为多发性，侵及两肝
- D. 超声波探查包块为囊性
- E. 皮内过敏试验常为阳性

100. 下列肝包虫病采取肝叶或肝部分切除术的指征，错误的是

- A. 局限于肝左外叶或右半肝，体积巨大、孤立，囊壁坚厚或钙化不宜塌陷，而病侧肝组织已萎缩者
- B. 局限于肝一叶的多发性囊肿者
- C. 引流后囊腔经久不愈，遗留瘘管者
- D. 囊肿感染后形成厚壁的慢性脓肿者或局限的肝泡状棘球蚴病者
- E. 感染严重，引流量多或较大胆管相同，残腔大者

2022 年外科主治医师《专业知识》考前模考大赛（二）答案解析

一、A1

1. 【正确答案】 D

【答案解析】 股骨粗隆间骨折大粗隆部肿胀、压痛、伤肢有短缩，远侧骨折段处于极度外旋位。

2. 【正确答案】 D

【答案解析】 抽屉实验用来测试交叉韧带的情况。

3. 【正确答案】 B

【答案解析】 单腿站立试验用于检查先天性髋脱位。

4. 【正确答案】 C

【答案解析】 斜扳试验主要是检查骶髂关节病变的一种方法，如检查阳性即斜扳试验出现骶髂关节疼痛者，表示骶髂关节有疾病。

5. 【正确答案】 C

【答案解析】 B、C、E 均为骨盆损伤休克的原因，但以 C 为最主要的原因。

6. 【正确答案】 E

【答案解析】 慢性阶段的体征有关节间隙压痛、弹跳、膝关节屈曲挛缩与股内侧肌的萎缩。股内侧肌的萎缩为废用性，提示膝关节内部结构紊乱。

7. 【正确答案】 D

【答案解析】 骨盆分离试验与挤压试验阳性是骨盆骨折特有体征。

8. 【正确答案】 D

【答案解析】 腓总神经损伤表现为内翻垂足畸形。

9. 【正确答案】 D

【答案解析】 神经震荡不属于周围神经损伤的分类。

10. 【正确答案】 E

【答案解析】 诱发电位是指：刺激周围神经，引起中枢神经的电活动，或者相反，刺激中枢神经，通过神经传导引起周围神经的电活动。肌电图检查是指：通过测定神经根所支配的肌肉出现失神经电位来判定受损的神经根。

11. 【正确答案】 C

【答案解析】 人工髋关节置换术的适应证包括各种类型的非感染性关节炎及继发性骨性关节炎造成的髋关节严重的疼痛及功能丧失。包括股骨头缺血性坏死、创伤性关节炎等。

12. **【正确答案】** C

【答案解析】 人工髋关节置换术后股骨骨折多发生在人工股骨柄远端。

13. **【正确答案】** D

【答案解析】 全身或局部任何活动性感染为髋关节置换术绝对禁忌证。

14. **【正确答案】** D

【答案解析】 无症状膝关节强直不属于人工膝关节置换术适应证。

15. **【正确答案】** E

【答案解析】 术后屈肘位石膏托制动，3周后开始活动。

16. **【正确答案】** B

【答案解析】 肩周炎是可以累及上臂的肌肉，但一般不会放射到前臂和手。

17. **【正确答案】** D

【答案解析】 疼痛剧烈不是腕管综合征的手术治疗指征。

18. **【正确答案】** E

【答案解析】 对肩周炎主要是保守治疗：口服消炎镇痛药，物理治疗，痛点局部封闭，按摩推拿、自我按摩等综合疗法，同时进行关节功能练习，包括主动与被动外展、旋转、伸屈及环转运动。当肩痛明显减轻而关节仍然僵硬时，可在全麻下手法松解，以恢复关节活动范围。

19. **【正确答案】** D

【答案解析】 疼痛范围大，一般不局限。疼痛范围常为广泛区域的疼痛，涉及后背、肩胛骨以下。

20. 【正确答案】 C

【答案解析】 中央型腰椎间盘突出症出现马尾神经受压症状，应手术治疗。

21. 【正确答案】 C

【答案解析】 椎间盘退行性变是引发腰椎间盘突出症的基本因素。

22. 【正确答案】 A

【答案解析】 腰椎管狭窄症典型症状是间歇性跛行，走一定距离后出现一侧下肢或双侧下肢的麻木，疼痛，酸胀无力等感觉，大多在股外后至小腿外后或外前，停止走步或稍前弯腰后下肢症状消失，然后再向前走，至一定距离后又出现上述症状，经过休息又消失。

23. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性骨髓炎主要感染途径为经血液循环。常见菌是金葡，多发生胫骨近端和股骨远端，多发生与儿童及青少年。

24. 【正确答案】 B

【答案解析】 脓液进入骨髓腔和中央管后，血管因炎症形成血栓或脓栓，阻断骨内血供。

25. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性血源性骨髓炎常发生于小儿长管骨的干骺端。

26. 【正确答案】 A

【答案解析】 最主要的原因是死骨残留。

27. 【正确答案】 E

【答案解析】 手术治疗脊柱结核主要是行病灶清除术，其适应证为：①死骨形成；②脓肿形成；③坏死组织、脓汁、死骨、肉芽组织等压迫脊髓形成截瘫。对于全身中毒症状严重、衰弱、重度贫血者，宜先改善全身情况后再考虑手术。

28. 【正确答案】 C

【答案解析】 结核杆菌一般通过血液循环到达骨与关节，少数由临近病灶蔓延而至。余选项均正确。

29. 【正确答案】 B

【答案解析】 后期 X 线示关节间隙消失，严重时出现胫骨后脱位。

30. 【正确答案】 D

【答案解析】 7~12 岁的学龄期儿童为大骨节病的监测对象。

31. 【正确答案】 B

【答案解析】 骨关节炎最先出现病理改变的关节组织是软骨组织。

32. 【正确答案】 A

【答案解析】 疼痛是骨关节炎的最主要症状，也是导致功能障碍的主要原因，特点是隐匿发作，多于活动后发生，休息可以缓解，严重者疼痛为持续性。

33. 【正确答案】 E

【答案解析】 双醋瑞因是 IL-1（白细胞介素）抑制剂，属于骨关节炎治疗的特异性药物。

34. 【正确答案】 A

【答案解析】 1987 年美国风湿病协会修订的诊断标准是：

1. 晨起关节僵硬至少 1 小时 (>6 周)。

2. 3 个或 3 个以上关节肿 (>6 周)。

3. 腕、掌指关节或近端指间关节肿 (>6 周)。

4. 对称性关节肿 (>6 周)。

5. 皮下结节。

6. 手 X 线片显示有骨侵蚀或有明确的骨质疏松。

7. 类风湿因子阳性 (滴度 >1: 32)。阳性类风湿性因子只能作为参考。

确认这种病需具备 4 条或 4 条以上标准。

35. 【正确答案】 E

【答案解析】 气管损伤表现为呼吸困难，伤口流出带泡沫的血性液体，可发生窒息及皮下气肿。

36. 【正确答案】 B

【答案解析】 类风湿关节炎一般不急，关节痛为多发性，有关节肿胀。患病时间较长，可有关节畸形和功能障碍。关节穿刺液、无脓液，有中等量白细胞。

37. 【正确答案】 B

【答案解析】 强直性脊柱炎常累及多数椎骨，多同时伴有双骶髂关节病变。晚期韧带钙化量“竹节样”

38. 【正确答案】 E

【答案解析】 间充质病变合并脊柱侧凸、神经纤维瘤病合并脊柱侧凸、骨软骨营养不良合并脊柱侧凸、代谢性障碍合并脊柱侧凸、脊柱外组织挛缩合并脊柱侧凸和其他原因引起的脊柱侧凸均属于结构性脊柱侧凸。

39. 【正确答案】 D

【答案解析】 胸引量 >200ml/h，持续 3 小时以上是手术探查的指征，胸腔镜探查视野好、创伤小、恢复快，与开胸手术可达到相同的效果。

40. 【正确答案】 B

【答案解析】 青霉素问世以前，脓胸多为肺炎链球菌及溶血性链球菌，近年来尽管结核菌及真菌引起脓胸有所增加，但仍以金黄色葡萄球菌最为常见。

二、A2

41. 【正确答案】 A

【答案解析】 椎动脉型在颈椎横突孔中，可因椎间隙狭窄、颈椎不稳或钩椎关节骨赘增生而压迫或刺激椎动脉，动脉血流可暂时阻断，或因痉挛而阻塞或梗死，影响脑的血供。出现以下各种症状：

- (1)头痛、头晕。
- (2)一过性脑缺血症状：如眩晕、恶心呕吐、耳鸣、视物不清等。
- (3)一过性脊髓的缺血症状：包括肢体突感麻木、乏力、甚至摔倒。
- (4)其他：如声音嘶哑、吞咽困难、视物不清等。

42. 【正确答案】 C

【答案解析】 神经根型颈椎病的疼痛部位与神经病变处并不一致，痛点局封常无效。

43. 【正确答案】 C

【答案解析】 患侧霍夫曼征（+）对于颈椎病的诊断最可靠。

44. 【正确答案】 C

【答案解析】 该患者有典型间歇性跛行的表现，考虑为腰椎管狭窄症。

45. 【正确答案】 D

【答案解析】 骨质破坏、关节间隙变窄表明关节所有结构已破坏，故诊断全髌关节结核。

46. 【正确答案】 D

【答案解析】 强直性脊柱炎（AS）是以骶髂关节和脊柱附着点炎症为主要症状的疾病。反应性关节炎是指继发于身体其他部位感染的急性非化脓性关节炎。肠道或泌尿生殖道感染后的反应性关节炎最为常见。系统性红斑狼疮关节受累的表现有：有关节痛、关节炎、关节畸形（10%X线有破坏）及肌痛、肌无力，白细胞减少。

类风湿关节炎（RA）是一种病因未明的以炎性滑膜炎为主的慢性、系统性疾病。其特征是手、足小关节的多关节、对称性、侵袭性关节炎，经常伴有关节外器官受累及血清类风湿因子阳性，可以导致关节畸形及功能丧失。故综合考虑正确答案D。

47. **【正确答案】** B

【答案解析】 血胸查体发现伤侧呼吸运动减弱，下胸部叩诊浊音，呼吸音明显减弱，积血量超过1500ml时，积液阴影超过肺门水平，甚至显示为全胸大片致密阴影和纵隔移位，进行性血胸应输血抗休克治疗，并剖胸探查。

48. **【正确答案】** D

【答案解析】 积液（或积血）引流选腋中线、后线之间第6~8肋间进针，气胸引流选锁骨中线第2~3肋间。

49. **【正确答案】** E

【答案解析】 综合判断为进行性血胸，首先输入足量血液，以防治低血容量性休克。及时剖胸探查，寻找出血部位，予以缝合、修补等处理。

50. **【正确答案】** E

【答案解析】 依据临床表现和检查表现可诊断为急性脓胸，急性脓胸发病快，积液多且黏稠，病情危重，有中毒症状的，胸腔穿刺后积液又迅速生成时需行胸腔闭式引流，合并有支气管胸膜瘘或食管胸膜瘘的脓气胸，也需行胸腔闭式引流。

51. 【正确答案】 E

【答案解析】 结节性肺泡细胞癌常表现为周围型肿块。肺泡细胞癌在 X 线形态上有结节型和弥漫型两类，前者可以是单个结节或多个结节，类似周围型肺癌；后者形态类似肺炎。

52. 【正确答案】 A

【答案解析】 纤维支气管镜检查是最适宜中心型肺癌的检查诊断方法，其对早期中心型肺癌诊断阳性率较高，但对周围型肺癌的阳性确诊率较低。

53. 【正确答案】 E

【答案解析】 胸腔镜手术探查用于确定右肺下叶周围性结节的性质。穿刺活检组织较少，阳性率不及胸腔镜手术探查，胸腔镜手术探查确诊更可靠。

54. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据表现：阵阵咳嗽并咳出粉红色泡沫痰，心率 110 次/分，右肺闻及哮鸣音及细湿啰音。考虑为急性肺水肿。

55. 【正确答案】 E

【答案解析】 食管癌的病理类型中不包括移行细胞癌。

56. 【正确答案】 D

【答案解析】 中晚期食管癌的典型症状为进行性吞咽困难；癌肿侵犯喉返神经可出现声音嘶哑；食管癌患者持续性胸背部疼痛多为肿瘤侵犯胸膜和脊神经所致。侵入气管、支气管可形成食管气管瘘或食管支气管瘘。体检时可有锁骨上淋巴结肿大。

57. 【正确答案】 C

【答案解析】 食管平滑肌瘤钡餐造影的典型表现为可见半月形压迹及“瀑布征”，食管黏膜完整。

58. 【正确答案】 D

【答案解析】 食管分颈段和胸段，胸段又分为上、中、下段。手术是治疗食管癌的首选方法。胸中、下段食管癌多采用根治性切除，但颈段和胸上段食管癌，因局部解剖复杂，手术难度大，手术并发症多；疗效不满意，目前多采用单纯放射治疗。

59. 【正确答案】 A

【答案解析】 术前放疗可增加手术切除率，提高远期生存率，放疗结束后 2-3 周后再作手术。本例长 7cm，所以考虑先放疗再手术，效果更好。

60. 【正确答案】 E

【答案解析】 此题考查考生对胸腔镜在胸外应用的认识。传统上，此患者可采用 A 或 D 的治疗办法，但胸腔镜技术出现后无疑是此种情况的恰当选择，故选 E。

61. 【正确答案】 C

【答案解析】 该患者虽有硬膜下血肿，但血肿量不大，中线无偏移，故应先行抗休克治疗同时行腹部探查去除引起休克的原因。

62. 【正确答案】 C

【答案解析】 患者突然发病，有头痛、呕吐、意识改变，既而出现右侧动眼神经功能障碍，蛛网膜下腔出血表现较明显，这是颅内动脉瘤最易发生的特征，但高血压病也是其中的病因之一。

63. 【正确答案】 C

【答案解析】 患者高血压，右侧肢体活动、感觉障碍，左侧偏盲，三偏征，诊断壳核出血。

64. 【正确答案】 A

【答案解析】 脑出血常见病因是高血压合并小动脉硬化，微动脉瘤或者微血管瘤，颞叶钩回疝表现为：同侧瞳孔大，光反射消失，对侧偏瘫。

65. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据病史考虑存在有活动性出血，需要手术止血，在准备的同时需要抗休克治疗。

三、A3/A4

66. 【正确答案】 E

67. 【正确答案】 A

68. 【正确答案】 C

【答案解析】 患者青壮年男性，右下肢感觉异常，间歇性跛行，诊断为血栓静脉性脉管炎。患者严格戒烟，是稳定病情最重要的疗法。与下肢动脉硬化闭塞症的鉴别要点为：血栓闭塞性脉管炎好发于青壮年男性，病程较长。反复发作后症状逐渐加重。解张试验是判断血管痉挛的一种方法，在缺血性疾病的诊断中，给予蛛网膜下腔阻滞麻醉后，患肢温度升高越明显，考虑痉挛导致血管缺血可能越大，如温度升高不明显，说明血管可能已经闭塞。该患者皮温升高，说明血管未发生闭塞，故可试行腰交感神经切除术。

69. 【正确答案】 D

【答案解析】 本题中患者为损伤后动脉瘤。

动脉瘤是由于动脉壁的病变或损伤，形成动脉壁局限性或弥漫性扩张或膨出的病理表现，以膨胀性、搏动性肿块为主要症状，可以发生在动脉系统的任何部位，以肢体主干动脉、主动脉和颈动脉较为常见。

70. 【正确答案】 B

【答案解析】 动脉瘤是动脉壁局部薄弱后所形成的永久性异常扩张，由动脉硬化、创伤、感染、梅毒及先天性等因素引起。动脉硬化是最常见和最主要的原因。真性动脉瘤是由动脉壁全层呈囊状或梭形扩张而形成；假性动脉瘤是由动脉壁破裂后引起局部血肿，以后由纤维组织包绕而继续与动脉沟通的肿物，创伤性动脉瘤大多属此种类；夹层动脉瘤因动脉壁本身分裂而成，动脉瘤和动脉经过动脉内膜上的裂口而互相交通。

71. 【正确答案】 C

【答案解析】 搏动性肿块是动脉瘤最典型的体征，伴有震颤和血管杂音。

72. 【正确答案】 C

【答案解析】 40 岁以上妇女，用力还纳包块后出现腹痛，腹股沟韧带下有半球形突起，多见于股疝。

73. 【正确答案】 D

【答案解析】 凡经股环、股管而自卵圆窝突出的疝，叫做股疝，肌紧张，反跳痛，肠鸣音消失提示肠坏死，是肠坏死的体征，因此选 D。

74. 【正确答案】 A

【答案解析】 股疝最常用的是 McVay 法（麦克凡式）于精索后方把腹股沟韧带、腔隙韧带和耻骨筋膜缝合在一起，借以关闭股环。也可以利用人工材料进行成形手术，封闭股环。

75. 【正确答案】 D

【答案解析】 患者餐前痛、夜间痛、黑粪，故诊断为十二指肠溃疡伴出血。

76. 【正确答案】 C

【答案解析】 确诊依靠胃镜。

77. 【正确答案】 C

【答案解析】 一般，急诊外科手术适用于治疗发生并发症(穿孔、梗阻)的患者。

78. 【正确答案】 C

【答案解析】 患者平时身体健康，近半年来出现食欲下降、乏力消瘦，而且出现进食后饱胀，考虑是胃癌的可能性比较大。

79. 【正确答案】 D

【答案解析】 其他选项的淋巴结都可能有转移。腹主动脉旁淋巴结与胃的关系较远，不容易发生转移。

80. 【正确答案】 D

【答案解析】 早期治疗有助于提高患者存活期。

81. 【正确答案】 D

【答案解析】 病人有阑尾炎手术史，肛门未排气排便，阵发性脐周疼痛伴恶心呕吐、肠鸣音亢进，偶闻气过水声考虑粘连性肠梗阻可能性大。

82. 【正确答案】 C

【答案解析】 立位 X 线平片检查可显示肠梗阻肠腔内液平面及气体。

83. 【正确答案】 D

【答案解析】 入院治疗 24 小时后，患者感腹痛变为持续性，伴阵发性加重，排暗红色稀便，考虑为绞窄性肠梗阻，应立即剖腹探查。

84. 【正确答案】 C

【答案解析】 1 周前因急性阑尾炎，进行手术治疗时，阑尾系膜出血，缝扎止血时致回肠末段血运障碍，行回肠部分切除吻合术，腹腔引流，间断性引出血性液每日约 200ml。意义：麻痹性肠梗阻的病因之一常见腹部手术中的机械性刺激术中，因肠管及其系膜受牵拉刺激后，蠕动功能暂时丧失。根据“腹胀，右侧腹压痛，未触及肿块。肠鸣音弱，”结合病人手术病史就可以诊断，是首先考虑到麻痹性肠梗阻的可能性大。

85. 【正确答案】 A

【答案解析】 麻痹性肠梗阻诊断必须有病史、临床表现，结合 X 线、CT 等检查，才能明确诊断。

86. 【正确答案】 B

【答案解析】 可以先对症治疗，多数可以自行缓解。基础治疗

(1) 胃肠减压：是治疗肠梗阻的主要措施之一。

(2) 纠正水、电解质紊乱和酸碱失衡：水、电解质紊乱和酸碱失衡是急性肠梗阻最突出的生理紊乱，应及早给予纠正。在尚未获得血液生化检查结果前，应先给予平衡盐液（乳酸钠林格液）。

(3) 抗感染：肠梗阻后，肠壁血循环障碍，肠黏膜屏障功能受损而有肠道细菌

移位，或是肠腔内细菌直接穿透肠壁至腹腔内产生感染。

(4) 其它治疗。

87. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性肠扭转表现为突然发作剧烈腹部绞痛。多在脐周围，常为持续性疼痛阵发性加重；可有呕吐，腹胀。

88. 【正确答案】 E

【答案解析】 超声波由于气体的干扰，看肠道时效果并不好，而 X 线不受气体的影响。因此首选 X 线。

89. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据该患者临床表现应该急诊手术治疗。

90. 【正确答案】 A

【答案解析】 初步诊断应该不难，年龄是结肠癌好发阶段（41~65 岁人群）；有长期的腹痛病史、大便习惯改变，气钡双重造影提示有占位病变，本题应是送分题。肠结核钡剂多是激惹征、跳跃征。克罗恩钡剂可显示纵行溃疡、跳跃征、或病变呈节段分布、肠管呈管状等表现。巨结肠主要见于小儿；肠息肉钡剂虽有充盈缺损，但多是黏液血便史，可有里急后重、肠梗阻的表现。

91. 【正确答案】 A

【答案解析】 结肠癌病理分型就只有三型即 ABC 项；DE 是干扰项。隆起型肿瘤是向肠腔内生长的，好发于右侧结肠，特别是盲肠部，根据患者钡剂提示应不难判断。

92. 【正确答案】 D

【答案解析】 结肠癌主要是经淋巴转移，首先到结肠壁和结肠旁淋巴结，再到肠系膜血管周围和肠系膜血管根部淋巴结。血行相对淋巴道转移要晚，主要是肝脏，其次是肺脏和骨骼。

93. 【正确答案】 B

94. 【正确答案】 A

95. 【正确答案】 C

【答案解析】 左半结肠切除术:适用于结肠脾曲和降结肠癌肿。切除范围为全部大网膜、横结肠左半、脾曲和降结肠及其系膜和淋巴结，此例为横结肠靠近脾曲，故选 C。

96. 【正确答案】 C

【答案解析】 肛裂是齿线以下肛管皮肤层小溃疡。其方向与肛管纵轴平行，呈梭形或椭圆形，常因排便引起周期性剧痛，愈合困难。

97. 【正确答案】 D

【答案解析】 增加多纤维食物可以预防结肠癌，也可防止便秘，是有好处的，但不是当前的治疗手段。

内括约肌具有消化道不随意环形肌的特性，易发生痉挛及收缩，这是造成肛裂疼痛的主要原因，故可用内括约肌切断术治愈肛裂。

98. 【正确答案】 B

【答案解析】 犬绦虫的终宿主为狗，人是中间宿主。

99. 【正确答案】 C

【答案解析】 肝包虫病通常是单发的多见。

100. 【正确答案】 E

【答案解析】 对以下情况可考虑作肝叶或肝部分切除术：①局限于肝左外叶或右半肝，体积巨大、单一、囊壁坚厚或钙化不易塌陷，而病侧肝组织已萎缩；②局限于肝的一叶的多发性囊肿；③引流后囊腔经久不愈，以至遗留瘘管；④囊肿感染后形成厚壁的慢性脓肿；⑤局限的肝泡状棘球蚴病者。