



医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2022年第61期

问题索引：

1. 气管切开的时候应该在什么部位？
2. 什么是托槽位置的高度？
3. 什么是全凭静脉麻醉？
4. 出现吸入性窒息时应该采取什么急救措施？

具体解答：

1. 气管切开的时候应该在什么部位？

气管切开的部位多在

- A. 第1气管软骨环
- B. 第1~3气管软骨环
- C. 第2~4气管软骨环
- D. 第3~5气管软骨环
- E. 低于第5气管软骨环

【答案】D

【解析】[医学教育网原创]气管切开的部位多在第3~5气管软骨环。

2. 什么是托槽位置的高度？

托槽位置的高度是指

- A. 由牙尖或切缘至托槽槽沟的（牙合）向底面间的距离
- B. 由牙尖或切缘至托槽槽沟的龈向底面间的距离
- C. 由牙尖或切缘至托槽（牙合）向基底部间的距离
- D. 由牙尖或切缘至托槽龈向基底部间的距离
- E. 以上均不正确

【答案】A

【解析】高度：托槽位置的高度是指由牙尖或切缘至托槽沟的（牙合）向底面间的距离，一般常用的高度如下：[医学教育网原创]上颌双侧 13456 及下颌 123456 为 4mm；上颌 2 为 3.5mm。



3. 什么是全凭静脉麻醉？

全凭静脉麻醉是指

- A. 单独使用一种静脉麻醉药物
- B. 单独使用一、两种静脉麻醉药物
- C. 单独使用静脉麻醉药物
- D. 单独使用全麻辅助药物
- E. 静脉麻醉药与全麻辅助药物联合使用

【答案】E

【解析】[医学教育网原创]由于单独使用一两种静脉麻醉药物常镇痛不全，不良反应多，故通常将几种静脉麻醉药物和全麻辅助药物完全经静脉联合使用，称为全凭静脉麻醉。

4. 出现吸入性窒息时应该采取什么急救措施？

关于吸入性窒息急救错误的是

- A. 应立即行气管切开术
- B. 悬吊下坠的上颌骨骨块
- C. 充分吸出进入下呼吸道的分泌物及其他异物
- D. 注意防治肺部并发症
- E. 充分吸出进入下呼吸道的血液

【答案】B

【解析】吸入性窒息的急救：应立即行气管切开术，通过气管导管，充分吸出进入下呼吸道的血液、分泌物及其他异物，解除窒息。此类患者要特别注意防治肺部并发症[医学教育网原创]。