

医学教育网口腔助理医师：《答疑周刊》2023年第6期

问题索引：

1. 急性根尖周炎最常见的典型自然排脓途径是那一条？
2. 急性根尖周炎浆液期有何临床特点？
3. 急性疱疹性口炎与疱疹样口疮有何区别？
4. 念珠菌口炎的诊断方法有哪些？

具体解答：

1. 急性根尖周炎最常见的典型自然排脓途径是那一条？

急性根尖周炎最常见的典型自然排脓途径

- A. 根尖孔→根管→髓腔
- B. 根尖周→骨膜下→黏膜下
- C. 根尖周→骨膜下→皮肤下
- D. 根尖周→牙周间隙→龈沟
- E. 根尖周→骨髓腔→上颌窦

【正确答案】B

【答案解析】根尖周→骨膜下→黏膜下，此排脓方式是急性根尖周炎最常见的典型自然发展过程。这种排脓途径较复杂，并常伴发颌面部蜂窝组织炎。[医学教育网原创]

2. 急性根尖周炎浆液期有何临床特点？

急性根尖周炎浆液期的临床症状如下，除外

- A. 持续自发痛
- B. 患牙浮出感
- C. 温度测有反应
- D. 患牙能明确定位
- E. 咬紧牙时痛加重

【正确答案】C

【答案解析】①初期患牙根尖部不适、木胀浮出感，咬合时与对（牙合）牙有早接触感，有时用力咬紧患牙反而稍感舒服。尚无自发痛或仅轻微钝痛。②随

着病情发展，患牙浮出和伸长的感觉逐渐加重，出现自发性、持续性钝痛，咬合时不仅不能缓解症状，反而引起较剧烈的疼痛，影响进食。③疼痛范围局限于患牙根部，不引起放散，患者能够指明患牙。[医学教育网原创]

3. 急性疱疹性口炎与疱疹样口疮有何区别？

下面哪项不是急性疱疹性口炎与疱疹样口疮的区别

- A. 好发年龄不同
- B. 性别差异
- C. 前者为急性发作、全身反应较重；后者为反复发作、全身反应较轻
- D. 前者病损表现为成簇小水疱；后者病损表现为散在小溃疡
- E. 前者病损可伴皮肤损害；后者病损无皮肤损害

【正确答案】B

【答案解析】疱疹样口疮即为疱疹样复发性阿弗他溃疡，为散在分布的单个小溃疡，反复发作，没有发疱史；溃疡数量较多，主要分布于口腔内角化程度较差的黏膜处。不造成牙龈红肿，儿童少见，无皮肤损害。但二者并无明显的性别差异。[医学教育网原创]

4. 念珠菌口炎的诊断方法有哪些？

对于念珠菌性口炎中慢性肥厚型的高龄患者，为了明确诊断有无异常增生，首选的诊断方法是

- A. 唾液培养
- B. 唾液及血清念珠菌抗体测定
- C. 活体组织检查
- D. 直接涂片镜检
- E. 血 CEA 测定

【正确答案】C

【答案解析】活检法：对于慢性或肥厚性损害可进行活检，镜下可见增生的口腔黏膜上皮细胞间有念珠菌丝侵入组织，引起上皮表层水肿，角化层内有中性粒细胞浸润，常形成微小脓肿。[医学教育网原创]