

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2023年第16期

问题索引:

1. 导致崩漏的常见病因有哪些?
2. 乳蛾的治疗原则是什么?
3. 二尖瓣狭窄的诊断要点是什么?

具体解答:

1. 导致崩漏的常见病因有哪些?

导致崩漏的常见病因是

- A. 肾虚、脾虚、血热、血瘀
- B. 肾虚、脾虚、血热、血寒
- C. 肾虚、脾虚、肝郁、血瘀
- D. 肾虚、脾虚、肝郁、血热
- E. 肾虚、脾虚、湿热、血瘀

【答案】A

【解析】崩漏的发病是肾-天癸-冲任-胞宫生殖轴的严重失调。其主要病机是冲任不固，不能制约经血，使子宫藏泻失常。导致崩漏的常见病因有脾虚、肾虚、血热和血瘀[医学教育网原创]。

2. 乳蛾的治疗原则是什么?

乳蛾的治疗原则是

- A. 清热解毒，利咽消肿
- B. 疏风清热，利咽消肿
- C. 养阴润肺，软坚利咽
- D. 辛温解表，疏风散寒
- E. 清热解毒，软坚散结

【答案】A

【解析】乳蛾的治疗原则：以清热解毒、利咽消肿为基本治疗原则[医学教育网原创]。

3. 二尖瓣狭窄的诊断要点是什么?

女性, 30岁, 风湿热病史6年, 现呼吸困难、咳嗽、咳痰、咯血, 查体心尖部闻及舒张中晚期杂音, 心电图显示左房增大, 该患者的诊断是

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 联合瓣膜病变
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣狭窄

【答案】C

【解析】二尖瓣狭窄的诊断: 如有心尖区隆隆样舒张中晚期杂音及左心房肥大的证据, 即可诊断为二尖瓣狭窄; 若有风湿热病史, 则支持风心病二尖瓣狭窄的诊断。超声心动图检查有助于确诊二尖瓣狭窄及判断狭窄程度[医学教育网原创]。