

医学教育网妇产科主治医师:《答疑周刊》2023年第24期

妊娠诊断是妇产科主治考试中的基本考点,尤其是早期妊娠诊断和中晚期妊娠诊断,均是妇产科医生必须要掌握的考试相关内容。

问题索引:

1. 早孕时最重要的症状?
2. 早孕的诊断?
3. 中晚期妊娠活胎的辅助诊断?

具体解答:

1. 早孕时最重要的症状?

早孕时最早及最重要的症状为

- A. 腹痛
- B. 尿频
- C. 早孕反应
- D. 乳房胀痛
- E. 停经

【正确答案】E

【答案解析】育龄有性生活的妇女,平时月经周期规则,一旦月经过期应考虑妊娠。停经 10 日以上高度怀疑妊娠;停经 2 月以上妊娠可能性大。停经是妊娠最早的症状[医学教育网原创]。

2. 早孕的诊断?

不能诊断为早孕的项目为

- A. 阴道及宫颈软,紫蓝色
- B. 黑加征阳性
- C. 黄体酮试验阳性
- D. 尿 hCG 阳性
- E. 子宫增大变软,呈球形

【正确答案】C

【答案解析】早孕的体征: 1. 乳房的变化 乳房渐大,自觉乳房轻度胀痛及乳头

疼痛。检查见乳头及乳晕着色加深，乳晕周围有蒙氏结节出现。2. 生殖器官的变化 妊娠 6~8 周可见阴道壁及宫颈充血，呈紫蓝色。双合诊检查发现宫颈变软，子宫峡部极软，感觉宫颈与宫体似不相连，称为黑加征。

辅助检查：1. B 型超声显像法 在增大的子宫轮廓中，见到来自羊膜囊的圆形光环，妊娠环内为液性暗区(羊水)。最早在妊娠 5 周时见到妊娠环。若在妊娠环内见到有节律的胎心搏动和胎动，可确诊为早期妊娠活胎。2. 妊娠试验 用酶联免疫吸附法检测，若为阳性表明受检者尿中含有 HCG，可以协助诊断早期妊娠。3. 宫颈黏液检查 宫颈黏液涂片干燥后光镜下见到排列成行的椭圆体，则早期妊娠的可能性大。4. 黄体酮试验 利用孕激素在体内突然撤退能引起子宫出血的原理，每日肌注黄体酮 20mg，连用 3 天，停药后观察 2~7 天，若超过 7 天仍未出现阴道流血，则早期妊娠的可能性很大[医学教育网原创]。

3. 中晚期妊娠活胎的辅助诊断？

下列哪项不能辅助诊断中晚期妊娠活胎

- A. 经腹壁用听筒听到胎儿心音
- B. 孕妇自感有胎动
- C. 经腹壁看到胎动
- D. 经腹壁触到胎动
- E. 多普勒超声显示有胎儿搏动及胎动反射

【正确答案】B

【答案解析】孕妇自觉胎动是主观感觉，有很大个体差异，闻及胎心音则是客观诊断活胎的依据[医学教育网原创]。