

医学教育网口腔执业医师：《答疑周刊》2023 年第 34 期

- 问题索引：1. 牙齿脱位后的并发症为？
2. 牙脱白的治疗原则为？
3. 牙震荡的临床表现为？

具体解答

1. 牙齿脱位后的并发症为？

下列哪项不是牙齿脱位后伴发的各种并发症

- A. 牙髓坏死
- B. 牙髓腔变窄或消失
- C. 牙根外吸收
- D. 边缘性牙槽突吸收
- E. 逆行性牙髓炎

【答案】E

【解析】牙齿脱位后，可以发生各种并发症：牙髓坏死；牙髓腔变窄或消失；牙根外吸收；边缘性牙槽突吸收。

2. 牙脱白的治疗原则为？

关于完全脱白牙的叙述正确的是

- A. 在 1 小时内进行再植，90%可避免发生牙根吸收
- B. 脱白牙根尖已发育完成，回植复位后弹性固定 4 周
- C. 脱白牙根尖已发育完成，干燥时间大于 1 小时则需固定 4 周
- D. 被污染的完全脱白牙，可以进行干藏
- E. 牙脱白后干燥时间小于 1 小时，牙周膜细胞受损严重，不能存活

【答案】C

【解析】牙脱白的治疗原则：牙脱白的处理要考虑牙根发育的程度和牙周膜细胞的状态，及早治疗。牙脱白后干燥时间也影响牙周膜细胞的状态，干燥时间小于 1 小时，牙周膜细胞虽然受损，但是仍可能存活，因此牙脱白在 1 小时内再植复

位，成功率较高。能够在半小时内完成回植的患牙 90%可避免牙根吸收。

1. 脱臼牙根尖已发育完成，回植复位后弹性固定 2 周；干燥时间大于 1 小时则需固定 4 周。植入术后 7~10 天再做[医学教育网]根管治疗，建议氢氧化钙或类固醇-抗生素根管封药 1 个月。若干燥时间大于 1 小时，根管治疗应在回植术前或术后尽快实施。

2. 脱臼牙为年轻恒牙，干燥时间小于 1 小时，回植复位后弹性固定 2 周。注意观察牙髓状况，临床如已查明牙髓坏死，应及时做根管治疗，也可尝试做牙髓血运重建术。干燥时间大于 1 小时，回植术前须进行根面清洁、牙槽窝处理以及根管治疗，远期预后较差。

3. 牙震荡的临床表现为？

关于牙震荡的临床表现的说话，下列错误的是

- A. 患牙微酸痛感
- B. 患牙可对于冷刺激一过性敏感
- C. 牙冠完整，通常不伴有牙体组织的缺损
- D. 大幅松动，患牙有移位
- E. 叩痛（±）~（+）

【答案】D

【解析】牙震荡临床表现有：患牙轻微酸痛感，对冷刺[医学教育网]激可有一过性敏感症状；牙冠完整，通常不伴牙体组织的缺损；不松动或轻微松动，无移位。垂直向或水平向叩痛（±）~（+）。冷测患牙从略敏感到无反应不一。