

医学教育网护士执业资格：《答疑周刊》2024年第6期

问题索引：

1. 【问题】锐器盒放满多少不可再用？
2. 【问题】栓塞征象是什么？
3. 【问题】如何根据心电图计算患者的心率？

具体解答：

1. 【问题】锐器盒放满多少不可再用？

【解答】锐器盒中的锐器放到 2/3 就不可以再用，[医学教育网原创]以免发生损伤。

2. 【问题】栓塞征象是什么？

【解答】血栓栓塞根据栓塞的部位不同，通常症状也不同，具体如下：

- (1) 冠状动脉：可以表现为心绞痛、心梗，严重时可出现心衰；
- (2) 脑部血管：可以表现为脑梗、眼前发黑、头晕，甚至偏瘫，严重时会出现意识丧失；
- (3) 肾脏血管：[医学教育网原创]如果栓塞肾脏动脉，可以表现肾脏缺血。出现肾血管性高血压，还可出现肾功能不全，造成水肿、无尿；
- (4) 肠系膜动脉：严重时表现为剧烈腹痛，甚至导致肠坏死；
- (5) 下肢动脉：可以表现为下肢发白、发凉、发麻、剧烈疼痛，以及运动和感觉功能消失；
- (6) 肺动脉：可以表现为胸痛、气急、呼吸困难、心跳加快，严重时会出现休克。

3. 【问题】如何根据心电图计算患者的心率？

【解答】例：某患者心电图检查结果，常规心电图平均 p-p 间隔为 15 小格，护士为其计算心率为（100/分）。

p-p 间隔为 15 小格，1 小格是 0.04s，15 小格就是 $0.04 \times 15 = 0.6s$ ，也就是说 0.6s 心跳一次，然后用 $60 / 0.6 = 100$ 次/分。[医学教育网]