

医学教育网妇产科主治医师:《答疑周刊》2024年第20期

今天一起来做几道妊娠合并性传播疾病题目,看看大家对这块内容的掌握情况怎么样!

问题索引:

1. 关于梅毒下列哪项是不正确的?
2. 下列叙述合并尖锐湿疣恰当的描述是?
3. 下列哪项叙述是恰当的?

具体解答:

1. 关于梅毒下列哪项是不正确的?

关于梅毒下列哪项是不正确的

- A. 梅毒螺旋体可经性交直接传播
- B. 梅毒螺旋体可经胎盘传染给胎儿
- C. 根据传播途径不同分为先天性梅毒和后天性梅毒
- D. 新生儿分娩时经产道感染为先天梅毒
- E. 梅毒治疗以青霉素为主

【正确答案】D

【答案解析】先天梅毒:诊断或高度怀疑先天梅毒的依据:①先天梅毒的临床表现;②病变部位、胎盘、羊水或脐血找到梅毒螺旋体;③体液中抗梅毒螺旋体IgM抗体(+);④脐血或新生儿血非梅毒螺旋体试验抗体滴度较母血增高4倍以上。可通过胎盘将梅毒螺旋体传给胎儿为先天梅毒。故选D。[医学教育网原创]

2. 下列叙述合并尖锐湿疣恰当的描述是?

下列叙述合并尖锐湿疣恰当的描述是

- A. 胎盘宫内感染并不少见
- B. 通过软产道感染胎儿罕见
- C. 出生的新生儿常患喉头瘤
- D. 妊娠期病灶生长缓慢
- E. 妊娠期间容易患尖锐湿疣

【正确答案】E

【答案解析】妊娠期病灶易生长迅速，数目多、体积大、多区域、多形态、质脆易碎，阴道分娩时容易致大出血。故怀孕期间容易患尖锐湿疣。[医学教育网原创]

3. 下列哪项叙述是恰当的？

下列哪项叙述是恰当的

- A. 沙眼衣原体不会引起沙眼以外的感染
- B. 沙眼衣原体感染不属于性传播疾病
- C. 孕妇生殖道衣原体感染会发生垂直感染
- D. 细菌培养的方法不同于衣原体的诊断
- E. 新生儿衣原体只侵犯眼结膜

【正确答案】C

【答案解析】沙眼衣原体主要经性接触传播，间接传播少见。孕妇感染后可发生宫内感染，通过产道感染或出生后感染新生儿，其中经产道感染是最主要的传播途径，垂直传播率为 30%~50%。故选 C。[医学教育网原创]