

医学教育网内科主治医师考试:《答疑周刊》2024年第22期

脑出血一直是考试的一个热点内容,和临床联系比较大,需要大家重点复习,今天一起来做几道有关脑出血的题目。

问题索引:

1. 蛛网膜下腔出血的常见并发症有什么?
2. 出现眼球震颤、共济失调一般是哪个部位的脑出血?
3. 蛛网膜下腔出血患者防止再出血的最可靠方法是什么?

具体解答:

1. 蛛网膜下腔出血的常见并发症不包括

- A. 再出血
- B. 脑血管痉挛
- C. 急性脑积水
- D. 迟发性脑积水
- E. 颅内感染

【正确答案】 E

【答案解析】 再出血、脑血管痉挛、急性脑积水、迟发性脑积水均是蛛网膜下腔出血的并发症,在临床非常常见,要求考生掌握,而颅内感染是蛛网膜下腔出血应该鉴别的疾病,而非并发症,因此正确的答案是E。[医学教育网原创]

2. 患者,女性,70岁。走路中突发眩晕、频繁呕吐、枕部头痛和平衡障碍,无肢体瘫痪。体格检查见眼球震颤、共济失调,头颅CT检查见出血灶,其出血部位最可能为

- A. 脑干
- B. 额叶
- C. 枕叶
- D. 基底节
- E. 小脑

【正确答案】 E

【答案解析】 该题考查的是脑出血的定位,常见部位出血的主要临床表现要求

考生掌握, 该病例临床表现有眩晕、平衡障碍、共济失调、眼球震颤, 因此定位为小脑。该题选 E。

3. 蛛网膜下腔出血患者防止再出血的最可靠方法是

- A. 卧床休息 4~6 周
- B. 保持大便通畅
- C. 避免活动和激动
- D. 保持血压稳定
- E. 脑动脉瘤或血管畸形手术或放射介入治疗

【正确答案】 E

【答案解析】 蛛网膜下腔出血的最常见原因为颅内动脉瘤或血管畸形, 故防止再出血的最好方法就是动脉瘤消除术。[医学教育网原创]