

医学教育网外科主治医师:《答疑周刊》2024年第33期

骨与关节结核好发于儿童与青少年,原发病灶为肺结核或消化道结核,好发部位是脊柱,其次是膝关节、髋关节与肘关节。其相关考点如下:

问题索引:

1. 骨与关节结核最常见的好发部位是哪?
2. 骨与关节结核早期 X 线表现是什么?
3. 骨与关节结核临床表现是什么?

具体解答:

1. 骨关节结核最常见的发生部位是

- A. 肌肉最不发达的腕关节
- B. 全身滑膜面积最大的膝关节
- C. 负重最大的踝关节
- D. 脊柱椎体
- E. 活动最多的髋关节

【答案】D

【解析】脊柱结核占全身关节结核的首位,其中以椎体结核[医学教育网原创]占大多数,腰椎结核发生率最高,胸椎次之。

2. 骨关节结核早期 X 线片表现

- A. 骨空洞形成
- B. 层状骨膜增生
- C. 边缘不齐的小死骨
- D. 骨质缺损
- E. 骨小梁模糊,呈磨砂玻璃状

【答案】E

【解析】骨关节结核[医学教育网原创]早期 X 线可见骨小梁模糊,呈磨砂玻璃状。

3. 下列选项中,不属于骨与关节结核临床表现的是

- A. 关节病变呈多发性

- B. 寒性脓肿
- C. 低热、消瘦、盗汗、贫血
- D. 局部肿痛
- E. 血沉增快

【答案】 A

【解析】 起病缓慢，有低热、乏力、盗汗、消瘦、食欲缺乏[医学教育网原创]及贫血等症状。病变部位多为单发性，少数为多发性。



正保医学教育网
www.med66.com