

仿真
密卷

☑ 学霸同款

☑ 精华提炼

☑ 实战练习

卫生专业技术资格考试

中药学（士）

医学教育网命题组 编

绝密·内部

依据考纲
精心研发

考前爆料
命题规律

精选考题
仿真练习

《基础知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1.多用于体虚多汗、肺虚久咳的药物是

- A.酸味药
- B.苦味药
- C.甘味药
- D.辛味药
- E.咸味药

2.以下属沉降的药物是

- A.大黄
- B.麻黄
- C.黄芪
- D.升麻
- E.桂枝

3.十九畏中硫黄畏

- A.朴硝
- B.硼砂
- C.朱砂
- D.珍珠
- E.雄黄

4. 下列关于入汤剂用法，说法有误的是

- A. 鹤草芽煎服
- B. 阿胶烔化兑服
- C. 附子先煎
- D. 旋覆花包煎
- E. 砂仁后下

5. 下列哪项不是防风的适应证

- A. 风寒表证
- B. 脾虚湿盛
- C. 疮疡初起
- D. 风湿痹证
- E. 破伤风

6. 蝉蜕功效不包括的是

- A. 明目退翳
- B. 宣通鼻窍
- C. 疏散风热
- D. 透疹止痒
- E. 利咽

7. 玄参具有的功效是

- A. 清热凉血，活血散瘀
- B. 清热凉血，泻火解毒，滋阴
- C. 清热凉血，散瘀止痛

- D.清透虚热，凉血除蒸，解暑，截疟
- E.清热凉血，养阴生津
- 8.既能清热燥湿，长于清肺热，又能安胎的药物是
- A.黄芩
- B.黄连
- C.黄柏
- D.苦参
- E.龙胆草
- 9.能清热生津，消肿排脓的药物是
- A.知母
- B.栀子
- C.淡竹叶
- D.天花粉
- E.夏枯草
- 10.鱼腥草的功效为
- A.清热解毒，消痈排脓
- B.清热解毒，疏散风热
- C.清热解毒，清心利尿
- D.清热解毒，清肺化痰
- E.清热解毒，祛风止痛
- 11.善于清透阴分伏热，为治无汗骨蒸之要药的是
- A.赤芍

B.白薇

C.丹参

D.生地黄

E.牡丹皮

12.以下关于牵牛子的说法，错误的是

A.煎服，3~6g

B.孕妇忌用

C.入丸散剂，每次服 0.3~0.6g

D.不宜与巴豆同用

E.可杀虫攻积

13.既能祛痰利咽，又能泻下冷积的药物是

A.桔梗

B.蝉蜕

C.射干

D.巴豆

E.京大戟

14.豨莶草的主治不包括

A.风湿痹痛

B.半身不遂

C.疮疡肿毒

D.风疹湿疮

E.骨蒸潮热

15. 治疗胎动不安，肝肾不足之痹痛的药物是

- A. 独活
- B. 威灵仙
- C. 鸡血藤
- D. 桑寄生
- E. 海风藤

16. 既可化湿，又可发表解暑的中药是

- A. 佩兰
- B. 苍术
- C. 羌活
- D. 砂仁
- E. 独活

17. 苍术、厚朴、藿香、佩兰均可以治疗的病证是

- A. 风湿痹证
- B. 湿阻中焦
- C. 痰饮咳嗽
- D. 食积气滞
- E. 夜盲证

18. 下列哪项是虎杖的功效

- A. 利尿通淋，下乳，润肠
- B. 清利湿热，利胆退黄
- C. 利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿

D.利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，化痰止咳

E.利尿通淋，清心降火

19.既能利水渗湿，又能泄热的药物是

A.茯苓

B.薏苡仁

C.猪苓

D.泽泻

E.萆薢

20.功效为疏肝破气，消积化滞的药物是

A.橘皮

B.柴胡

C.香附

D.青皮

E.乌药

21.下列哪项是木香的功效

A.破气消积，化痰除痞

B.理气调中，温肾助阳

C.行气止痛，健脾消食

D.疏肝止痛，助阳止泻

E.行气止痛，散寒调中

22.功效是消食和胃的药物是

A.麦芽

B.莱菔子

C.神曲

D.谷芽

E.山楂

23.具有消食化积，行气散瘀功效的药物是

A.沉香

B.枳实

C.鸡内金

D.神曲

E.山楂

24.以下关于使君子说法正确的是

A.煎服，6~9g

B.炒香嚼服，小儿每岁每日1~1.5粒，1日总量不超过15粒，空腹服用，每日1次，连服

3天

C.大剂量服用可引起呃逆、眩晕等不良反应

D.可与热茶同服

E.本品甘温，既能驱虫，又能疗癣

25.脾不统血、冲脉失固之出血证应选用的中药是

A.收敛止血药

B.化瘀止血药

C.温经止血药

D.凉血止血药

E.以上均可以

26.三棱与莪木的共同作用是

A.破血行气，利水消肿

B.活血消痈，通络止痛

C.破血行气，消积止痛

D.活血调经，凉血安神

E.活血祛瘀，生肌敛疮

27.具有活血调经、凉血消痈、清心除烦作用的药物是

A.五灵脂

B.红花

C.桃仁

D.丹参

E.郁金

28.既破血逐瘀，又续筋接骨的中药是

A.莪术

B.土鳖虫

C.川芎

D.三棱

E.五灵脂

29.以下关于浙贝母与川贝母的描述错误的是

A.均具有清热化痰、散结消痈的作用

B.均可以治疗肺热咳嗽、瘰疬、乳痈等证

- C.川贝母主要用于虚劳咳嗽为宜
- D.浙贝母主要用于风热犯肺或痰热郁肺为宜
- E.畏乌头

30.用治痰热内结之咳嗽痰黄、质稠难咯、胸闷不畅，常与黄芩、枳实、胆南星等配伍的药物是

- A.天南星
- B.半夏
- C.瓜蒌
- D.川贝母
- E.浙贝母

31.下列药物忌火煨的是

- A.钩藤
- B.竹沥
- C.石决明
- D.琥珀
- E.代赭石

32.治疗温热病壮热神昏，热毒发斑，常与石膏、寒水石、麝香等配伍的药物是

- A.天麻
- B.羚羊角
- C.地龙
- D.全蝎
- E.蜈蚣

33.下列哪项不是苏合香的功效

- A.解毒
- B.醒神
- C.开窍
- D.辟秽
- E.止痛

34.功能开窍醒神，活血通经的药物是

- A.麝香
- B.牛黄
- C.苏合香
- D.冰片
- E.石菖蒲

35.沙苑子的主治病证不包括

- A.目暗不明
- B.阳痿遗精
- C.白带过多
- D.肾虚腰痛
- E.虚劳喘咳

36.既能补肝肾、益精血，又能解毒、润肠通便的药物是

- A.肉苁蓉
- B.锁阳
- C.墨旱莲

D.女贞子

E.何首乌

37.既为补血之圣药，又可润肠通便的药物是

A.当归

B.熟地黄

C.白芍

D.赤芍

E.阿胶

38.为养心敛液，固表止汗之佳品的药物是

A.浮小麦

B.麻黄根

C.糯米根须

D.诃子

E.赤石脂

39.既能益肾固精，又能缩尿明目的是

A.乌梅

B.莲子

C.覆盆子

D.桑螵蛸

E.海螵蛸

40.不属于佐药的作用是

A.配合君、臣药以加强治疗作用

- B.直接治疗次要兼证
- C.消除或减弱君、臣药的毒性，或制约其峻烈之性
- D.君药性味相反而又能在治疗中起相成作用
- E.引导诸药至病所的药物

41.不属于丸剂特点的是

- A.服用方便
- B.吸收缓慢
- C.药力持久
- D.不易变质
- E.适用于慢性虚弱性病证

42.银翘散与桑菊饮共有的药物除了连翘、甘草外，还有

- A.桔梗、薄荷、芦根
- B.桔梗、荆芥、薄荷
- C.芦根、薄荷、竹叶
- D.薄荷、竹叶、牛蒡子
- E.荆芥、薄荷、芦根

43.症见恶风发热，汗出头痛，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓或浮弱，应选用的方剂是

- A.麻黄汤
- B.桂枝汤
- C.九味羌活汤
- D.小青龙汤
- E.败毒散

44.黄龙汤和大承气汤均可以治疗的是

- A.阳明腑实证
- B.热结旁流证
- C.湿热瘀滞证
- D.气血不足证
- E.脾约证

45.关于逍遥散与痛泻药方的说法错误的是

- A.两方均可治疗肝郁脾虚之证
- B.痛泻药方以治肝为主
- C.逍遥散疏肝与健脾之力相当
- D.逍遥散主治肝郁血虚脾弱证
- E.痛泻药方主治脾虚肝旺之痛泻

46.治疗热入营分证的方剂是

- A.白虎汤
- B.黄连解毒汤
- C.龙胆泻肝汤
- D.仙方活命饮
- E.清营汤

47.芍药汤的功用是

- A.燥湿健脾，行气和胃
- B.宣畅气机，清利湿热
- C.清热化湿，理气和中

D.清热解毒，凉血止痢

E.清热燥湿，调和气血

48.属于清胃散功效的是

A.清胃凉血

B.清胃热，滋肾阴

C.泻肺清热，止咳平喘

D.解表清里

E.养阴透热

49.治疗患者暑湿证之暑热较重，六一散可加

A.麦冬

B.淡竹叶

C.石斛

D.海金沙

E.金钱草

50.六一散中滑石与甘草的比例是

A.6:1

B.2:1

C.5:1

D.3:1

E.1:1

51.以下药物哪项是小建中汤的君药

A.桂枝

B.生姜

C.大枣

D.白芍

E.饴糖

52.四逆汤的组成是

A.柴胡、白芍、枳实、甘草

B.桂枝、附子、细辛、甘草

C.肉桂、附子、细辛、甘草

D.附子、干姜、甘草

E.附子、肉桂、干姜

53.以下哪项是生脉散与炙甘草汤具有的共同功用

A.复脉定悸

B.生津润燥

C.通阳复脉

D.益气养阴

E.敛阴止汗

54.以下哪项是生脉散的功用

A.益气生津，养阴敛汗

B.益气养阴，通阳复脉

C.补脾疏肝，化湿止带

D.清热生津，益气和胃

E.益气补血，健脾养心

55.参苓白术散和归脾汤中共同含有的药物是

- A.山药、薏苡仁
- B.砂仁、陈皮
- C.山药、薏苡仁
- D.白茯苓、白术
- E.人参、山药

56.以下方剂中有生地黄的是

- A.六味地黄丸
- B.大补阴丸
- C.一贯煎
- D.地黄饮子
- E.八珍汤

57.真人养脏汤的功用是

- A.清热解毒、凉血止痢
- B.健脾益气、渗湿止泻
- C.涩肠固脱，温补脾肾
- D.温中祛寒、涩肠止痢
- E.温肾暖脾、固肠止泻

58.天王补心丹中配伍茯苓的用意是

- A.健脾
- B.宁心
- C.消痰

D.渗湿

E.利水

59.紫雪的主治病证是

A.痰热内闭心包证

B.痰闭内陷心包证

C.热盛动风证

D.暑令时疫

E.暑秽

60.少腹引控辜丸而痛，偏坠肿胀，舌淡苔白，脉弦，宜选用的方剂是

A.定喘汤

B.天台乌药散

C.半夏厚朴汤

D.暖肝煎

E.苏子降气汤

61.桃核承气汤适用于

A.阳明腑实证

B.水热互结证

C.下焦蓄水证

D.下焦蓄血证

E.以上都不是

62.下列方剂中，不具有凉血止血功用的是

A.小蓟饮子

B.十灰散

C.四生丸

D.生化汤

E.槐花散

63.羚羊钩藤汤中作用是养阴增液药组是

A.当归、白芍

B.川芎、生地

C.白芍、生地

D.石膏、白芷

E.川贝母、钩藤

64.以下方剂中同用龙骨、牡蛎的是

A.天麻钩藤饮

B.朱砂安神丸

C.五消风散

D.羚角钩藤汤

E.镇肝熄风汤

65.杏苏散的功用是

A.宣利肺气、疏风止咳

B.宣肺解表、祛痰止咳

C.发散风寒、降气化痰

D.辛宣温润、止咳化痰

E.发汗解表、宣肺平喘

66.八正散主治的是

- A.湿滞脾胃证
- B.湿热黄疸
- C.湿热淋证
- D.中阳不足之痰饮
- E.阳虚水泛证

67.杏仁在三仁汤中的用意是

- A.畅达中焦气机
- B.降气平喘化痰
- C.降气润肠通便
- D.宣利上焦肺气
- E.宣肺止咳平喘

68.主治风邪犯肺之咳嗽的是

- A.半夏白术天麻汤
- B.小陷胸汤
- C.清气化痰丸
- D.止嗽散
- E.贝母瓜蒌散

69.下列各项，不属于清气化痰丸所治病证临床表现的是

- A.胸膈痞闷
- B.咳痰清稀
- C.痰黏稠难咯

D.舌红苔黄腻

E.脉滑数

70.连翘在保和丸中的用意是

A.消痈散结

B.清热解毒

C.清热散结

D.清热泻火

E.利尿

71.乌梅丸中苦以下蛔虫，清泻内热的药物是

A.乌梅、细辛

B.细辛、大黄

C.大黄、黄连

D.黄连、黄柏

E.蜀椒、细辛

二、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

1.A.牛蒡子

B.蝉蜕

C.荆芥

D.桑叶

E.薄荷

- (1) 具有疏散风热，解毒消肿，利咽透疹功效的药物是
- (2) 具有疏散风热，明目透疹，解痉功效的药物是

2.A.清热燥湿，泻火安胎

B.清热燥湿，泻火除蒸

C.清热燥湿，清胃止呕

D.清热燥湿，杀虫

E.清热燥湿，泻肝胆火

- (1) 黄柏的功效是
- (2) 苦参的功效是

3.A.清热解毒，利水消肿

B.清热解毒，凉血利咽

C.清热解毒，凉血消斑

D.清热解毒，祛风燥湿

E.清热凉血，利尿消肿

- (1) 板蓝根的功效是
- (2) 大青叶的功效是
- (3) 青黛的功效是

4.A.泽泻

B.薏苡仁

C.石韦

D.萹藨

E.茵陈

- (1) 具有清热利湿退黄功效的药物是
- (2) 具有利水渗湿，泄热、化浊降脂功效的药物是

5.A.肾阳不足，畏寒肢冷

B.气虚不足，倦怠乏力

C.神志昏迷，不省人事

D.亡阳暴脱，四肢厥逆

E.元气暴脱，虚汗脉微

- (1) 上述哪项是附子、干姜共同治疗的病证
- (2) 上述哪项是附子、肉桂共同治疗的病证

6.A.虚寒出血

B.肺胃出血

C.头面出血

D.上焦出血

E.下焦出血

- (1) 白及适用于治疗的病证是
- (2) 地榆适用于治疗的病证是

7.A.祛顽痰，通窍开闭，祛风杀虫

B.祛风痰，定惊搐，止痛，解毒散结

C.降气化痰止咳

D.清化热痰，除烦止呕

E.消痰行水，降气止呕

(1) 白附子的功效是

(2) 白前的功效是

8.A.补肝肾，强筋骨，安胎

B.祛风湿，强筋骨，润肠通便

C.补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏

D.补益肝肾，乌须明目，凉血止血

E.补肝肾，强筋骨，壮肾阳

(1) 杜仲的功效是

(2) 续断的功效是

9.A.麻黄、桂枝

B.麻黄、细辛

C.桂枝、细辛

D.干姜、细辛

E.干姜、半夏

(1) 小青龙汤中主要发挥发汗解表药作用的药物是

(2) 小青龙汤中主要发挥温肺化饮作用的药物是

10.A.温肾益精，润肠通便

B.滋阴养血，润肠通便

C.温补脾阳，攻下冷积

D.养阴清热，润肠通便

E.滋阴增液，通便泻热

(1) 济川煎的功用是

(2) 温脾汤的功用是

11.A.六味地黄丸

B.大补阴丸

C.肾气丸

D.归脾汤

E.当归补血汤

(1) 重用干地黄的方剂是

(2) 重用黄芪的方剂是

12.A.朱砂

B.雄黄

C.玄参

D.槟榔

E.川乌

(1) 天台乌药散含有

(2) 天王补心丹中含有

13.A.炙甘草汤

B.归脾汤

C.生脉散

D.麦门冬汤

E.百合固金汤

(1) 治疗肺胃阴虚之虚热肺痿，宜首选

(2) 治疗阴血不足，阳气衰弱，心动悸、脉结代，宜首选

14.A.燥湿运脾，行气和胃

B.益气祛风，健脾利水


C.清热，利湿，退黄

D.清热泻火，利水通淋

E.宣畅气机，清利湿热

(1) 防己黄芪汤的功用是

(2) 三仁汤的功用是



每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



正保医学教育网
www.med66.com

《相关专业知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 1.同一种疾病，若其表现的证不同，其治法应采用
 - A.辨证论治
 - B.对症治疗
 - C.同病异治
 - D.异病同治
 - E.辨病治疗
- 2.《景岳全书新方八略》所说“阴得阳升而泉源不竭”的治疗法则，是指
 - A.阳中求阴，阴气得复
 - B.益火之源，以消阴翳
 - C.阴中求阳，阳气充盛
 - D.阳病治阴，阴阳平衡
 - E.壮水之主，以制阳光
- 3.下列哪项可以说明“阴胜则阳病，阳胜则阴病；阴虚则热，阳虚则寒”之间所存在的阴阳关系
 - A.互为消长
 - B.平衡协调
 - C.对立制约
 - D.相互转化

E.互根互用

4.按照事物或现象阴阳属性的划分原则，下列各项中属阳的是

A.寒凉

B.静止

C.抑制

D.下降

E.运动

5.五志相胜，思所胜的是

A.惊

B.恐

C.悲

D.怒

E.喜

6.水之不足无以生木，则木干枯而母子皆衰，所指现象是

A.母病及子

B.子病及母

C.母子相及

D.母子相犯

E.母子皆病

7.产生“天癸”的主要物质是

A.肾中之精气

B.肾阳之温煦

C.肾阴之濡润

D.肾之封藏

E.元气之充足

8.与神志活动关系最密切的脏是

A.肝

B.肺

C.肾

D.脾

E.心

9.六腑共同的生理特点是

A.化生和贮藏精气

B.泻而不藏、实而不满

C.调节精神活动

D.藏而不泄

E.满而不能实

10.气的基本运动形式是

A.上升下降

B.上入下出

C.内外出入

D.升降出入

E.左进右出

11.易于感冒，是气的哪个作用减弱的表现



- A.防御作用
- B.温煦作用
- C.固摄作用
- D.气化作用
- E.推动作用

12.女子胞的主要功能是

- A.主藏血
- B.贮存元气
- C.产生天癸
- D.主持月经
- E.运化血液

13.任脉的称谓是

- A.气海
- B.髓海
- C.阴脉之海
- D.阳脉之海
- E.血海

14.下列属于阴邪的是

- A.风邪
- B.暑邪
- C.湿邪
- D.疠气



E.火邪

15.易于阻滞气机而见胸闷脘痞的邪气是

A.寒邪

B.瘀血

C.湿邪

D.暑邪

E.燥邪

16.暴怒会伤害

A.心

B.脾

C.肾

D.肝

E.肺

17.七情致病影响脏腑气机，下面不正确的说法是

A.恐则气乱

B.怒则气上

C.悲则气消

D.思则气结

E.喜则气缓

18.“正气存内，邪不可干”指的是

A.正气充足，与邪相争

B.正气旺盛，邪气难以入侵



C.正气虚弱，邪气不足

D.邪气是发病的重要条件

E.正气不足，邪气易于侵犯人体

19.痊愈或已经痊愈的疾病再度发作属于

A.复发

B.顿发

C.伏而后发

D.继发

E.徐发

20.下面哪一项不属于气虚的病理状态

A.元气耗损

B.少气懒言

C.脏腑功能衰退

D.抗病能力下降

E.肝郁气滞

21.人体发病的内在根据是

A.气血失常

B.阳偏盛

C.阴偏盛

D.正气不足

E.邪气入侵

22.三部脉举之无力，重按空虚的脉象是

- A.虚脉
- B.滑脉
- C.弱脉
- D.伏脉
- E.革脉

23.下列哪项为真热假寒证最突出的临床表现

- A.身灼热肢厥
- B.脉滑数
- C.汗出口渴
- D.五心烦热
- E.神昏头痛

24.痰少而黏，难于咯出，甚则无痰者，多为

- A.寒痰
- B.热痰
- C.燥痰
- D.痰湿
- E.肺痈

25.症见精神萎靡，面色无华，身倦乏力，气短自汗者，多为

- A.实证
- B.虚证
- C.热证
- D.寒证

E.表证

26.症见恶热喜凉，渴喜冷饮，大便秘结，小便短赤，脉数，属于

A.热证

B.寒证

C.虚证

D.实证

E.阳证

27.下列属于阳证的是

A.里证、寒证、虚证

B.里证、寒证、实证

C.表证、热证、实证

D.表证、寒证、实证

E.里证、热证、实证

28.呼吸困难，短促急迫，甚者张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧者，多为

A.哮

B.喘

C.少气

D.叹息

E.短气

29.治疗时需遵循“急则治其标”治则的是

A.外感病后期，遗留的咳嗽

B.大出血的病人

C.肺癆咳嗽

D.热病后期伤及人体阴液

E.虚人外感

30.药品质量管理的内容不包括

A.执行药品质量标准

B.制定药品质量标准

C.人员的配备和培训

D.药品使用中影响使用质量的因素

E.对药品生产、经营企业的管理

31.世界各国通常将药房分为

A.社会药房和家庭药房

B.社会药房和私立药房

C.社会药房和药店

D.社会药房和医院药房

E.门诊药房和医院药房

32.由省级药品监督管理部门制定的是

A.中药饮片炮制规范

B.中药材种植规范

C.部颁标准

D.药典

E.药品注册标准

33.药事管理的核心是

A.对药事活动依法管理

B.对科学化、规范化用药

C.保证安全、有效

D.保证药品质量

E.保证经济、有效

34.以下关于国家药品标准论述不正确的是

A.属于法定标准

B.国家药品标准制定的法定机构是国家食品药品监督管理局

C.国家对药品质量规格及检验方法做出的技术规定

D.国家对药品的生产与经营规则做出的技术规定

E.药品生产、经营、使用、检验和管理部门共同遵守

35.在规定的适应证、用法和用量的条件下，能满足预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能的性能，是指药品质量的

A.有效性

B.安全性

C.稳定性

D.均一性

E.经济性

36.药品流通行业的管理部门是

A.国家发展与改革委员会

B.国家中医药管理局

C.工业和信息化部

D.商务部

E.国家工商行政管理总局

37.负责药品和医疗服务价格管理的部门是

A.药品审评中心

B.国家药品监督管理局

C.国家医疗保障局

D.国家中医药管理局

E.国家市场监督管理总局

38.中药材生产质量管理规范，英文简称为

A.GLP

B.GAP

C.GCP

D.GMP

E.GSP

39.中药品种保护的目的是

A.提高产品质量

B.规范药品流通市场

C.提高中药品种质量、保护中药生产企业合法权益，促进中药事业的发展

D.淘汰落后、劣质产品，扩大优质品种市场

E.维护中药生产企业合法利益，制止不正当竞争

40.以下哪项是发展中医药事业的方针

A.加强对外合作

B.加强中医药资源管理

C.加强中医药资源的保护

D.中西医并重

E.促进民族药发展

41.申请设立中药材市场，必须由哪个部门审批

A.省级药品监督管理局

B.地方人民政府

C.国务院有关主管部门

D.国家工商总局

E.国家物价局

42.负责对造成麻醉药品药用原植物、麻醉药品和精神药品流入非法渠道的行为进行查处的部门是

A.国务院药品监督管理部门

B.卫生与计划生育委员会

C.国务院公安部门

D.中国药品生物制品检定所

E.工商管理部门

43.科学研究、教学单位需要使用麻醉药品和精神药品开展实验、教学活动的，需由哪个部门批准

A.国家食品药品监督管理局

B.省级食品药品监督管理局

C.市级食品药品监督管理局

D.县级食品药品监督管理局

E.卫生行政部门

44.以下说法正确的是

A.麻醉药品和第一类精神药品不需要进行临床试验

B.麻醉药品和第一类精神药品的临床试验，不得以健康人为受试对象

C.麻醉药品和第一类精神药品的临床试验，必须以健康人为受试对象

D.麻醉药品需要进行临床试验，第一类精神药品无需进行临床试验

E.麻醉药品不需要进行临床试验

45.麻醉药品的使用单位专用账册的保存期限是

A.有效期期满之日起不少于 4 年

B.有效期期满之日起不少于 5 年

C.有效期期满之日起不少于 3 年

D.有效期期满之日起不少于 2 年

E.有效期期满之日起不少于 1 年

46.医疗机构供应和调配毒性药品，每次处方剂量不得超过

A.2 日极量

B.3 日极量

C.4 日极量

D.7 日极量

E.15 日极量

47.下列药物中不纳入国家基本药物目录遴选范围的是

A.化学药品

B.生物制品

C.中成药

D.非临床治疗首选的药物

E.常见的野生动植物药材

48.国家基本药物的遴选原则不包括

A.基层能够配备、防治必需

B.临床常用、适合国情

C.中西药并重、基本保障

D.使用方便、临床首选

E.安全有效、价格合理

49.托运或者自行运输麻醉药品和第一类精神药品的单位领取的运输证明，有效期为

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

E.5 年

50.处方开具当日有效，特殊情况下可以延长有效期，但最长不能超过

A.1 天

B.2 天

C.3 天

D.5 天

E.7 天

51.不属于“四查十对”中的“十对”的是

- A.对科别
- B.对金额
- C.对规格
- D.对姓名
- E.对年龄

52.获知药品群体不良事件后药品生产企业应当立即开展调查，于几日内完成调查报告

- A.3
- B.7
- C.10
- D.15
- E.30

53.根据 GSP 的要求，以下关于药品批发企业中药品储存与养护的说法错误的是

- A.药品与非药品分开存放
- B.外用药与其他药品分库存放
- C.中药材和中药饮片分库存放
- D.拆除外包装的零货药品应当集中存放

54.以下不属于中药方法发明的是

- A.中药饮片的制备方法
- B.药材新的药用部位及其制剂
- C.中药提取物的制备方法
- D.中药材在制备药品中的新用途

E.新的制剂工艺

55.药品的内标签包装尺寸过小，可以不标注的内容是

A.通用名称

B.适应证

C.规格

D.产品批号

E.有效期

56.发运中药材必须有包装，但是在每件包装上，不必注明的内容是

A.产地

B.日期

C.调出单位

D.商标

E.质量合格的标志

57.不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销，不倒卖号源体现的医疗人员基本行为规范是

A.遵纪守法，依法执业

B.优质服务、医患和谐

C.廉洁自律、恪守医德

D.严谨求实、精益求精

E.爱岗敬业、团结协作

58.属于表证特点的是

A.恶寒不发热

B.苔薄、脉浮

C.尿少色黄或清长

D.鼻流黄涕

E.起病急、病程长

59.心气涣散，神不守舍，多由下列何种因素引起

A.喜伤心

B.怒伤肝

C.思伤脾

D.悲伤肺

E.恐伤肾

60.关于“疫气”的叫法，下列哪项不正确

A.戾气

B.疫毒

C.时行疫气

D.病气

E.乖戾之气

61.凶填指

A.凶门突起

B.凶门平坦

C.凶门脱发

D.小儿凶门迟闭，骨缝不合

E.凶门下陷

62.鼻流浊涕腥秽如鱼脑者称为

- A.口气
- B.汗气
- C.鼻渊
- D.身臭
- E.渣鼻

63.心阳暴脱证的临床表现是

- A.心悸怔忡，失眠多梦
- B.心悸失眠，手足心热
- C.心悸怔忡，神疲体倦
- D.心悸怔忡，形寒肢冷
- E.突然冷汗淋漓，四肢厥冷

64.负责对已批准生产上市的药品进行再评价的技术职能部门是

- A.中国药品生物制品检定所
- B.国家药典委员会
- C.药品审查中心
- D.药品评价中心
- E.国家重要品种保护评审委员会

65.中药最本质的特点是

- A.采用中药进行治疗
- B.中药治疗、理疗辅助
- C.国家实行保护制度

D.国家采取放开发展制度

E.在中医辨证理论指导下应用

二、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

1.A.思

B.怒

C.悲

D.恐

E.喜

(1) 在五志的五行归类中属于“火”的情志是

(2) 在五志的五行归类中属于“木”的情志是

(3) 在五志的五行归类中属于“水”的情志是

2.A.雾

B.雨

C.雪

D.沍

E.淅

(1) 上焦如

(2) 中焦如

(3) 下焦如

3.A.风邪

B.寒邪

C.暑邪

D.燥邪

E.湿邪

(1) 具有善行数变，动摇不定特性的是

(2) 具有寒凉、凝滞、收引特性的是

(3) 具有炎热、升散、挟湿特性的是

(4) 具有重浊、黏滞、阻滞气机特性的是

(5) 具有干燥、涩滞特性的是

4.A.气滞

B.气闭

C.气脱

D.气陷

E.气逆

(1) 气上升太过，或下降不及指的是

(2) 气无力升举指的是

5.A.虚脉

B.紧脉

C.实脉

D.濡脉

E.涩脉

(1) 脉来绷紧，往来无力

(2) 脉浮而细软，轻手即得，重按不显的是

6.A.头昏耳鸣，两目干涩，胁肋灼痛

B.高热，心烦，手足抽搐，颈项强直

C.肢体震颤，项强，步履不正，手足麻木

D.手足震颤，肢体麻木，眩晕耳鸣，爪甲、口唇色淡

E.眩晕耳鸣，潮热颧红，口咽干燥，形体消瘦

(1) 肝阳化风证的主要临床表现是

(2) 阴虚动风证的主要临床表现是

7.A.审因论治

B.标本兼治

C.因人制宜

D.因时制宜

E.因地制宜

(1) 上述理论依据中，结合患者的年龄、性别、体质确立治则的是

(2) 上述理论依据中，结合不同季节气候特点确立治则的是

8.A.1 级

B.2 级

C.3 级

D.4 级

E.5 级

(1) 中药哪个级别的品种保护期限为 20 年

(2) 中药哪个级别的品种保护期限为 30 年

(3) 中药哪个级别的品种保护期限为 7 年

9.A. 1 日常用量

B.2 日常用量

C.3 日常用量

D.2 日极量

E.7 日常用量

(1) 毒性药品每次每张处方不超过

(2) 一类精神药品每次每张处方不超过

10.A.片剂

B.丸剂

C.胶囊剂

D.注射剂

E.中药饮片

(1) 以剂为单位的是

(2) 以支、瓶为单位的是

11.A.应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方

B.不调剂即可

C.应当拒绝调剂，及时告知处方医师，并应当记录，按照有关规定报告

D.药师应当按照有关规定报告

E.应当经所在医疗机构有处方权的职业医师审核、并签名或加盖专用签章后方有效

(1) 药师经处方审核后，认为存在用药不适宜时

(2) 药师发现严重不合理用药或者用药错误

12.A.报告该药品的所有不良反应

B.报告新的和严重的不良反应

C.报告新的不良反应

D.报告严重的不良反应

E.每五年报告一次

(1) 进口药品自首次获准进口之日起 5 年内，应当

(2) 进口药品自首次获准进口之日起满 5 年的，应当

13.A.火性急迫，易生风动血

B.火为阳邪，其性炎上

C.火易伤津耗气

D.火毒结聚，易致肿疡

E.火性躁动，易扰心神

(1) 胃火上扰则牙龈肿痛、口臭，体现的火邪的致病特点是

(2) “壮火食气”、“壮火散气”体现的火邪的哪个致病特点

14.A.黄色专有标识

B.红色专有标识

C.绿色专有标识

D.蓝色专有标识

E.白色专有标识

(1) 甲类非处方药的专有标识为

(2) 乙类非处方药的专有标识为

(3) 非处方药的指南性标识为

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



正保医学教育网

www.med66.com

《专业知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 柏子仁去油制霜的炮制目的是

- A. 降低毒性
- B. 消除副作用
- C. 改变药物作用趋势
- D. 增强疗效
- E. 矫臭矫味

2. 怀牛膝宜切制成

- A. 极薄片
- B. 薄片
- C. 段
- D. 丝
- E. 块

3. 乌梅的净制方法为

- A. 去毛
- B. 去根
- C. 去核
- D. 去心
- E. 去皮壳



4. 须刷去毛的药材是

- A. 骨碎补
- B. 知母
- C. 鹿茸
- D. 金樱子
- E. 枇杷叶

5. 姜炙时，每 100kg 药物用干姜

- A. 1/3kg
- B. 1/10kg
- C. 2/10kg
- D. 2/5kg
- E. 1/2kg

6. 盐炙后长于滋阴降火，退虚热的药物是

- A. 黄芩
- B. 黄柏
- C. 杜仲
- D. 蕲蛇
- E. 大黄

7. 滑石粉炒制时，每 100kg 药物用滑石粉

- A. 10 ~ 20kg
- B. 30 ~ 40kg
- C. 40 ~ 50kg

D.5 ~ 10kg

E.10 ~ 15kg

8.以补血止血为主的是

A.鲜地黄

B.生地黄

C.熟地黄

D.生地炭

E.熟地炭

9.既可麸炒又可土炒的药物是

A.苍术

B.白术

C.斑蝥

D.僵蚕

E.枳实

10.宜采用油炙法炮制的是

A.沙苑子

B.蛇蜕

C.乌梢蛇

D.地龙

E.蛤蚧

11.土炒白术时，每 100kg 药物，用灶心土

A.10kg

B.20kg

C.25kg

D.35kg

E.40kg

12.下列关于蛤粉炒相关内容，说法错误的是

A.胶块切成立方丁，大小分档，分别炒制

B.炒制时火力不宜过大，以防药物黏结、焦糊或“烫僵”

C.蛤粉炒时，每 100kg 药物，用蛤粉 30~50kg

D.蛤粉烫炒同种药物不可连续使用，需要及时更换辅料

E.贵重、细料药物在大批炒制前最好先采取试投的方法

13.紫菀最常用的炮制方法是

A.酒炙

B.姜炙

C.盐炙

D.蜜炙

E.醋炙

14.下列药物不采用炒炭炮制的药物是

A.白果

B.小蓟

C.地榆

D.侧柏叶

E.白茅根

15.长于破血的是

- A.全当归
- B.当归头
- C.当归身
- D.当归尾
- E.当归头+当归身

16.下列不采用麸炒的药材是

- A.白术
- B.苍术
- C.僵蚕
- D.山药
- E.荆芥

17.以下哪个液体辅料具有引药下行的功效

- A.盐水
- B.酒
- C.醋
- D.姜汁
- E.蜂蜜

18.酒作为炮制辅料其作用为

- A.发表散寒，温中止呕
- B.行水消肿，散瘀止痛
- C.活血通络，祛风散寒

D.软坚散结，清热凉血

E.润燥通便，解毒生肌

19.用酒炮制可使药性转化为

A.藏

B.沉

C.降

D.收

E.升

20.库房购入麻黄药材 1100 件，取样件数为

A.51 件

B.52 件

C.53 件

D.54 件

E.55 件

21.中药鉴定的依据是

A.国际药品标准和国内药品标准

B.国家药品标准和部颁药品标准

C.《中国药典》和地方药品标准

D.国家药品标准和地方药品标准

E.《中国药典》和部颁药品标准

22.川贝母的药材来源不包括

A.暗紫贝母

B.梭砂贝母

C.太白贝母

D.橙黄贝母

E.瓦布贝母

23.习称“鹦哥嘴”或“红小辫”的中药是

A.升麻

B.天麻

C.郁金

D.麻黄

E.桂枝

24.“怀中抱月”是形容

A.川贝中炉贝外面两鳞叶大小相近，顶端瘦尖的形态

B.浙贝中的大贝鳞叶一面凹入，一面凸出，呈新月状的形态

C.浙贝中的珠贝外层两鳞叶略呈肾形，互相对合，其内有 2~3 枚小鳞叶

D.川贝中青贝外层两鳞叶大小相近，相对抱合的形态

E.川贝中松贝外层两鳞片大小悬殊，大瓣紧抱小瓣的形态

25.浙贝母的主要包括哪些品种

A.青贝、伊贝

B.平贝、大贝

C.炉贝、青贝

D.珠贝、松贝

E.大贝、珠贝

26.气微，味微甜、略苦，嚼之有黏性的是

- A.天冬
- B.麦冬
- C.知母
- D.射干
- E.莪术

27.三七的主要产地是

- A.云南碧江
- B.广西田阳
- C.甘肃岷县
- D.河南长葛
- E.四川石柱

28.延胡索主产于

- A.河南
- B.浙江
- C.河北
- D.湖南
- E.云南

29.下列关于单子叶植物根的说法正确的是

- A.根外表常有栓皮，较粗糙
- B.根的横断面，有一圈形成层的环纹，环内的木质部范围较环外的皮部大
- C.中央无髓部，自中心向外有放射状纹理



D.根的外表无木栓层，有的具较薄的栓化组织

E.表面常有纹横纹或纵纹，有的可见皮孔

30.下列根类中药的次生构造不发达，无周皮而有表皮的是

A.威灵仙

B.细辛

C.川乌

D.何首乌

E.商陆

31.药材一端有浅黄色的茎叶残痕，习称“金包头”，嚼之带黏性的中药是

A.威灵仙

B.板蓝根

C.知母

D.百部

E.前胡

32.表面灰黄色至黄棕色，有明显不规则的纵沟，质较软而结实，断面裂隙较少，皮部黄白色。该药材为

A.东党参

B.素花党参

C.川党参

D.西党参

E.党参

33.表面灰棕色，粗糙，有纵皱纹、多数横长皮孔样突起及点状的细根痕。根头部有明显密

集环纹的药材是

- A.银柴胡
- B.党参
- C.人参
- D.防风
- E.川木香

34.根头部有明显密集环纹，习称“蚯蚓头”的中药是

- A.独活
- B.防风
- C.羌活
- D.当归
- E.川芎

35.有“通道细胞”存在的中药是

- A.百部
- B.知母
- C.射干
- D.麦冬
- E.天麻

36.赤芍的味是

- A.味咸而麻，刺舌
- B.味苦
- C.味微苦、酸

D.味微苦、酸涩

E.味淡

37.药材表面棕黑色，断面木部近圆形，味辛辣的是

A.威灵仙

B.棉团铁线莲

C.东北铁线莲

D.黑顺片

E.盐附子

38.表面有盐霜的是

A.泥附子

B.盐附子

C.知母

D.白附片

E.黑顺片

39.防己的鉴别特征是

A.菊花心

B.罗盘纹

C.车轮纹

D.狮子头

E.筋脉点

40.药材钩藤的来源于

A.毛茛科



B.茜草科

C.木通科

D.豆科

E.瑞香科

41.下列属于于木通科植物的药材是

A.大血藤

B.苏木

C.鸡血藤

D.钩藤

E.川木通

42.沉香来源科属是

A.木通科

B.五加科

C.豆科

D.毛茛科

E.瑞香科

43.厚朴主产于

A.山东、山西

B.广东、广西

C.四川、湖北

D.广西、云南

E.甘肃、新疆



正保医学教育网

www.med66.com

44.以皮厚、肉细、油性足、内表面紫棕色具有发亮结晶物为佳的药材是

- A.地骨皮
- B.厚朴
- C.香加皮
- D.秦皮
- E.杜仲

45.形状略呈研棒状的中药是

- A.沉香
- B.降香
- C.木香
- D.丁香
- E.檀香

46.烘干品质柔韧，气特异；晒干品质脆，气微，味微苦的药材是

- A.辛夷
- B.洋金花
- C.红花
- D.西红花
- E.款冬花

47.开放者花冠筒状，先端二唇形；雄蕊 5，附于筒壁，黄色；雌蕊 1，子房无毛。气清香，味淡、微苦的药材是

- A.丁香
- B.金银花

C.山银花

D.辛夷

E.红腺忍冬

48.以色淡黄绿、穗长而密、香气浓者为佳的是

A.益母草

B.金钱草

C.广藿香

D.荆芥

E.薄荷

49.常缠结成团，无毛或被疏柔毛。茎扭曲，表面棕色或暗棕红色，有纵纹，下部茎节上有时具须根，断面实心的药材是

A.穿心莲

B.益母草

C.薄荷

D.半枝莲

E.金钱草

50.金樱子的来源是

A.蔷薇科植物金樱子的种子

B.蔷薇科植物金樱子的果实

C.木兰科植物金樱子的果实

D.木兰科植物金樱子的种子

E.豆科植物金樱子的种子

51.呈纽扣状扁圆板形，表面有丝样光泽，此药材是

- A.葶苈子
- B.马钱子
- C.连翘
- D.补骨脂
- E.栀子

52.海藻属于

- A.红藻门
- B.绿藻门
- C.褐藻门
- D.蓝藻门
- E.黄藻门

53.下列描述属于栽培灵芝的性状特征

- A.外形似伞状，菌盖肾形、半圆形或近圆形
- B.皮壳硬坚，黄褐色至红褐色
- C.具环状棱纹及辐射状皱纹
- D.菌肉锈褐色
- E.皮壳外常被有大量粉尘样的黄褐色孢子

54.下列属于子实体入药的是

- A.海藻
- B.猪苓
- C.茯苓

D.冬虫夏草

E.灵芝

55.下列哪项为酯树脂类药材

A.乳香

B.血竭

C.没药

D.阿魏

E.松香

56.树脂主要是由植物体内的哪一部分经过复杂的化学变化而形成的

A.生物碱

B.挥发油

C.鞣质

D.皂苷

E.黄酮

57.壁厚，且内壁平滑，有黑褐色死蚜虫及灰色粉末状排泄物。气特异，味涩的药材是

A.地龙

B.儿茶

C.青黛

D.肚倍

E.角倍

58.关于儿茶的内容说法错误的是

A.来源于豆科植物儿茶

- B.为深蓝色的粉末，体轻，易飞扬
- C.质硬，易碎，断面不整齐
- D.呈方形或不规则块状，大小不一
- E.无臭，味涩、苦，略回甜

59.药材蕲蛇原动物的科名是

- A.蝰科
- B.眼镜蛇科
- C.雉科
- D.游蛇科
- E.壁虎科

60.羚羊角药材的来源是

- A.鹅喉羚羊雌兽
- B.赛加羚羊雌兽
- C.藏羚羊雌兽
- D.赛加羚羊雄兽
- E.藏羚羊雄兽

61.药材金钱白花蛇的白色环纹在背部的宽度为

- A.2~3 枚鳞片
- B.1~2 枚鳞片
- C.4~5 枚鳞片
- D.4 枚鳞片
- E.5 枚鳞片

62.以下不属于病理产物的是

- A.牛黄
- B.麝香
- C.僵蚕
- D.马宝
- E.珍珠

63.下列不属于除去内脏动物体入药的是

- A.蚯蚓
- B.地龙
- C.斑蝥
- D.乌梢蛇
- E.蕲蛇

64.条痕白色，质软，指甲可刻划成痕，纵断面显绢丝样光泽的药材是

- A.石膏
- B.信石
- C.朱砂
- D.代赭石
- E.雄黄

65.按阳离子分类，以下属于汞化合物类的是

- A.硫黄
- B.轻粉
- C.自然铜

D.信石

E.硼砂

66. 药物中所含水以结构水形式存在的是

A.石膏

B.胆矾

C.滑石

D.芒硝

E.自然铜

二、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

1.A.棕黑色

B.樱红色

C.白色

D.黄棕色

E.紫色

(1) 自然铜的条痕色是

(2) 赭石的条痕色是

2.A.牛黄

B.水蛭

C.鸡内金

D.乌梢蛇

E.五灵脂

- (1) 属于动物生理产物的药材是
- (2) 属于动物除内脏干燥体的药材是
- (3) 属于动物病理产物的药材是

3.A.没药

B.血竭

C.乳香

D.儿茶

E.五倍子

- (1) 粉末砖红色，在水中不溶，在热水中软化的是
- (2) 加水研磨成白色或黄白色乳状液的中药材为

4.A.草质茎

B.干燥叶

C.地上部分

D.肉质茎

E.茎叶

- (1) 麻黄的药用部位是
- (2) 淫羊藿的药用部位是
- (3) 肉苁蓉的药用部位是
- (4) 广藿香的药用部位是

5.A.以柱头色棕红、黄色花柱少者为佳

- B.以花冠色红而鲜艳、无枝刺、质柔润、手握软如茸毛者为佳
- C.以完整，个大，油性足，颜色深红、香气浓郁、入水下沉者为佳
- D.以朵大，不破碎，花冠肥厚者为佳
- E.以花蕾完整、内瓣紧密、无枝梗、香气浓者为佳

(1) 西红花

(2) 丁香

(3) 红花

6.A.河北、陕西

B.山东、上海

C.印度南端丁内未利

D.埃及的尼罗河中上游

E.云南、广东

(1) 大青叶的主产地是

(2) 狭叶番泻的主产地是

7.A.海南、云南、广东、广西

B.广东、海南、广西、福建

C.广西、广东、湖北、湖南

D.云南、福建、广东、广西

E.台湾、广东、广西、贵州

(1) 苏木的主产于

(2) 沉香的主产于

(3) 钩藤的主产于



8.A.气微，味淡

B.气微香，味微甜

C.气微，味涩

D.气芳香，味苦

E.气微，味酸涩

(1) 沉香药材的气味是

(2) 鸡血藤药材的气味是

9.A.羌活

B.川芎

C.北沙参

D.前胡

E.知母

(1) 药材气芳香，味先甜后微苦辛，该药材指的是

(2) 药材气浓香，味苦辛，稍有麻舌感，微回甜，该药材指的是

(3) 药材气特异，味微甜，该药材指的是

10.A.挑选

B.风选

C.水洗

D.筛选

E.磁选

(1) 子实类药材除去杂质常选用的方法是

(2) 菟丝子、瓦楞子除去附着的泥沙需要采用的方法是

11.A.生黄柏

B.酒黄柏

C.盐黄柏

D.黄柏炭

E.醋黄柏

(1) 长于清湿热，利关节的饮片是

(2) 长于清热止血的饮片是

(3) 长于滋阴降火的饮片是

12.A.缓和温燥之性

B.缓和克伐伤正之性

C.缓和苦寒之性

D.缓和酸性

E.矫臭矫味

(1) 槟榔炒焦的目的是

(2) 山楂炒焦的目的是

(3) 栀子炒焦的目的是

13.A.降低药物滋腻之性

B.增强健脾止泻作用

C.降低毒性

D.消除副作用

E.便于去毛

(1) 斑蝥米炒可以

(2) 党参米炒可以

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



正保医学教育网

www.med66.com

《专业实践能力》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 下列不属于黏膜给药的剂型是

- A. 吸入气雾剂
- B. 栓剂
- C. 透皮贴膏
- D. 舌下片
- E. 滴鼻剂

2. 适合含有抑菌剂的 1 ~ 2ml 注射液灭菌的方法是

- A. 热压灭菌法
- B. 流通蒸汽灭菌法
- C. 紫外线灭菌法
- D. 辐射灭菌法
- E. 低温间歇灭菌法

3. 含挥发性成分的茶剂干燥时的温度宜

- A. 不超过 100℃
- B. 不超过 90℃
- C. 不超过 80℃
- D. 不超过 70℃
- E. 不超过 60℃

4.以下属于低共熔混合物的是

- A.薄荷油与淀粉
- B.硫酸阿托品与乳糖
- C.流浸膏与滑石粉
- D.薄荷脑与樟脑
- E.薄荷脑与滑石粉

5.为提取饮片中的芳香挥发性成分，常采用

- A.回流法
- B.浸渍法
- C.渗漉法
- D.水蒸汽蒸馏法
- E.煎煮法

6.不能采用水飞法粉碎的是

- A.滑石粉
- B.珍珠
- C.硼砂
- D.炉甘石
- E.朱砂

7.以木质、牛角、金属或塑料制成的药匙来分剂量的方法是

- A.容量法
- B.分布法
- C.重量法

D.目测法

E.圆锥法

8.喷雾干燥与沸腾干燥的区别在于

A.干燥速度快

B.产品质量好

C.适合于大规模生产

D.物料在一定速度的热气流中进行热交换

E.适用于一定速度的液态物料干燥

9.浸提过程中，作为扩散的推动力的是

A.中药粒度

B.浸提温度

C.浸提时间

D.浓度梯度

E.溶剂用量

10.含毒性药的酏剂每 10ml 相当于原药材的量为

A.1g

B.2g

C.3g

D.4g

E.5g

11.下列表面活性剂哪个有起昙现象

A.司盘 20

B.卵磷脂

C.苯扎氯铵

D.普朗尼克 F-68

E.吐温 80

12.下列不属于分散系统分类的液体药剂的是

A.胶体溶液型

B.外用液体制剂

C.混悬液型

D.乳浊液型

E.溶液型

13.乳剂的制备方法不包括

A.干胶法

B.湿胶法

C.新生皂法

D.分散法

E.机械法

14.增加药物溶解度的方法通常不包括

A.添加增溶剂

B.添加助溶剂

C.降低温度

D.制成盐类

E.应用混合溶剂



15.下列不属于眼用溶剂附加剂的是

- A.增溶剂
- B.抗氧化剂
- C.助溶剂
- D.稀释剂
- E.抑菌剂

16.按给药部位分类，下列不属于注射剂分类的是

- A.皮内注射剂
- B.皮下注射剂
- C.混悬注射剂
- D.肌内注射剂
- E.静脉注射剂

17.用聚乙二醇制备软膏基质时常采用不同分子量的聚乙二醇混合应用，其目的是

- A.增加药物在基质中的溶解度
- B.增加药物的穿透性
- C.调节吸水性
- D.调节稠度
- E.减少吸湿性

18.对硬胶囊论述正确的是

- A.胶囊剂的规格为数字越大，容积越大
- B.囊材中含有明胶、甘油、二氧化钛、食用色素等
- C.充填的药物一定是颗粒

D. 充填好的现胶囊不用除粉或打光

E. 硬胶囊充填时不必考虑药料性质

19. 富含纤维的药粉制备蜜丸时，需选用的赋形剂为

A. 米糊

B. 蜂蜡

C. 嫩蜜

D. 炼蜜

E. 老蜜

20. 入肝经活血散瘀止痛的药物制备水丸时常用的赋形剂是

A. 水

B. 酒

C. 醋

D. 药汁

E. 姜汁

21. 中药压片用干颗粒含水量一般为

A. 5% ~ 8%

B. 3% ~ 5%

C. 3% ~ 7%

D. 2% ~ 5%

E. 4% ~ 5%

22. 下列说法不正确的是

A. 中药药引作用有引药归经和辅助治疗

B.引药归经，即引导其他药物的药力达到病变部位或某一经脉，更好地发挥其治疗作用

C.药物类药引仅为引经报使类药物，如太阳病用防风、羌活、藁本为引

D.食物类药引主要有粳米、蛋黄、蛋清、蜂蜜、西瓜汁等

E.酒、醋、盐、茶叶、灯心草、荷梗、荷叶、西瓜翠衣、童便、金汁等也可为药引

23.医疗用毒性药品、第二类精神药品处方应保留

A.5 年

B.1 年

C.2 年

D.3 年

E.4 年

24.处方用名为熟军，则应付规格是

A.生大黄

B.炙大黄

C.大黄炭

D.酒炙熟大黄

E.酒炙清宁片

25.直接写药物的正名或炒制时，即付砂烫、蛤粉烫的品种不包括

A.狗脊

B.升麻

C.阿胶

D.马钱子

E.鳖甲

26. 普通处方、应急处方、儿科处方应保存的时间为

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 7 年

27. 下列有关妊娠禁忌药的叙述，不正确的是

- A. 大多为峻下逐水药、毒性药、破血逐瘀药
- B. 能影响胎儿生长发育、有致畸作用的药物
- C. 可能造成堕胎的药物
- D. 具有消食导滞功能的药物
- E. 具有芳香走窜功能的药物

28. “一角” 荷叶指荷叶的

- A. 1 张
- B. 1/2 张
- C. 1/4 张
- D. 1/8 张
- E. 1/10 张

29. 下列药物应放在斗架高层的是

- A. 大黄炭
- B. 月季花
- C. 磁石

D.甘草

E.薄荷

30.调配临方配成制剂时，对要特殊处理药物的要求是

A.可以打开包装将鲜药保存在湿沙中

B.最多只能配给 3 天剂量以免腐烂

C.超过 3 天剂量最好放在冰箱保存

D.要单包处理

E.为防止腐烂可放在阴凉处晾干

31.不属于妇科用药的是

A.当归丸

B.加味道遥丸

C.元胡止痛片

D.妇康片

E.木香顺气丸

32.下列药物不含川乌的是

A.小活络丸

B.牛黄解毒丸

C.附子理中丸

D.玉真散

E.祛风舒筋丸

33.汤剂的服用量不正确的是

A.成人服用量一般每次约 150ml，每日 1~2 次

B.儿童服用量一般每次 75ml，每日 2 次

C.婴儿酌减

D.小儿服药，宜浓缩，以少量多次为好，不要急速灌服，以免呛咳

E.对病情危重者，不必遵照医嘱服药

34.服解表、透疹药时，不宜食用五味中的

A.酸味

B.苦味

C.甘味

D.辛味

E.咸味

35.驱虫、攻下药的服用时间为

A.饭后服

B.饭前服

C.空腹服

D.睡前服

E.定时服用

36.极易泛油的中药不包括

A.天冬

B.肉豆蔻

C.狗脊

D.斑蝥虫

E.蜈蚣



37.不能直接与中药材接触的杀虫防霉剂为

- A.甲醛、三氧化二砷
- B.有机氯、有机磷农药、硫黄
- C.氯化苦、磷化铝、对硝基酚
- D.α-萘酚、水杨酸、安息香酸及其钠盐
- E.醋酸苯汞、氯酚、尼泊金

38.含动物组织及动物类原药材的口服给药制剂，每 10g 或 10ml 不得检出

- A.梭菌
- B.铜绿假单胞菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.沙门菌
- E.白色念珠菌

39.穿透力极强，可用于密封和整箱已包装的物品灭菌的是

- A.热压灭菌法
- B.干热空气灭菌法
- C.紫外灭菌法
- D.辐射灭菌法
- E.环氧乙烷灭菌法

40.凡能显著降低两相间界面张力的物质，称为

- A.助悬剂
- B.表面活性剂
- C.增塑剂

D.助溶剂

E.抗氧化剂

41.配制 1000ml 某注射液，为调成等渗（该注射液的冰点下降度为 0.05°C ），需加入的氯化钠是

A.10.0g

B.8.1g

C.9.0g

D.8.2g

E.8.5g

42.聚乙二醇作为水溶性软膏基质的优点不包括

A.容易涂展

B.释药速度快

C.吸湿性强，可吸收分泌液

D.对皮肤无刺激性

E.化学性质稳定

43.常作阴道栓的基质，但不适用于鞣酸等药物的是

A.可可豆脂

B.半合成脂肪酸甘油酯

C.甘油明胶

D.聚乙二醇

E.吐温 61

44.以水溶性基质制成的滴丸，其特点不包括

- A.生物利用度高
- B.药物可发挥缓释作用
- C.生产周期短，自动化程度高
- D.丸重差异小
- E.液体药物可制成固体制剂

45.片剂在包糖衣过程中，粉衣层常用的物料是

- A.淀粉
- B.硫酸钙
- C.滑石粉
- D.虫白蜡
- E.阿拉伯胶浆

46.关于君药说法正确的是

- A.是处方中不可缺少的主要部分，药力居方中之首
- B.是加强对主症治疗作用的药物
- C.是消除其他药物毒性与副作用的药物
- D.起到调和诸药的作用
- E.起到引经报使的作用

47.薄荷后下一般是在其他药煎好前

- A.5~10 分钟
- B.15~20 分钟
- C.10~15 分钟
- D.3~5 分钟

E.20~25 分钟

48.下列药名应付盐炙品的是

A.青皮

B.橘核

C.枳壳

D.柴胡

E.香附

49.关于处方管理制度叙述错误的是

A.处方一般不得超过 7 日用量

B.处方中的药品剂量与和数量一律用阿拉伯数字书写

C.儿科处方的印刷用纸应是淡绿色

D.麻醉药品处方保留 2 年

E.中成药、中药饮片要分别开具处方

50.“焦四仙”不含

A.焦神曲

B.焦槟榔

C.焦山楂

D.焦枳壳

E.焦麦芽

51.临床上不合理用药主要表现不包括

A.用药指征明确

B.违反禁忌证

C.给药剂量过大

D.合并用药过多

E.给药方法不当

52. 药店供应和调配毒性药品，每次处方剂量不得超过的极量是

A.1 日量

B.2 日量

C.3 日量

D.4 日量

E.5 日量

53. 汉代衡量单位一两相当于

A.25 铢

B.24 铢

C.16 铢

D.18 铢

E.3 铢

54. 下列饮片因配伍禁忌而不宜靠近存放的是

A.山药片与天花粉片

B.黑附片与半夏片

C.炙甘草片与炙黄芪片

D.桂枝咀与桑寄生咀

E.天南星片与白附片

55. 关于中药调剂收方要求叙述错误的是

- A.收方人员必须熟悉处方的内容及含义
- B.收方人员必须具有认真负责的工作态度
- C.具备一定的中药调剂工作经验的人员可以从事收方工作
- D.收方工作需要做到迅速，避免拖沓
- E.收方人员要严格进行全面的处方审核，杜绝草率从事

56. “四大怀药” 不包括

- A.牛膝
- B.白术
- C.山药
- D.地黄
- E.菊花

57. 每张处方罂粟壳最大量是

- A.6g
- B.18g
- C.45g
- D.30g
- E.27g

58. 病虫害的生物应用防治不包括

- A.昆虫天敌治害
- B.干扰成虫交配繁殖
- C.生长抑制剂治害
- D.性引诱剂治害



E.天然樟脑驱虫

59.不属于中成药剂型养护过程中容易发生问题的是

A.虫蛀

B.霉变

C.酸败

D.挥发

E.风化

60.关于麝香养护叙述错误的是

A.毛壳麝香容易生虫，苍虫多蛀蚀毛囊

B.麝香仁不易生虫，但受潮后容易发霉

C.麝香仁常因储存环境过于干燥，挥发性物质和水分极易散失，造成失润、干硬

D.储存麝香适宜食用油纸包好，放于铁盒内，再用大木箱封严

E.麝香宜与冰片混存，以防虫蛀

二、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

1.A.95%乙醇

B.90%以上乙醇

C.70%~90%乙醇

D.50%~60%乙醇

E.50%以下的乙醇

(1) 适于浸提挥发油、树脂、叶绿素的乙醇浓度是

(2) 水提醇沉常用的醇沉浓度是

2.A.老蜜

B.蜜水

C.嫩蜜

D.中蜜

E.生蜜

(1) 含糖及脂肪多的药粉制备蜜丸时，选择

(2) 黏性差或富含纤维的药粉制备蜜丸时，选择

3.A.扁豆花、佛手片

B.天冬、郁李仁

C.乳香、没药

D.桔梗、百部

E.芒硝、硼砂

(1) 最易变色的药组是

(2) 极易泛油的药组是

4.A.水飞法

B.加液研磨法

C.低温粉碎

D.超细粉碎法

E.串料粉碎

(1) 樟脑、冰片的粉碎应采用

(2) 朱砂的粉碎多采用

5.A.煎煮法

B.浸渍法

C.回流法

D.水蒸气蒸馏法

E.渗漉法

(1) 既可以得到药材中挥发性成分，又可得到水煎液的提取方法是

(2) 适合贵重、毒性、有效成分含量较低药材的提取，但不适合新鲜、易膨胀、无组织结构药材提取的方法是

6.A.流浸膏剂

B.浸膏剂

C.煎膏剂

D.酒剂

E.合剂

(1) 制备工艺流程是：浸提→精制→浓缩→配液→分装→灭菌的剂型是

(2) 制备工艺流程是：煎煮→浓缩→收膏→分装的剂型是

7.A.亚硫酸钠

B.三氯叔丁醇

C.枸橼酸

D.盐酸普鲁卡因

E.胆汁

(1) 用于调节注射剂 pH 的附加剂是

(2) 既可用于作抑菌剂又可作减轻疼痛的注射剂的附加剂是

8.A.硬胶囊

B.水丸

C.软胶囊

D.滴丸

E.片剂

(1) 内容物可以是液体药物的是

(2) 可以用滴制法、压制法制备的是

9.A.30 分钟

B.1 小时

C.2 小时

D.5 分钟

E.1 分钟

(1) 浓缩丸的溶散时限是

(2) 滴丸的溶散时限是

10.A.隔离层

B.粉衣层

C.糖衣层

D.有色糖衣层

E.打光

(1) 虫蜡在包衣工序中用于

(2) 滑石粉在包衣工序中用于

11.A.赤芍 20g, 白芍 20g

B.白芍 20g

C.赤芍 20g

D.赤芍 10g, 白芍 10g

E.赤芍 15g, 白芍 5g

(1) 处方写“赤白芍 20g”时, 应称量

(2) 处方写“赤白芍各 20g”时, 应称量

12.A.阿胶

B.生石膏

C.煅赭石

D.薄荷

E.车前子

(1) 需要包煎的饮片是

(2) 需要烊化的饮片是

13.A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

E.5 年

(1) 第一类精神药品处方保存期限是

(2) 第二类精神药品处方保存期限是

14.A.方寸匕

B.枚

C.束

D.片

E.桐子大

(1) 古方中药粉的计量单位是

(2) 古方中大枣的计数单位是

15.A.草乌

B.黄芪

C.芫花

D.藜芦

E.天南星

(1) 不宜与人参放在一起的是

(2) 不宜与半夏放在一起的是

16.A.牛黄解毒片

B.辛芩颗粒

C.牛黄降压丸

D.天王补心丸

E.小活络丸

(1) 有清心化痰，平肝安神功能的处方药是

(2) 有祛风散寒，化痰除湿，活血止痛功能的处方药是

17.A.0~10℃

B.20~35℃

C.5~20℃

D.55~60℃

E.10~30℃

(1) 真菌适宜的生长温度是

(2) 药材贮藏冷库的温度是

18.A.片剂

B.散剂

C.膏剂

D.胶囊剂

E.颗粒剂

(1) 容易发生吸潮、松片、裂片的是

(2) 多含有大量蔗糖，极易受潮结块的是

19.A.细辛

B.附子

C.地龙

D.白芍

E.大黄

(1) 属于关药的是

(2) 属于川药的是

20.A.防风通圣丸

B.小柴胡片

C.牛黄解毒片

D.金嗓散结片


E.舟车丸

(1) 具有解表散热，疏肝和胃，治疗外感病，邪犯少阳证的中成药是

(2) 具有解表通里，清热解毒，治疗外寒内热，表里俱实的中成药是

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

扫描二维码去做题



《基础知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1.【正确答案】A

【答案解析】酸：“能收、能涩”，即具有收敛、固涩的作用。酸味药多用治体虚多汗、肺虚久咳、久泻肠滑、遗精滑精、遗尿尿频、崩带不止等证。

2.【正确答案】A

【答案解析】凡味属苦、酸、咸，性属寒、凉的药物，大都是沉降药，如大黄、芒硝、山楂等。其他的选项均是升浮性的药物。

3.【正确答案】A

【答案解析】十九畏歌诀：“硫黄原是火中精，朴硝一见便相争，水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧，巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情，丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱，川乌、草乌不顺犀，人参最怕五灵脂，官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺，大凡修合看顺逆，炮炙灸博莫相依。”即：硫黄畏朴硝。

4.【正确答案】A

【答案解析】冲服：某些药物高温容易破坏药效或有效成分难溶于水，也只能做散剂冲服，如雷丸、鹤草芽等；遇高热易产生或增强毒性的药物，如朱砂。

5.【正确答案】C

【答案解析】防风的应用：①外感表证；②风疹瘙痒；③风湿痹痛；④破伤风证；⑤脾虚湿盛，清阳不升所致的泄泻。

6.【正确答案】B

【答案解析】蝉蜕功效：疏散风热，利咽，透疹，明目退翳，解痉。

7.【正确答案】B

【答案解析】玄参功效：清热凉血，泻火解毒，滋阴。

8.【正确答案】A

【答案解析】黄芩功效：清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。善清泻肺火及上焦湿热。

9.【正确答案】D

【答案解析】天花粉的功效：清热泻火，生津止渴，消肿排脓。

10.【正确答案】A

【答案解析】鱼腥草功效：清热解毒，消痈排脓，利尿通淋，清热止痢。

11.【正确答案】E

【答案解析】牡丹皮应用：

- 1.热入营血，温毒发斑，血热吐衄。善能清营分、血分实热。
- 2.温病伤阴，阴虚发热，夜热早凉、无汗骨蒸。善于清透阴分伏热，为治无汗骨蒸之要药。
- 3.血滞经闭、痛经、跌打伤痛。
- 4.痈肿疮毒。

12.【正确答案】C

【答案解析】本题主要考查的是牵牛子的用法用量。牵牛子：煎服，3~6g；入丸散剂，每次服 1.5~3g，孕妇忌用。不宜与巴豆同用。

13.【正确答案】D

【答案解析】巴豆的功效：峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，外用蚀疮。

14.【正确答案】E

【答案解析】豨薟草功效：祛风湿，利关节，解毒。

应用：1.风湿痹痛，中风半身不遂。本品辛散苦燥，善祛筋骨间风湿之邪，而止痹痛，酒制后可增强通经活络之功。

2.疮疡肿毒，风疹湿疮。本品能清热解毒，祛风湿而止痒，内服或外洗均可。

15.【正确答案】D

【答案解析】桑寄生应用：

1.风湿痹痛，腰膝酸痛。长于补肝肾、强筋骨。

2.胎漏下血，胎动不安。

16.【正确答案】A

【答案解析】佩兰功效：芳香化湿，醒脾开胃，发表解暑。

17.【正确答案】B

【答案解析】苍术、厚朴、藿香、佩兰均可以治疗湿阻中焦证。

18.【正确答案】D

【答案解析】虎杖功效：利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，化痰止咳。

19.【正确答案】D

【答案解析】泽泻功效：利水渗湿，泄热，化浊降脂。

20.【正确答案】D

【答案解析】青皮的功效：疏肝破气，消积化滞。

21.【正确答案】C

【答案解析】木香功效：行气止痛，健脾消食。

22.【正确答案】C

【答案解析】神曲的功效：消食和胃。

23.【正确答案】E

【答案解析】山楂功效：消食化积，行气散瘀。

24.【正确答案】C

【答案解析】使君子的用法用量：煎服，9~12g，使君子仁 6~9g，多入丸散或单用，作 1~2 次分服。。炒香嚼服，小儿每岁每日 1~1.5 粒，1 日总量不超过 20 粒，空腹服用，每日 1 次，连服 3 天。大剂量服用可引起呃逆、眩晕、呕吐、腹泻等不良反应，停药后症状可逐渐缓解。若与热茶同服，亦能引起呃逆、腹泻，故服用时忌饮热茶。

25. 【正确答案】 C

【答案解析】温经止血类药物主要用于脾不统血，冲脉失固之虚寒性出血病证。

26. 【正确答案】 C

【答案解析】三棱与莪术的共同功效：破血行气，消积止痛。

27. 【正确答案】 D

【答案解析】丹参功效：活血调经，凉血消痈，清心除烦。

28. 【正确答案】 B

【答案解析】土鳖虫功效：破血逐瘀，续筋接骨。

29. 【正确答案】 E

【答案解析】贝母应该是反乌头的。

30. 【正确答案】 C

【答案解析】瓜蒌可以用于治疗痰热咳喘。本品甘寒质润，苦寒清热，入肺经，善清肺热，润肺燥。用治痰热内结之咳嗽痰黄、质稠难咯、胸闷不畅，常与黄芩、枳实、胆南星等配伍，如清气化痰丸；若治燥热伤肺之咳痰不爽、咽喉干痛，常配伍川贝母、桔梗、天花粉等，如贝母瓜蒌散。

31. 【正确答案】 D

【答案解析】琥珀须研末冲服，或入丸散。外用适量。不入煎剂。忌火煅。

32. 【正确答案】 B

【答案解析】羚羊角应用：

- 1.肝风内动。善清肝热，息肝风，为治热极生风要药。常配钩藤、白芍、菊花、生地同用。
- 2.肝阳上亢。常与石决明、龟甲、生地、菊花等同用。
- 3.肝火上炎之目赤翳障。善清泻肝火而明目。常与决明子、黄芩、龙胆草等同用。
- 4.温热病壮热神昏，热毒发斑。本品入心肝经，能泻火解毒散血，使气血两清。常与石膏、寒水石、麝香等配伍。

33.【正确答案】A

【答案解析】苏合香功能是开窍醒神、辟秽止痛，因此答案是 A。

34.【正确答案】A

【答案解析】麝香功效：开窍醒神，活血通经，消肿止痛。

35.【正确答案】E

【答案解析】前四项均属于沙苑子的主治病证，E 项属于蛤蚧的主治病证。

36.【正确答案】E

【答案解析】何首乌的功效：制用：补肝肾，益精血，乌须发，强筋骨，化浊降脂。生用：解毒，截疟，清痈，润肠通便。

37.【正确答案】A

【答案解析】当归功效：补血调经，活血止痛，润肠通便。

应用：1.血虚诸证。为补血之圣药。

2.血虚血瘀之月经不调、经闭、痛经。

3.虚寒性腹痛、跌打损伤、痈疽疮疡、风寒痹痛。

4.血虚肠燥便秘。

38.【正确答案】A

【答案解析】浮小麦应用：

- 1.自汗，盗汗。为养心敛液，固表止汗之佳品。
- 2.骨蒸劳热。

39.【正确答案】C

【答案解析】覆盆子功效：益肾，固精，缩尿，明目。

40.【正确答案】E

【答案解析】佐药可分为：①佐助药。即配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物；②佐制药。即用以消除或减弱君、臣药的毒性，或制约其峻烈之性的药物；③反佐药。与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。

41.【正确答案】D

【答案解析】丸剂与汤剂相比，吸收较慢，药效持久，节省药材，体积较小，便于携带与服用。适用于慢性、虚弱性疾病的治疗。

42.【正确答案】A

【答案解析】银翘散与桑菊饮均能辛凉解表，为治疗温病初起的常用方。二方的组成中，都有连翘、桔梗、甘草、薄荷、芦根五药。

43.【正确答案】B

【答案解析】桂枝汤主治外感风寒表虚证。恶风发热，汗出头痛，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓或浮弱。

44.【正确答案】A

【答案解析】大承气汤主治病证包括阳明腑实证、热结旁流证、里热实证之热厥等；黄龙汤主治病证是阳明腑实，气血不足证。

45.【正确答案】B

【答案解析】痛泻药方以治脾为主，兼事柔肝，主治脾虚肝旺之痛泻。

46.【正确答案】E

【答案解析】清营汤【主治】热入营分证。身热夜甚，口渴或不渴，时有谵语，神烦少寐，斑疹隐隐，舌绛而干，脉细数。

47.【正确答案】E

【答案解析】芍药汤的功用是清热燥湿，调和气血。

48.【正确答案】A

【答案解析】清胃散功用：清胃凉血。

49.【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是六一散的加减化裁。六一散主治：暑湿证。临证时若暑热较重，可加西瓜翠衣、淡竹叶等以清暑利湿；伤津较重，可加麦冬、石斛等以生津止渴；用治砂石淋，可酌加海金沙、金钱草以通淋排石。

50.【正确答案】A

【答案解析】六一散的组成：滑石六两、甘草一两。

51.【正确答案】E

【答案解析】小建中汤方中重用饴糖甘温入脾，温中补虚，和里缓急，为君药。

52.【正确答案】D

【答案解析】四逆汤【组成】甘草（炙）二两、干姜一两、附子（生用）一枚。

53.【正确答案】D

【答案解析】生脉散【功用】益气生津，养阴敛汗。

炙甘草汤【功用】滋阴养血，益气温阳，复脉定悸。

54.【正确答案】A

【答案解析】生脉散【功用】益气生津，养阴敛汗。

55.【正确答案】D

【答案解析】参苓白术散【组成】莲子肉、薏苡仁、缩砂仁、桔梗、白扁豆、白茯苓、人参、甘草（炒）、白术、山药。

归脾汤【组成】白术、当归、白茯苓、黄芪、远志、龙眼肉、酸枣仁、人参、木香、甘草（炙）。

56.【正确答案】C

【答案解析】六味地黄丸、大补阴丸、八珍汤用的熟地黄；地黄饮子用的是熟干地黄。

57.【正确答案】C

【答案解析】真人养脏汤的功用：涩肠固脱，温补脾肾。

58.【正确答案】B

【答案解析】天王补心丹组方中：玄参滋阴降火；茯苓、远志养心安神；人参补气生血，安神益智；五味子敛心气，安心神；丹参清心活血，使补而不滞；朱砂镇心安神，共为佐。

59.【正确答案】C

【答案解析】紫雪长于息风止痉，适于热闭神昏而见痉厥抽搐者。

60.【正确答案】B

【答案解析】天台乌药散【功用】行气疏肝，散寒止痛。【主治】寒凝气滞所致小肠疝气。症见少腹引控睾丸而痛，偏坠肿胀，舌淡苔白，脉沉迟或弦。

61.【正确答案】D

【答案解析】桃核承气汤主治下焦蓄血证。少腹急结，小便自利，神志如狂，甚则烦躁谵语。至夜发热；以及血瘀经闭，痛经，脉沉实而涩者。

62.【正确答案】D

【答案解析】生化汤【功用】养血祛瘀，温经止痛。

63. 【正确答案】 C

【答案解析】 羚羊钩藤汤方中白芍、生地黄养阴增液，以柔肝舒筋。

64. 【正确答案】 E

【答案解析】 镇肝熄风汤【组成】怀牛膝 生赭石各一两 生龙骨 生牡蛎 生龟板 生杭
芍 玄参 天冬各五钱 川楝子 生麦芽 茵陈各二钱 甘草钱半

65. 【正确答案】 D

【答案解析】 杏苏散【功用】辛宣温润、止咳化痰。

66. 【正确答案】 C

【答案解析】 八正散主治湿热淋证。尿频尿急，溺时涩痛，淋漓不畅，尿色浑赤，甚则癃闭
不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。

67. 【正确答案】 D

【答案解析】 三仁汤：方中滑石长于清热利湿，为君药。杏仁宣利上焦肺气以通利水道，白
蔻仁畅达中焦气机以助祛湿，薏苡仁渗利下焦湿热以健脾。三仁并用，宣上畅中渗下，同为
臣药。通草、竹叶渗利下焦湿热，半夏、厚朴理气和胃化湿，俱为佐药。原方以甘澜水煎服
药，意在取其益脾胃而不滞邪。

68. 【正确答案】 D

【答案解析】 止嗽散功用：止咳化痰，疏表宣肺。主治：风邪犯肺之咳嗽。

69. 【正确答案】 B

【答案解析】 清气化痰丸【主治】热痰咳嗽。咳嗽痰黄，黏稠难咯，胸膈痞闷，甚则气急呕
恶，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

70. 【正确答案】 C

【答案解析】 保和丸：方中重用山楂，消食化滞，尤擅消肉食油腻之积，为君药。神曲消食

健脾，尤善化酒食陈腐之积；莱菔子下气消食，长于消谷面之积，同为臣药。君臣配伍，可消一切饮食积滞。半夏和胃降逆，陈皮理气和中，茯苓健脾渗湿，连翘清热散结，俱为佐药。

71. 【正确答案】D

【答案解析】方中重用乌梅，酸以安蛔，并以苦酒（醋）渍之，为君药。细辛、蜀椒辛可伏蛔，温脏祛寒；黄连、黄柏苦以下蛔，清泻内热，同为臣药。附子、干姜、桂枝合细辛、蜀椒，温里祛寒之功益增，以利蛔虫安伏肠内；人参、当归补养气血，俱为佐药。以蜜为丸，调和诸药。

二、B 型题

1. (1) 【正确答案】A

【答案解析】牛蒡子功效：疏散风热，利咽透疹，解毒消肿。

应用：1.外感风热，咽喉肿痛。长于解毒利咽，最适宜于风热感冒而见咽喉红肿疼痛者。

2.麻疹不透。

3.痈肿疮毒，疔腮喉痹。

用法用量：煎服，6~12g。本品性寒，滑肠通便，气虚便溏者慎用。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】蝉蜕功效：疏散风热，利咽，透疹，明目退翳，解痉。

2. (1) 【正确答案】B

【答案解析】黄柏功效：清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】苦参功效：清热燥湿，利尿，杀虫。

3. (1) 【正确答案】B

【答案解析】板蓝根的功效：清热解毒，凉血利咽。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 大青叶的功效是清热解毒，凉血消斑。

(3) 【正确答案】 C

【答案解析】 青黛的功效：清热解毒，凉血消斑，泻火定惊。

4. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】 茵陈功效：清热利湿，利胆退黄。

(2) 【正确答案】 A

【答案解析】 泽泻功效：利水渗湿，泄热，化浊降脂。

5. (1) 【正确答案】 D

(2) 【正确答案】 A

【答案解析】 肉桂、附子、干姜三药，共同功效：温中散寒止痛，用治脾胃虚寒之脘腹冷痛、大便溏泄等。不同功效：附子、干姜能回阳救逆，用治亡阳证。此功附子力强，干姜力弱，常相须为用。干姜主入脾胃，长于温中散寒、健运脾阳而止呕；尚能温肺化饮，用治肺寒痰饮咳喘。肉桂、附子味甘而大热，散寒止痛力强，善治脘腹冷痛甚者及寒湿痹痛证，二者又能补火助阳，用治肾阳虚证及脾肾阳虚证。肉桂还能引火归原、温经通脉、用治虚阳上浮及胸痹、阴疽、闭经、痛经等。

6. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 白及功效：收敛止血，消肿生肌。

应用：1.出血证。为收敛止血之要药，尤多用于肺胃出血之证。

2.痈肿疮疡，手足皲裂，水火烫伤。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】 地榆应用：

1.血热出血证。尤宜于下焦之下血。

2.烫伤、湿疹、疮疡痈肿。为治水火烫伤之要药。

7. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】白附子功效：祛风痰，定惊搐，止痛，解毒散结。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】白前功效：降气化痰止咳。

8. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】杜仲功效：补肝肾，强筋骨，安胎。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】续断功效：补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏。

9. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】小青龙汤方中麻黄、桂枝共为君，发汗散寒以解表邪，麻黄又能宣肺而平喘，桂枝温阳以化饮。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】小青龙汤方中干姜、细辛为臣，温肺化饮，兼助麻、桂解表祛邪。

10. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】济川煎【功用】温肾益精，润肠通便。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】温脾汤功用：温补脾阳，攻下冷积。

11. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】肾气丸的组成：干地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、牡丹皮、桂枝、附子。

主治肾阳气不足证。方中干地黄为君，滋补肾阴，益精填髓。因此肾气丸重用的为干地黄。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】当归补血汤的组成：黄芪、当归。方中重用黄芪，为君药。因此重用黄芪的方剂是当归补血汤。

12. (1) 【正确答案】D

【答案解析】天台乌药散【组成】乌药、木香、茴香、青橘皮、高良姜、槟榔、楝实、巴豆。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】天王补心丹【组成】人参、茯苓、玄参、丹参、桔梗、远志、当归、五味子、麦门冬、天门冬、柏子仁、酸枣仁、生地黄。

13. (1) 【正确答案】D

【答案解析】麦门冬汤【主治】1.虚热肺痿。咳嗽气喘，咽喉不利，咳唾涎沫，口干咽燥，舌红少苔，脉虚数。2.胃阴不足证。呕吐，呃逆，舌红少苔，脉虚数。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】炙甘草汤【主治】1.阴血不足，阳气虚弱证。脉结代，心动悸，虚羸少气，舌光少苔，或质干而瘦小。2.虚劳肺痿。干咳无痰，或咳吐涎沫，量少，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗，咽干舌燥，大便干结，脉虚数。

麦门冬汤与炙甘草汤均可治疗肺痿。但炙甘草汤功在滋养阴血，益气温阳，为气血阴阳俱补之剂，用治气血阴阳俱虚之虚劳肺痿。麦门冬汤功在清养肺胃，培土生金，降逆下气，属滋阴润燥之剂，用治肺胃阴虚，气火上逆之虚热肺痿。

14. (1) 【正确答案】B

【答案解析】防己黄芪汤的功用：益气祛风，健脾利水。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】三仁汤的功用是宣畅气机，清利湿热。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



《相关专业知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 C

【答案解析】 同一种病，由于发病的时间、地区、患者的体质或疾病所处的阶段不同，表现出不同的证，针对不同证进行治疗，即所谓同病异治。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】 阳胜，就是属阳的成分多于正常，使阴阳失衡，阳热亢盛，必然消灼阴津，故“阳胜则阴病”。

3. 【正确答案】 C

【答案解析】 阴阳对立制约，是指属性相反的阴阳双方在一个统一体中的相互排斥、相互制约和相互斗争。阴阳的相互对立制约是有限度的，即不能太过，也不能不及。否则就会导致事物之间和事物内部的协调平衡失常。对人来说就发生疾病。阴胜则阳病，阳胜则阴病；阴虚则热，阳虚则寒。

4. 【正确答案】 E

【答案解析】 一般而言，凡运动的、外在的、上升的、温热的、无形的、明亮的、兴奋的，统属于阳的范畴；静止的、内在的、下降的、寒冷的、有形的、晦暗的、抑制的，统属于阴

的范畴。

5.【正确答案】B

【答案解析】怒伤肝，悲胜怒（金克木）喜伤心，恐胜喜（水克火）；思伤脾，怒胜思（木克土）；忧伤肺，喜胜忧（火克金）恐伤肾、思胜恐（土克水）。

简记：相生关系为木火土金水对应五志怒喜思悲恐；

相克关系为：木土水火金对应五志怒思恐喜悲，思克恐，因此思的所胜是恐。

6.【正确答案】A

【答案解析】母病及子：

水生木，水为木母，木为水子，若水之不足无以生木，则木干枯而母子皆衰。

7.【正确答案】A

【答案解析】肾精是人体胚胎发育的基本物质，肾精还能化生“天癸”。

8.【正确答案】E

【答案解析】与神志活动关系最密切的脏是心。

9.【正确答案】B

【答案解析】六腑共同生理特点是：“泻而不藏”、“实而不满”。

10.【正确答案】D

【答案解析】升、降、出、入是气运动的基本形式。

11.【正确答案】A

【答案解析】气的防御功能减弱时，机体抗病能力下降，易染疾病或患病后难以治愈。所以，气的防御作用与疾病的发生、发展和转归都有着密切的关系。

12.【正确答案】D

【答案解析】女子胞的主要功能包括主持月经和孕育胎儿。

13. 【正确答案】 C

【答案解析】任脉：任，有担任、任受之意。任脉循行于腹面正中线，其脉多次与手足三阴经及阴维脉交会，能总任一身之阴经，故称为“阴脉之海”。

14. 【正确答案】 C

【答案解析】湿邪的性质和致病特点：湿为阴邪，易阻滞气机，损伤阳气。

15. 【正确答案】 C

【答案解析】湿邪的性质和致病特点：湿为阴邪，易阻遏气机，损伤阳气。湿邪为有形之邪，侵犯人体后，最易阻遏气机，故致病常见胸闷脘痞、小便短涩、大便不爽等症。

16. 【正确答案】 D

【答案解析】怒伤肝：怒则气上。暴怒或常怒，使肝气上逆，血随气升，并走于上，常见头晕、头痛、面红、目赤，甚至呕血、昏厥。

17. 【正确答案】 A

【答案解析】影响脏腑的气机：①喜、惊伤心：喜则气缓，惊则气乱；②怒伤肝：怒则气上；③思伤脾：思则气结；④悲、忧伤肺：悲则气消，忧则气郁；⑤恐伤肾：恐则气下。

18. 【正确答案】 B

【答案解析】正气充足，卫外固密，病邪难于侵犯人体，疾病无从发生，或虽有邪气侵犯，正气亦能抗邪外出而免于发病。所以说：“正气存内，邪不可干”。

19. 【正确答案】 A

【答案解析】复发，又称“复病”，是指即将痊愈或已经痊愈的疾病再度发作。

20. 【正确答案】 E

【答案解析】气虚是指气不足，导致脏腑功能活动减退，抗病能力下降的病理状态。主要以少气懒言、疲倦乏力、脉虚无力等为特点。

21. 【正确答案】 D

【答案解析】 正气不足是疾病发生的内在根据。

22. 【正确答案】 A

【答案解析】 气虚不足，运血无力，血不足不能充盈脉道，故脉见虚象。

23. 【正确答案】 A

【答案解析】 身灼热而肢厥，为阳热内闭，不得外达，属真热假寒证。

24. 【正确答案】 C

【答案解析】 痰少而黏，难于咯出，甚则无痰者——燥痰。

25. 【正确答案】 B

【答案解析】 虚证的临床表现为精神萎靡，面色无华，身倦乏力，气短自汗，大便滑脱，小便频数，舌淡胖嫩，脉沉迟无力，或五心烦热，潮热盗汗，午后颧红，舌红少苔，脉细而数等。

26. 【正确答案】 A

【答案解析】 恶热喜凉，渴喜冷饮，四肢温热，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉数等均属于热证的临床表现。

27. 【正确答案】 C

【答案解析】 阳证：表证、热证、实证。临床表现：面红目赤，恶寒发热，肌肤灼热，烦躁不安，语声高亢，呼吸气粗，喘促痰鸣，口干渴饮，小便短赤涩痛，大便秘结，舌质红绛，苔黄生芒刺，脉浮数、洪大、滑实等。

28. 【正确答案】 B

【答案解析】 喘：呼吸困难，短促急迫，甚者张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧。

29. 【正确答案】 B

【答案解析】若标病甚急，如不及时解决，会影响本病的治疗，甚至危及生命，则应先治其标，待病情稳定后，再治其本病。如大出血病人，无论属于何种出血，均应采取应急措施，先止血以治其标，待血止后，病情缓和，再治本病。

30. 【正确答案】 E

【答案解析】药品质量管理包括制定药品质量标准、执行药品质量标准、制定影响药品质量工作的标准规范(如 GLP、GCP、GMP、GSP)等；国家药品监督管理部门对药品质量监督管理的体制、职能、制度及立法的建立和制定，人员的配备和培训；药品使用中影响使用质量的因素；合理用药以及新技术在药品质量管理与监督控制中的应用等，涉及药学、统计学、管理学、法学、行为科学等诸多方面。

31. 【正确答案】 D

【答案解析】世界各国通常将药房分为社会药房和医院药房。社会药房又称作药店。

32. 【正确答案】 A

【答案解析】中药饮片应当按照国家药品标准炮制；国家药品标准没有规定的，应当按照省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范炮制。

33. 【正确答案】 A

【答案解析】药事管理的核心：对药事活动的依法管理。

34. 【正确答案】 B

【答案解析】药品标准是药品生产、经营、使用、监督管理、监督检验等单位共同遵守的法定依据。故 E 项描述正确。

药品标准的内容包括质量指标、检验方法以及生产工艺等技术要求。故 C 项描述正确。

药品标准属于国家强制性标准。属于法定标准，故 A 项描述正确。

药品必须按照国家药品标准和批准的生产工艺进行生产。故 D 项描述正确。

国家药品标准制定的法定机构是国家药典委员会。故 B 项描述错误。

35.【正确答案】A

【答案解析】有效性：有效性是指在规定的适应证、用法和用量的条件下，能满足预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能的性能。有效性是药品的基本特征，若对防治疾病无效，则不能成为药品。

36.【正确答案】D

【答案解析】商务部：药品流通行业的管理部门，负责研究制定药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。

37.【正确答案】C

【答案解析】根据《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改革方案的决定》(2018 年)，国务院设立国家发展和改革委员会，为国务院组成部门。其与医药行业管理相关的主要职责是负责监测和管理药品宏观经济。其价格监督检查与反垄断执法职责划入国家市场监督管理总局，其药品和医疗服务价格管理职责划入国家医疗保障局。

38.【正确答案】B

【答案解析】中药材生产质量管理规范 (GAP)。

39.【正确答案】C

【答案解析】中药品种保护的目的是提高中药品种质量、保护中药生产企业合法权益，促进中药事业的发展。

40.【正确答案】D

【答案解析】《中医药法》第 3 条规定，中医药事业是我国医药卫生事业的重要组成部分。国家大力发展中医药事业，实行中西医并重的方针，建立符合中医药特点的管理制度，充分发挥中医药在我国医药卫生事业中的作用。

41. 【正确答案】 C

【答案解析】各地区设立中药材专业市场，必须依据国务院药品生产经营行业主管部门的总体规划，由国务院有关主管部门审批，建在中药材主要品种的集中产地或者传统的中药材集散地，交通便利，布局合理。

地方各级人民政府及其他部门均无权审批开办中药材专业市场。

42. 【正确答案】 C

【答案解析】国务院公安部门负责对造成麻醉药品药用原植物、麻醉药品和精神药品流入非法渠道的行为进行查处。

43. 【正确答案】 B

【答案解析】开展麻醉药品和精神药品实验研究应当经国务院药品监督管理部门审批。科学研究、教学单位需要使用麻醉药品和精神药品开展实验、教学活动的，应当经所在省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准，向定点批发企业或者定点生产企业购买。

44. 【正确答案】 B

【答案解析】麻醉药品和第一类精神药品的临床试验，不得以健康人为受试对象。

45. 【正确答案】 B

【答案解析】麻醉药品储存单位以及麻醉药品和第一类精神药品的使用单位，应当配备专人负责管理工作，并建立储存麻醉药品和第一类精神药品的专用账册。药品入库双人验收，出库双人复核，做到账物相符。专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于 5 年。

46. 【正确答案】 A

【答案解析】药品零售企业供应毒性药品，须凭盖有医生所在医疗机构公章的处方。医疗机构供应和调配毒性药品，须凭医生签名的处方。每次处方剂量不得超过 2 日极量。

47. 【正确答案】 D

【答案解析】 遴选范围：下列药品不纳入国家基本药物目录遴选范围：（非必须、不安全、难配备）

- ①含有国家濒危野生动植物药材的；
- ②主要用于滋补保健作用，易滥用的；
- ③非临床治疗首选的；
- ④因严重不良反应，国家食品药品监督管理局明确规定暂停生产、销售或使用的；
- ⑤违背国家法律、法规，或不符合伦理要求的。

48. 【正确答案】 B

【答案解析】 国家基本药物的遴选原则：国家基本药物遴选应当按照防治必需、安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重、基本保障、临床首选和基层能够配备的原则，结合我国用药特点，参照国际经验，合理确定品种(剂型)和数量。

49. 【正确答案】 A

【答案解析】 托运或者自行运输麻醉药品和第一类精神药品的单位，应当向所在设区的市级药品监督管理部门申请领取运输证明。运输证明有效期为 1 年。

50. 【正确答案】 C

【答案解析】 处方开具当日有效。特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期最长不得超过 3 天。

51. 【正确答案】 B

【答案解析】 药师调剂处方时必须做到“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。

52. 【正确答案】 B

【答案解析】获知药品群体不良事件后药品生产企业应当立即开展调查，详细了解药品群体不良事件的发生、药品使用、患者诊治以及药品生产、储存、流通、既往类似不良事件等情况，在 7 日内完成调查报告，报所在地省级药品监督管理部门和药品不良反应监测机构；同时迅速开展自查，分析事件发生的原因，必要时应当暂停生产、销售、使用和召回相关药品，并报所在地省级药品监督管理部门。

53. 【正确答案】 B

【答案解析】药品与非药品、外用药与其他药品分开存放，中药材和中药饮片分库存放；特殊管理的药品应当按照国家有关规定储存；拆除外包装的零货药品应当集中存放。

54. 【正确答案】 B

【答案解析】中药方法发明：包括生产方法发明和用途发明。

①生产方法发明：中药饮片的制备方法(指中药材的加工和炮制工艺以及相关产品的生产方法，如果其方法和步骤与现有的技术相比具有《专利法》上所规定的新颖性、创造性和实用性，均可以申请方法专利)、中药提取物的制备方法(指从单味中药材或复方制剂中将某种有效部分提取分离的方法)和新的制剂工艺。

②用途发明：包括新发现的中药材在制备药品中的新用途、已有中药材或者其提取物的第二医疗用途、已知中药提取物在制备药品中的新用途等。

55. 【正确答案】 B

【答案解析】药品的内标签应当包含药品通用名称、适应证或者功能主治、规格、用法用量、生产日期、产品批号、有效期、生产企业等内容。包装尺寸过小无法全部标明上述内容的，至少应当标注药品通用名称、规格、产品批号、有效期等内容。

56. 【正确答案】 D

【答案解析】发运中药材必须有包装。在每件包装上，必须注明品名、产地、日期、调出单位，并附有质量合格的标志。

57. 【正确答案】 C

【答案解析】廉洁自律，恪守医德。弘扬高尚医德，严格自律，不索取和非法收受患者财物，不利用执业之便谋取不正当利益；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、销售企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成，不参与其提供的各类娱乐活动；不违规参与医疗广告宣传 and 药品医疗器械促销，不倒卖货源。

58. 【正确答案】 B

【答案解析】表证

[临床表现]恶寒（或恶风），发热，苔薄，脉浮；或见鼻塞，流涕，打喷嚏，咽喉痒痛，头身疼痛，微有咳嗽、气喘等。表证见于外感病初期，具有起病急、病位浅、病程短的特点。以恶寒发热、苔薄、脉浮为辨证要点。

59. 【正确答案】 A

【答案解析】喜则气缓，惊则气乱。喜乐过度，能使心气涣散，神不守舍，重则导致心神不宁，或失神狂乱；

注意区分惊则气乱：突然受惊，心气紊乱，而致心神不宁，惊慌失措，乃至神志错乱。

60. 【正确答案】 D

【答案解析】疫气，是一类具有强烈传染性的外感病邪。又称为“戾气”、“疫毒”、“时行疫气”、“乖戾之气”、“毒气”等。

61. 【正确答案】 A

【答案解析】凶门突起：又称凶填—多属实证，多因温病火邪上攻，或脑髓有病，或颅内水液停聚所致。

62. 【正确答案】 C

【答案解析】 鼻流浊涕腥秽如鱼脑者，为鼻渊。

63. 【正确答案】 E

【答案解析】 心阳暴脱证：在心阳虚证的基础上突然冷汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，呼吸微弱，或心悸，心胸剧痛，神志模糊或昏迷，唇舌青紫，脉微欲绝。

64. 【正确答案】 D

【答案解析】 药品评价中心是国务院药品监督管理部门对已批准生产上市的药品进行再评价的技术职能部门，是国家药品监督管理局直属事业单位。

65. 【正确答案】 E

【答案解析】 在中医辨证理论指导下应用，是中药最本质的特点。

二、B 型题

1. (1) 【正确答案】 E

(2) 【正确答案】 B

(3) 【正确答案】 D

【答案解析】 五行为：木火土金水。对应的五志是：怒喜思悲恐。

2. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 上焦如雾。一般将膈以上的胸部，包括心、肺两脏和头面部，称作上焦；也有人将上肢归属于上焦。上焦的生理功能特点，是主气的升发和宣散，但它不是有升无降，而是“升已而降”，故说“若雾露之溉”，《灵枢》也因此而概括为“上焦如雾”，即指上焦宣发卫气、布散精微的作用。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 中焦如沤。中焦是指膈以下，脐以上的上腹部。对于中焦的生理功能特点，《灵

枢》概括为“中焦如沅”，即指脾胃运化水谷、化生气血的作用。

(3) 【正确答案】E

【答案解析】下焦如渎。下焦的部位，一般是将脐以下的部位和脏器归属于下焦。下焦的生理功能特点，在《黄帝内经》中指出是排泄糟粕和尿液，如《灵枢》概括为“下焦如渎”，即指肾、膀胱和大小肠等主分别清浊、排泄废物的作用。

3. (1) 【正确答案】A

【答案解析】风为阳邪，轻扬开泄，善行数变，动摇不定，多兼他邪为基本特性。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】寒为阴邪，具有寒凉、凝滞、收引的基本特性。

(3) 【正确答案】C

【答案解析】暑为阳邪，具有炎热、升散、挟湿的基本特性；具有明显的季节性，纯属外邪。

(4) 【正确答案】E

【答案解析】湿邪以重浊、黏滞、阻滞气机为基本特性。

(5) 【正确答案】D

【答案解析】燥邪具有干燥、涩滞的基本特性。

4. (1) 【正确答案】E

【答案解析】气逆是指气上升太过，或下降不及，以致气逆于上的一种病理变化。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】气陷是指气虚无力升举为主要特征的一种病理变化。

5. (1) 【正确答案】B

(2) 【正确答案】D

【答案解析】虚脉的脉象为三部举寻按皆无力；

紧脉的脉象为脉来绷紧，往来有力，如牵绳转索；

实脉的脉象为三部举寻按皆有力；

濡脉的脉象为脉浮而细软，轻手即得，重按不显，又称软脉；

涩脉的脉象为脉往来艰涩不畅，如轻刀刮竹。

6. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 肝阳化风证

[临床表现] 眩晕欲仆，头摇，头痛，肢体震颤，项强，步履不正，手足麻木，语言謇涩或突然昏倒，不省人事，口眼歪斜，半身不遂，喉中痰鸣，舌红苔白腻，脉弦细有力或弦滑。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】 阴虚动风证

[临床表现] 手足蠕动，眩晕耳鸣，潮热颧红，口燥咽干，形体消瘦，舌红无苔，脉细。

7. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 因人制宜，是根据患者的年龄、性别、体质等不同特点，来制订适宜的治法、选用适宜的方药。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 因时制宜，是根据不同季节的气候特点，来制订适宜的治法、选用适宜的方药。

8. (1) 【正确答案】 A

(2) 【正确答案】 A

(3) 【正确答案】 B

【答案解析】 中药保护品种的保护期限：中药一级保护品种保护期限分别为 30 年、20 年和 10 年。中药二级保护品种的保护期限为 7 年。

9. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】医疗机构供应和调配毒性药品，须凭医生签名的处方。每次处方剂量不得超过 2 日极量。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】第一类精神药品普通剂型的每张处方不得超过 3 日常用量，第二类精神药品的每张处方不得超过 7 日常用量。

10. (1) 【正确答案】 E

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】药品剂量与数量用阿拉伯数字书写。剂量应当使用法定剂量单位：重量以克(g)、毫克(mg)、微克(μg)、纳克(ng)为单位；容量以升(L)、毫升(ml)为单位；国际单位(IU)、单位(U)；中药饮片以克(g)为单位；片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂分别以片、丸、粒、袋为单位；溶液剂以支、瓶为单位；软膏及乳膏剂以支、盒为单位；注射剂以支、瓶为单位，应当注明含量；中药饮片以剂为单位。

11. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】药师经处方审核后，认为存在用药不适宜时，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】药师发现严重不合理用药或者用药错误，应当拒绝调剂，及时告知处方医师，并应当记录，按照有关规定报告。

12. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】进口药品自首次获准进口之日起 5 年内，报告该进口药品的所有不良反应。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】进口药品自首次获准进口之日起满 5 年的，报告新的和严重的不良反应。

13. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 火邪的性质和致病特点：

火为阳邪，其性炎上

如：心火上扰则口舌生疮；胃火上扰则牙龈肿痛、口臭；肝火上炎则目赤肿痛、头晕头痛等。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 火易伤津耗气

由于阳热过盛，机体阳气代谢增强，而消耗大量阳气，即“壮火食气”、“壮火散气”。

14. (1) 【正确答案】 B

(2) 【正确答案】 C

(3) 【正确答案】 C

【答案解析】 非处方药专有标识图案分为红色和绿色，红色专有标识用于甲类非处方药品，绿色专有标识用于乙类非处方药品和用作指南性标志。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

扫描二维码去做题



《专业知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 B

【答案解析】 柏子仁去油制霜，消除柏子仁油滑肠通便的副作用。

2. 【正确答案】 C

【答案解析】全草类和形态细长，内含成分易于煎出的药材适宜切成段，如薄荷、瞿麦、怀牛膝、沙参、藿香、斛、芦根、麻黄、忍冬藤、大蓟、小蓟等。

3. 【正确答案】 C

【答案解析】净制去核的药物如乌梅、北山楂、山茱萸、诃子等。

4. 【正确答案】 E

【答案解析】去毛

(1)刷去毛：枇杷叶、石韦等。

(2)烫去毛：骨碎补、狗脊、马钱子等。

(3)燎去毛(刮去毛)：如鹿茸。

(4)挖去毛：金樱子。

(5)撞去毛：如香附

5. 【正确答案】 A

【答案解析】姜炙时，每 100kg 药物用 10kg 生姜。若无生姜，可用干姜代替，用量为生姜的 1/3。

6. 【正确答案】 B

【答案解析】盐炙黄柏长于滋阴降火退虚热。

7. 【正确答案】 C

【答案解析】1.麸炒时，每 100kg 药物，用麦麸 10~15kg。

2.米炒时，每 100kg 药物，用米 20kg。

3.土炒时，每 100kg 药物，用灶心土 25~30kg。

4.砂炒时，砂的用量以能掩盖所加药物为度。

5. 蛤粉炒时，每 100kg 药物，用蛤粉 30 ~ 50kg。

6. 滑石粉炒时，每 100kg 药物，用滑石粉 40 ~ 50kg。

8. 【正确答案】 E

【答案解析】 鲜地黄味甘、苦、性寒。归心、肝、肾经。具有清热、生津、凉血、止血的功能。生地黄味甘，性寒，归心、肝、肾经。为清热凉血之品，具有清热凉血、养阴生津的功能。熟地黄性味甘、微温，归肝、肾经，具有滋阴补血、益精填髓的功能。生地黄入血分凉血止血。熟地黄以补血止血为主。

9. 【正确答案】 B

【答案解析】 苍术、僵蚕、枳实常用的炮制方法是麸炒。斑蝥米炒。白术既可以麸炒又可以土炒。

10. 【正确答案】 E

【答案解析】 油炙法多用于淫羊藿、蛤蚧、三七等。

11. 【正确答案】 C

【答案解析】 土炒白术：先将土置锅内，中火炒至土呈灵活状态时，投入白术片，翻埋至白术表面均匀挂上土粉时，取出，筛去土粉，放凉。

每 100kg 白术片，用灶心土 25kg。

12. 【正确答案】 D

【答案解析】 蛤粉炒的注意事项

1. 胶块切成立方丁，大小分档，分别炒制。

2. 炒制时火力不宜过大，以防药物黏结、焦糊或“烫僵”。如温度过高可酌加冷蛤粉。

3. 胶丁下锅翻炒要速度快而均匀，避免互相粘连，造成不圆整而影响外观。

4. 蛤粉烫炒同种药物可连续使用，但颜色加深后需及时更换。

5. 贵重、细料药物如阿胶之类，在大批炒制前最好先采取试投的方法，以便掌握火力，保证炒制质量。

13. 【正确答案】 D

【答案解析】紫菀常见的炮制品是蜜紫菀，其炮制方法如下：取炼蜜，加适量开水稀释，淋入紫菀片中拌匀，闷润，置锅内，用文火炒至棕褐色，符合“手握法”检视质量标准时，再出锅，放凉，干燥后，及时收藏。每 100kg 紫菀片，用炼蜜 25kg。

14. 【正确答案】 A

【答案解析】白果一般是炒黄。

适用于炒炭的药物有大蓟、小蓟、侧柏叶、乌梅、白茅根、牡丹皮、干姜、荆芥、地榆等。

15. 【正确答案】 D

【答案解析】传统习惯止血用当归头，补血用当归身，破血用当归尾，补血活血用全当归。

16. 【正确答案】 E

【答案解析】荆芥炮制方法是炒炭法。

17. 【正确答案】 A

【答案解析】食盐味咸，性寒。能强筋骨，软坚散结，清热，凉血，解毒，防腐，并能矫味。

药物经食盐水制后，能引药下行，缓和药物的性能，增强药物的疗效，并能矫味、防腐等。

18. 【正确答案】 C

【答案解析】酒性大热，能活血通络，祛风散寒，行药势，矫臭矫味。

19. 【正确答案】 E

【答案解析】酒能升能散，宜行药势，如大黄苦寒，性沉而不浮，经酒制后能引药上行。

20. 【正确答案】 A

【答案解析】从同批药材包件中抽取供检验用样品的原则：①药材总包件数不足 5 件的，

逐件取样；②5~99 件，随机抽 5 件取样；③100~1000 件，按 5%比例取样；④超过 1000 件的，超过部分按 1%比例取样；⑤贵重药材，不论包件多少均逐件取样。

100~1000 件，按 5%比例取样既 $1000 \times 5\% = 50$ ，

超过 1000 件的，超过部分按 1%比例取样； $100 \times 1\% = 1$

所以共取 $50 + 1 = 51$ 件。

21. 【正确答案】 D

【答案解析】中药鉴定的依据是国家药品标准和地方药品标准。其中，国务院药品监督管理部门颁布的《中华人民共和国药典》和药品标准为国家药品标准，包括局颁和部颁标准。

22. 【正确答案】 D

【答案解析】川贝母为百合科植物川贝母、暗紫贝母、甘肃贝母、梭砂贝母或太白贝母或瓦布贝母的干燥鳞茎。按药材性状的不同分别称“松贝”、“青贝”、“炉贝”和栽培品。

23. 【正确答案】 B

【答案解析】天麻呈椭圆形或长条形，略扁，皱缩而稍弯曲，长 3~15cm，宽 1.5~6cm，厚 0.5~2cm。表面黄白色至淡黄棕色，有纵皱纹及由潜伏芽排列而成的横环纹多轮，有时可见棕褐色菌索。顶端有红棕色至深棕色鹦嘴状的芽，习称“鹦哥嘴”或“红小辫”；或为残留茎基。另端有圆脐形疤痕，习称“肚脐痕”。质坚硬，不易折断。断面较平坦，黄白色至淡棕色，角质样。气微，味甘。

24. 【正确答案】 E

【答案解析】川贝中松贝外层鳞叶 2 瓣，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称“怀中抱月”。

25. 【正确答案】 E

【答案解析】浙贝母：

大贝：为鳞茎外层单瓣鳞叶，略呈新月形，高 1~2cm，直径 2~3.5cm。外表面类白色至淡黄色，内表面白色或淡棕色，被白色粉末。质硬而脆，易折断，断面白色至黄白色，富粉性。气微，味微苦。

珠贝：为完整的鳞茎，呈扁圆形，高 1~1.5cm，直径 1~2.5cm。表面类白色，外层鳞叶 2 瓣，肥厚，略似肾形，互相抱合，内有小鳞叶 2~3 枚及干缩的残茎。

26. 【正确答案】 C

【答案解析】天冬气微，味甜、微苦；麦冬气微香，味甘、微苦；知母气微，味微甘甜、略苦，嚼之带黏性；射干气微，味苦、微辛；莪术气香或微香。

27. 【正确答案】 B

【答案解析】三七主产于广西田阳、靖西、百色及云南文山等地。多系栽培。

28. 【正确答案】 B

【答案解析】延胡索主产于浙江东阳、磐安。湖北、湖南、江苏等省亦产，多为栽培。

29. 【正确答案】 D

【答案解析】D 项属于单子叶植物根的特征。其余均为双子叶植物根的特征。

30. 【正确答案】 A

【答案解析】双子叶植物根：一般均具次生构造。最外层大多为周皮，由木栓层、木栓形成层及栓内层组成。少数根类中药的次生构造不发达，无周皮而有表皮，如龙胆、威灵仙等；或为“后生表皮”，如细辛；或为“后生皮层”，如川乌。

31. 【正确答案】 C

【答案解析】知母呈长条状，微弯曲，略扁，偶有分枝，长 3~15cm，直径 0.8~1.5cm。一端有浅黄色的茎叶残痕。表面黄棕色至棕色，上面有一凹沟，具紧密排列的环状节，节上密生黄棕色的残存叶基，由两侧向根茎上方生长；下面隆起而略皱缩，有凹陷或突起的点状

根痕。质硬，易折断，断面黄白色。气微，味微甜、略苦，嚼之带黏性。

32.【正确答案】C

【答案解析】川党参：长 10~45cm，直径 0.5~2cm。表面灰黄色至黄棕色，有明显不规则的纵沟，质较软而结实，断面裂隙较少，皮部黄白色。

33.【正确答案】D

【答案解析】防风呈长圆锥形或长圆柱形，下部渐细，有的略弯曲，长 15~30cm，直径 0.5~2cm。表面灰棕色或棕褐色，粗糙，有纵皱纹、多数横长皮孔样突起及点状的细根痕。根头部有明显密集的环境，习称“蚯蚓头”，有的环纹上残存棕褐色毛状叶基。

34.【正确答案】B

【答案解析】防风根呈长圆柱形，下部渐细长 15~30cm，直径 0.5~2cm，根头部有明显密集的环境，习称“蚯蚓头”，环纹上有的有棕褐色毛状残存叶基。

35.【正确答案】D

【答案解析】有的内皮层细胞壁全部增厚木化，少数不增厚的内皮层细胞称“通道细胞”，如麦冬。

36.【正确答案】D

【答案解析】赤芍呈圆柱形，稍弯曲，长 5~40cm，直径 0.5~3cm。表面棕褐色，粗糙，有纵沟和皱纹，并有须根痕和横长的皮孔样突起，有的外皮易脱落。质硬而脆，易折断，断面粉白色或粉红色，皮部窄，木部放射状纹理明显，有的有裂隙。气微香，味微苦、酸涩。

37.【正确答案】C

【答案解析】东北铁线莲：根茎呈柱状，根较密集，表面棕黑色，断面木部近圆形。味辛辣。

38.【正确答案】B

【答案解析】附子①盐附子：呈圆锥形，表面灰黑色，有盐霜。②黑顺片：为不规则的纵切

片，上宽下窄，外皮黑褐色，切面暗黄色，油润具光泽，半透明，并有纵向脉纹(导管束)。

③白附片：无外皮，黄白色，半透明。所以本题目选择 B。

39.【正确答案】 C

【答案解析】防己断面平坦，灰白色，富粉性，有稀疏的放射状纹理，这一稀疏的放射状纹理习称“车轮纹”。

40.【正确答案】 B

【答案解析】钩藤为茜草科植物钩藤、大叶钩藤、毛钩藤、华钩藤或无柄果钩藤的干燥带钩茎枝。

41.【正确答案】 A

【答案解析】大血藤为木通科植物大血藤干燥藤茎。苏木、鸡血藤来源于豆科植物，钩藤来源于茜草科植物，川木通来源于毛茛科植物。

42.【正确答案】 E

【答案解析】沉香为瑞香科植物白木香含有树脂的木材。

43.【正确答案】 C

【答案解析】厚朴主产于四川、湖北、浙江、江西等省，陕西、甘肃、贵州、云南等省亦产，多为栽培。

44.【正确答案】 B

【答案解析】厚朴以皮厚、肉细、油性足、内表面紫棕色具有发亮结晶物、香气浓者为佳。

45.【正确答案】 D

【答案解析】丁香略呈研棒状，长 1~2cm。

46.【正确答案】 B

【答案解析】洋金花多皱缩成条状，完整者长 9~15cm。花萼呈筒状，长为花冠的 2/5，

灰绿色或灰黄色，先端 5 裂，基部具纵脉纹 5 条，表面微有茸毛；花冠呈喇叭状，淡黄色或黄棕色，先端 5 浅裂，裂片有短尖，短尖下有明显的纵脉纹 3 条，两裂片之间微凹；雄蕊 5，花丝贴生于花冠筒内，长为花冠的 3/4；雌蕊 1，柱头棒状。烘干品质柔韧，气特异；晒干品质脆，气微，味微苦。

47. 【正确答案】 B

【答案解析】金银花：呈棒状，上粗下细，略弯曲，表面黄白色或绿白色(贮久色渐深)，密被短柔毛。偶见叶状苞片。花萼绿色，先端 5 裂，裂片有毛，长约 2mm。开放者花冠筒状，先端二唇形；雄蕊 5，附于筒壁，黄色；雌蕊 1 个，子房无毛。气清香，味淡、微苦。

48. 【正确答案】 D

【答案解析】荆芥以色淡黄绿、穗长而密、香气浓者为佳。

49. 【正确答案】 E

【答案解析】金钱草：常缠结成团，无毛或被疏柔毛。茎扭曲，表面棕色或暗棕红色，有纵纹，下部茎节上有时具须根，断面实心。叶对生，多皱缩，展平后呈宽卵形或心形。

50. 【正确答案】 B

【答案解析】金樱子来源于蔷薇科植物金樱子的干燥成熟果实。

51. 【正确答案】 B

【答案解析】马钱子呈纽扣状圆板形，常一面隆起，一面稍凹下，表面密被灰棕或灰绿色绢状茸毛。自中间向四周呈辐射状排列，有丝样光泽。边缘稍隆起，较厚，有突起的珠孔，底面中心有突起的圆点状种脐。质坚硬，平行剖面可见淡黄白色胚乳，角质状，子叶心形，叶脉 5~7 条。无臭，味极苦。

52. 【正确答案】 C

【答案解析】褐藻是藻类中比较高级的一大类群，绝大多数生活在海水中。植物体常呈褐色，

贮存的养分主要是可溶性的褐藻淀粉和甘露醇，还有油类和还原糖，细胞中常含碘。如海藻、昆布等。

53. 【正确答案】 E

【答案解析】栽培灵芝：子实体较粗壮、肥厚，直径 12~22cm，厚 1.5~4cm。皮壳外常被有大量粉尘样的黄褐色孢子。

54. 【正确答案】 E

【答案解析】子实体：真菌(多为高等真菌)在生殖时期，形成一定形状和结构，能产生孢子的菌丝体结构，如灵芝。

55. 【正确答案】 B

【答案解析】药用树脂的分类通常根据其中所含的主要化学成分而分成以下几类。

1.单树脂类：树脂中一般不含或很少含挥发油、树胶及游离芳香酸。又可以分①酸树脂，主成分为树脂酸，如松香。②酯树脂，主成分为树脂酯，如枫香脂、血竭。③混合树脂无明显的主成分，如洋乳香等。

2.胶树脂类：主成分为树脂和树胶，如藤黄。

3.油胶树脂类：主成分为树脂、挥发油和树胶，如乳香、没药、阿魏等。

4.油树脂类：主成分为树脂与挥发油，如松油脂、加拿大油树脂等。

5.香树脂类：主成分为树脂、游离芳香酸（香脂酸）、挥发油，如苏合香、安息香。

56. 【正确答案】 B

【答案解析】树脂是一类化学组成比较复杂的物质，一般认为是植物体内的挥发油成分如萜类，经过复杂的化学变化，如氧化、聚合、缩合等作用形成的。

57. 【正确答案】 D

【答案解析】肚倍：呈长圆形或纺锤形囊状，长 2.5~9cm，直径 1.5~4cm。表面灰褐色

或灰棕色，微有柔毛。质硬脆，易破碎，断面角质状，有光泽，内壁平滑，有黑褐色死蚜虫及灰色粉末状排泄物。气特异，味涩。

角倍：呈菱形，具不规则的角状分枝。柔毛较明显，壁较薄。

58.【正确答案】B

【答案解析】儿茶呈方形或不规则块状，大小不一。表面棕褐色或黑褐色，光滑而稍有光泽。

质硬，易碎，断面不整齐，具光泽，有细孔，遇潮有黏性。无臭，味涩、苦，略回甜。

59.【正确答案】A

【答案解析】蕲蛇为蝮科动物五步蛇的干燥体。

60.【正确答案】D

【答案解析】羚羊角为牛科动物赛加羚羊雄兽的角。

61.【正确答案】B

【答案解析】金钱白花蛇呈圆盘状，头盘在中间，尾细，常纳于口内，口腔内上颌骨前端有毒沟牙 1 对，鼻间鳞 2 片，无颊鳞，上、下唇鳞通常各 7 片。背部黑色或灰黑色，有黑白相间的环纹，白环纹在背部宽 1~2 枚鳞片，向腹面渐增宽，黑环纹宽 3~5 枚鳞片。背正中有 1 条显著突起的脊棱。背鳞通身 15 行，光滑细密略呈菱形。脊鳞较大，呈六角形。腹部黄白色，鳞片稍大。尾部鳞片单行。气微腥，味微咸。

62.【正确答案】B

【答案解析】动物的病理产物：珍珠、僵蚕、牛黄、马宝、猴枣、狗宝等。麝香属于生理产物。

63.【正确答案】C

【答案解析】动物的干燥全体：如水蛭、全蝎、蜈蚣、斑蝥等。

除去内脏的动物体：如蚯蚓、蛤蚧、乌梢蛇、蕲蛇、金钱白花蛇等。

64. 【正确答案】 A

【答案解析】石膏为纤维状的集合体。呈长块状、板块状或不规则块状。全体白色、灰白色或浅黄色，有的半透明，条痕白色。体重，质软，指甲可刻划成痕。易纵向断裂，纵断面具纤维状纹理，显绢丝光泽。气微，味淡。

65. 【正确答案】 B

【答案解析】矿物类药物按阳离子分类，则朱砂、轻粉、红粉等为汞化合物类；磁石、自然铜、赭石等为铁化合物类；石膏、钟乳石、寒水石等为钙化合物类；雄黄、雌黄、信石等为砷化合物类；白矾、赤石脂等为铝化合物类；胆矾、铜绿等为铜化合物类；密陀僧、铅丹等为铅化合物类；芒硝、硼砂、大青盐等为钠化合物类；滑石为镁化合物类等。

66. 【正确答案】 C

【答案解析】水以 H^+ 或 OH^- 等离子形式参加矿物的晶格构造，如滑石 $Mg(Si_4O_{10})(OH)_2$ 。

2。

二、B 型题

1. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】自然铜条痕棕黑色或棕红色。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】赭石条痕樱红色或红棕色。

2. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】动物的生理产物

分泌物：如麝香、蟾酥、熊胆粉、虫白蜡、蜂蜡等。

排泄物：如五灵脂、蚕砂、夜明砂等。

其他生理产物：如蝉蜕、蛇蜕、蜂蜜、蜂房等。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】除去内脏的动物体如地龙、蛤蚧、乌梢蛇、蕲蛇、金钱白花蛇等。

(3) 【正确答案】A

【答案解析】动物的病理产物如珍珠、僵蚕、牛黄、马宝、猴枣、狗宝等。

3. (1) 【正确答案】B

【答案解析】血竭略呈四方形或不定形块状，大小不等。表面暗红色，有光泽，附有因摩擦而产生的红粉。质硬而脆，破碎面红色，粉末砖红色，气微、味淡。在水中不溶，在热水中软化。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】乳香燃烧时显油性，冒黑烟，有香气；加水研磨成白色或黄白色乳状液。

4. (1) 【正确答案】A

【答案解析】麻黄为麻黄科植物草麻黄、中麻黄或木贼麻黄的干燥草质茎，即其药用部位是草质茎。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】淫羊藿为小檗科植物淫羊藿、箭叶淫羊藿、柔毛淫羊藿或朝鲜淫羊藿的干燥叶。

(3) 【正确答案】D

【答案解析】肉苁蓉为列当科植物肉苁蓉的干燥带鳞叶的肉质茎，即其药用部位是肉质茎。

(4) 【正确答案】C

【答案解析】广藿香为唇形科植物广藿香的干燥地上部分。

5. (1) 【正确答案】A

【答案解析】西红花以柱头色棕红、黄色花柱少者为佳。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】丁香以完整，个大，油性足，颜色深红、香气浓郁、入水下沉者为佳。

(3) 【正确答案】B

【答案解析】红花以花冠色红而鲜艳、无枝刺、质柔润、手握软如茸毛者为佳。

6. (1) 【正确答案】A

【答案解析】大青叶主产于河北、陕西、江苏、安徽等省。大多为栽培品。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】狭叶番泻主产于红海以东至印度一带，现盛栽于印度南端丁内未利，故商品又名印度番泻叶或丁内未利番泻叶，现埃及和苏丹亦产。

7. (1) 【正确答案】E

【答案解析】苏木主产台湾、广东、广西、贵州等省区。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】沉香主产于广东、海南、广西、福建等省区。

(3) 【正确答案】C

【答案解析】钩藤主产于广西、广东、湖北、湖南等省区。其他四种钩藤主产广西、广东等省区。

8. (1) 【正确答案】D

【答案解析】沉香气芳香，味苦。燃烧时气香浓，有油渗出。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】鸡血藤气微、味涩。主要鉴别特点为偏心性半圆环。

9. (1) 【正确答案】D

(2) 【正确答案】B

(3) 【正确答案】C

【答案解析】前胡气芳香，味先甜后微苦辛；川芎气浓香，味苦辛，稍有麻舌感，微回甜；北沙参气特异，味微甜。

10. (1) 【正确答案】D

【答案解析】筛选多用于子实类药材如莱菔子、薏苡仁，也用于菊花、桑叶等。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】有些药材常附着泥沙或不洁之物，用筛选、风选不易除去，故常用洗的方法，如菟丝子、瓦楞子、牡蛎等。即水选的方法。

11. (1) 【正确答案】B

(2) 【正确答案】D

(3) 【正确答案】C

【答案解析】黄柏味苦，性寒。归肾、膀胱经。有清热燥湿、泻火解毒、清虚热等作用。

生黄柏长于泻火解毒、清热燥湿。

盐炙黄柏长于滋阴降火，退虚热。

酒炙黄柏长于清湿热，利关节，清上焦之热。

黄柏炭长于清热止血，多用于崩漏、便血、尿血等。

12. (1) 【正确答案】B

(2) 【正确答案】D

(3) 【正确答案】C

【答案解析】炒焦法的目的

1.增加某些药物的消食健脾作用。如山楂、神曲等。

2.减少药物的刺激性。如山楂炒焦使有机酸含量降低，酸味缓和，刺激性减小。

3.缓和药性。一些药性过偏的药物炒焦后可缓和药性，如栀子炒焦缓和苦寒之性；山楂炒焦

缓和酸性；苍术炒焦缓和辛燥之性；槟榔炒焦缓和克伐伤正之性等。

13. (1) 【正确答案】C


(2) 【正确答案】B

【答案解析】米炒法的目的

- 1.增强药物的健脾止泻作用，如党参。
- 2.降低药物的毒性，矫正不良气味，如红娘子、斑蝥。
- 3.矫正不良气味，如昆虫类药物有腥臭味，经米炒后能矫臭矫味。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

扫描二维码去做题



《专业实践能力》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】C

【答案解析】透皮贴膏属于皮肤给药，不属于黏膜给药。

2. 【正确答案】B

【答案解析】流通蒸气灭菌法和煮沸灭菌法：系指在常压下用 100℃的水蒸气或用水煮沸以杀灭微生物的方法。灭菌时间一般为 30~60 分钟，可杀灭繁殖型细菌，但不一定能完全杀灭芽胞。适于含有抑菌剂药液的灭菌，1~2ml 的注射剂及耐热品种的灭菌。

3. 【正确答案】E

【答案解析】茶剂一般应在 80℃以下干燥，含挥发性成分较多者应在 60℃以下干燥，不宜加热干燥的应选用适宜的方法进行干燥。茶剂应密闭贮存，含挥发性及易吸湿药物的茶剂应密封贮存。

4. 【正确答案】 D

【答案解析】低共熔现象系指当两种或更多种药物混合后，有时出现润湿或液化的现象。如薄荷脑与樟脑、薄荷脑与冰片。含有这些物质时，可采用先形成低共熔物，再与其他固体粉末混匀或分别以固体粉末稀释低共熔组分，再轻轻混合均匀。

5. 【正确答案】 D

【答案解析】水蒸气蒸馏法系指将含有挥发性成分的饮片与水共蒸馏，使挥发性成分随水蒸气一并馏出，经冷凝分取挥发性成分的浸提方法。

6. 【正确答案】 C

【答案解析】可以采用水飞法进行粉碎的药物有朱砂、炉甘石、珍珠、滑石粉等。硼砂不可以采用水飞法，因为硼砂溶于水，故不能采用水飞法进行粉碎。

7. 【正确答案】 A

【答案解析】容量法：常用的散剂分量器是以木质、牛角、金属或塑料制成的一种容量药匙。容量法适用于一般散剂分剂量，方便，效率高，且误差较小。

8. 【正确答案】 E

【答案解析】喷雾干燥和沸腾干燥的共同点是：干燥速率很快、产品质量好、均适用于大规模生产、干燥的物料在一定速度的热气流中进行热交换。而 E 项只是喷雾干燥的特点，不是沸腾干燥的特点，故 E 项是两者的区别点。

9. 【正确答案】 D

【答案解析】浓度差是渗透或扩散的推动力。浓度梯度即为浓度差。

10. 【正确答案】 A

【答案解析】含毒性药的酏剂每 100ml 相当于原饮片 10g，是 10:1 的比例。那么 10ml 就相当于 1g。

11. 【正确答案】 E

【答案解析】产生起昙现象的主要原因是由于聚氧乙烯基中的氧原子与水分子中的氢原子以氢键缔合成水化物，加热至昙点后氢键断裂，从而导致溶解度急剧下降，出现混浊或分层，冷却后氢键重新形成，故恢复澄明。聚山梨酯类属于非离子型表面活性剂：是在司盘类表面活性剂分子结构中的剩余羟基上，结合聚氧乙烯基而制得的醚类化合物，商品为吐温。故吐温中含有聚氧乙烯基，会产生起昙现象。

12. 【正确答案】 B

【答案解析】按分散相粒子大小及分散情况不同，分为溶液型、胶体溶液型、乳浊液型和混悬液型四类，胶体溶液又包括高分子溶液和溶胶。

13. 【正确答案】 D

【答案解析】乳浊液的制备方法有五种：干胶法、湿胶法、新生皂法、两相交替加入法、机械法。

14. 【正确答案】 C

【答案解析】可以增加药物溶解度的方法有：添加增溶剂、添加助溶剂、制成盐类、升高温度、应用微粉化技术或者应用混合溶剂。其中降低温度会降低药物的溶解度，故选 C。

15. 【正确答案】 D

【答案解析】眼用制剂中可加入调节渗透压、pH 值、黏度以及增加药物溶解度和制剂稳定性的辅料，并可加适宜浓度的抑菌剂、抗氧化剂、增溶剂或助溶剂。

16. 【正确答案】 C

【答案解析】按给药部位分类，注射剂分为皮内注射剂、皮下注射剂、肌内注射剂、静脉注射剂、脊椎腔注射剂等。

17. 【正确答案】 D

【答案解析】常用分子量在 300 ~ 6000 的聚乙二醇以适当比例相混合，可制成稠度适宜的基质。

18. 【正确答案】 B

【答案解析】硬胶囊剂系指将药材提取物与药粉或辅料制成的均匀粉末或颗粒填于空心胶囊中制成的剂型。胶囊的主要原料是明胶，辅料有：①增塑剂，如甘油、羧甲基纤维素钠；②增稠剂，如琼脂；③遮光剂，如 2% ~ 3% 的二氧化钛；④着色剂，如柠檬黄、胭脂红等；⑤防腐剂，如尼泊金类；⑥芳香性矫味剂，如 0.1% 的乙基香草醛。根据药物的性质，填充的药物有细粉和颗粒两种。封口后，必要时应进行除粉和打光处理。胶囊剂的规格为数字越大，容积越小。比如 000 号容积最大，5 号胶囊容积最小。

19. 【正确答案】 E

【答案解析】老蜜，炼蜜温度在 119℃ ~ 122℃，含水量小于 10%，相对密度为 1.40 左右，呈红棕色，用于黏性差的矿物药或富含纤维的药粉制丸。

20. 【正确答案】 C

【答案解析】醋：常用米醋(酒醋)，含醋酸 3% ~ 5%。醋能增加药粉中生物碱的溶出，且能活血散瘀，消肿止痛，引药入肝，故入肝经活血散瘀止痛的药物制备水丸时常用醋作赋形剂。

21. 【正确答案】 B

【答案解析】含水量：中药压片用干颗粒含水量一般为 3% ~ 5%；化学药干颗粒含水量为 1% ~ 3%，但个别品种可例外。

22.【正确答案】C

【答案解析】药物类药引可分为两类。一类为引经报使类，如太阳病用防风、羌活、藁本为引，既是其他药物的“向导”，又能发挥自己的药效；另一类为调和诸药类，如甘草、生姜、大枣等。

23.【正确答案】C

【答案解析】医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为 2 年。

24.【正确答案】D

【答案解析】大黄处方用名为：熟大黄、酒炙熟大黄、熟军、炙军，应付酒炙熟大黄。

25.【正确答案】B

【答案解析】直接写药物的正名或炒制时，即付砂烫、蛤粉烫的品种：龟板、鳖甲、穿山甲、阿胶、狗脊、骨碎补、马钱子等。

26.【正确答案】A

【答案解析】普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为 1 年。

27.【正确答案】D

【答案解析】妊娠禁用药大多为毒性较强或药性猛烈的中药，凡禁用的中药绝对不能使用。妊娠慎用药一般包括有通经祛瘀、行气破滞以及药性辛热的中药。慎用的中药可根据孕妇患病的情况，酌情使用。但没有特殊必要时应尽量避免使用，以免发生事故。

28.【正确答案】D

【答案解析】一角(即 1 / 8 张)荷叶。

29.【正确答案】B

【答案解析】质地较轻且用量较少的饮片应放在斗架的高层。如月季花、白梅花与佛手花，玫瑰花、玳玳花与厚朴花，络石藤、海风藤与青风藤，密蒙花、谷精草与木贼草等。

30. 【正确答案】 D

【答案解析】 调配临方配成制剂的要求

要按制剂工艺要求，对需要特殊处理的药物和贵重药物单包，以方便配制和复核，然后交制剂室配制。

31. 【正确答案】 E

【答案解析】 妇科用药有当归丸、调经止带丸、止血片、七制香附丸、益母草膏、加味道遥丸、八珍益母丸、乌鸡白凤丸、当归红枣颗粒、艾附暖宫丸、妇科得生丸、痛经丸；元胡止痛片、妇康片、妇康宝口服液、四物合剂等。木香顺气丸属于内科用药。

32. 【正确答案】 B

【答案解析】 含川乌、草乌、附子、关白附等的中成药有：玉真散、小活络丸、祛风舒筋丸、附子理中丸等。

33. 【正确答案】 E

【答案解析】 对汤剂服用量的规定如下：①成人服用量一般每次约 150ml，每日 1~2 次；②儿童服用量一般每次 75ml，每日 2 次。婴儿酌减。应注意的是，小儿服药，宜浓缩，以少量多次为好，不要急速灌服，以免呛咳；对病情危重者，应遵照医嘱服药。

34. 【正确答案】 A

【答案解析】 服解表、透疹药时，宜少食生冷及酸味食物。因冷物、酸味均有收敛作用，碍于药物的解表、透疹作用。

35. 【正确答案】 C

【答案解析】 驱虫、攻下药最好是空腹服。空腹服药力集中，起效快。

36. 【正确答案】 C

【答案解析】 极易泛油的中药有天冬、麦冬、党参、牛膝(怀牛膝、川牛膝)、板蓝根、柏子

仁、当归、胡桃仁、使君子仁、肉豆蔻、枸杞子、郁李仁、苦杏仁、甜杏仁、桃仁、狗肾、九香虫、刺猬皮、哈士蟆油、壁虎、蜈蚣、蟋蟀、斑蝥虫、牛虻虫、蜈蚣、红娘虫、青娘虫、乌梢蛇、蕲蛇、蛤蚧、水獭肝、鹿筋等。

37. 【正确答案】 A

【答案解析】目前用于直接与中药接触的杀虫防霉剂有氯仿、四氯化碳、二硫化碳、有机氯、有机磷农药、硫黄、氯化苦、磷化铝、对硝基酚、 α -萘酚、水杨酸、安息香酸及其钠盐、醋酸苯汞、氯酚、尼泊金、甲醛溶液等，不过以选择毒性小的为宜。

38. 【正确答案】 D

【答案解析】含动物组织(包括脏器提取物)及动物类原药材(蜂蜜、王浆，动物角、阿胶除外)的口服给药制剂，每 10g 或 10ml 不得检出沙门菌。

39. 【正确答案】 D

【答案解析】辐射灭菌是应用 γ 射线杀灭细菌的方法。由于 γ 射线穿透力极强，可用于密封和整箱已包装的药物的灭菌，灭菌效果可靠，一般认为中成药用 10 千格瑞以下剂量辐射均能达到卫生标准的要求。

40. 【正确答案】 B

【答案解析】在不同相共存的系统中，相与相之间存在着界面，固体与气体或液体与气体之间的界面俗称为表面。相与相之间存在着界面张力(或表面张力)，溶液的表面张力大小与溶质的性质和浓度有关。凡能显著降低两相间表面张力(或界面张力)的物质，称为表面活性剂。

41. 【正确答案】 B

【答案解析】 $W = (0.52 - a) / b = (0.52 - 0.05) / 0.58 = 0.81g$ 。

$0.81 \times (1000 \div 100) = 8.1g$ 。

42. 【正确答案】 D

【答案解析】聚乙二醇对人体无毒性，无刺激性，化学性质稳定；能与水、乙醇、丙酮及氯仿混溶。吸湿性好，可吸收分泌液，但易洗涤。可与多数药物配伍，因药物释放和渗透较快，可充分发挥作用。本品与苯甲酸、鞣酸、苯酚等混合可使基质过度软化；可降低酚类防腐剂的防腐能力；长期使用可致皮肤干燥。

43. 【正确答案】 C

【答案解析】甘油明胶：本品系用明胶、甘油与水制成，具有弹性，不易折断，在体温时不熔融，但可缓缓溶于分泌液中，药物溶出速度可随水、明胶、甘油三者的比例不同而改变，甘油与水的含量越高越易溶解。本品常作阴道栓的基质，但不适用于与蛋白质有配伍禁忌的药物，如鞣酸等。另外，本品易滋生微生物，需加防腐剂。

44. 【正确答案】 B

【答案解析】水溶性基质在体内溶解快，药物释放迅速，所以不具有缓释作用。

45. 【正确答案】 C

【答案解析】粉衣层（粉底层）：系指使衣层迅速增厚，消除药片原有棱角，为包好糖衣层打基础的衣料层。包衣物料为糖浆及滑石粉等。不需包隔离层的片剂可直接包粉衣层。一般包 15 ~ 18 层。

46. 【正确答案】 A

【答案解析】君药是针对发病原因或主症而起主要治疗作用的药物，它是处方中不可缺少的主要部分，药力居方中之首。

47. 【正确答案】 A

【答案解析】后下

(1) 气味芳香、含挥发性成分的饮片不宜煎煮时间过久，以免有效成分散失。一般在其他群药煎好前 5 ~ 10 分钟入煎即可。如薄荷、砂仁、豆蔻、降香、沉香、鱼腥草等。

(2) 含有久煎后有效成分易破坏的饮片也需后下，一般在其他群药煎好前 10~15 分钟入煎即可。如钩藤、苦杏仁、徐长卿、大黄等。

48. 【正确答案】 B

【答案解析】 橘核盐炙后可增加入肾的功效，调剂工作中一般写“橘核”，即付盐炙品。

49. 【正确答案】 D

【答案解析】 麻醉药品处方至少保存 3 年。

50. 【正确答案】 D

【答案解析】 “焦四仙”是指焦山楂、焦神曲、焦麦芽、焦槟榔。

51. 【正确答案】 A

【答案解析】 临床上不合理用药主要表现在：用药指征不明确、违反禁忌证、给药剂量过大或过小、疗程过长或过短、给药途径不适宜、给药方法不当、合并用药过多、盲目选用贵重药等。

52. 【正确答案】 B

【答案解析】 药店供应和调配毒性药品，凭盖有医师所在医疗单位公章的正式处方，每次处方剂量不得超过 2 日极量。

53. 【正确答案】 B

【答案解析】 铢：汉以二十四铢为一两，十六两为一斤。

54. 【正确答案】 B

【答案解析】 黑附片与半夏片之间存在配伍禁忌。

55. 【正确答案】 C

【答案解析】 收方人员应由有实践经验的主管中药师或中药师担任。

56. 【正确答案】 B

【答案解析】“四大怀药”包括怀山药、怀地黄、怀牛膝、怀菊花。白术主产于浙江、安徽、湖南等省，以浙江省磐安等地质量上乘，属于“浙八味”之一。

57. 【正确答案】 B

【答案解析】麻醉中药罂粟壳每张处方不超过 3 日常用量（3~6g/日），即总共 18g，且不得单包，必须混入群药，防止变相套购。连续使用不得超过 7 天。处方由经营或使用单位留存 3 年备查。

58. 【正确答案】 E

【答案解析】天然樟脑驱虫属于化学药剂防治方法。

59. 【正确答案】 E

【答案解析】风化属于含结晶水的矿物类单味中药在养护过程中发生的问题，并非中成药常见的养护问题。

60. 【正确答案】 E

【答案解析】麝香不宜与冰片混存，以免串味。

二、B 型题

1. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】乙醇为半极性溶剂，溶解性能介于极性与非极性溶剂之间。90%以上的乙醇适于浸提挥发油、树脂、叶绿素等。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】选择适宜的醇沉浓度。一般药液中含醇量达 50%~60%可除去淀粉等杂质，含醇量达 75%以上大部分杂质均可沉淀除去。

2. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】嫩蜜，炼蜜温度在 105℃~115℃，含水量达 17%~20%，相对密度为 1.34

左右，色泽无明显变化，略有黏性，适用于含淀粉、黏液质、胶质、糖类及脂肪较多的药物。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】老蜜，炼蜜温度在 119℃ ~ 122℃，含水量小于 10%，相对密度为 1.40 左右，呈红棕色，用于黏性差的矿物药或富含纤维的药粉制丸。

3. (1) 【正确答案】A

【答案解析】中药变色范围很广，严格来说各类药物在流通过程中，色泽总是在不断地变化，只是有的不甚明显罢了。而药物一旦遭受发热生霉泛油之后，就会产生不同程度的变色，这种现象比较普遍。尤其是一些色泽鲜艳的中药，如玫瑰花、月季花、梅花、款冬花、腊梅花、扁豆花、菊花、玳玳花、红花、山茶花、金银花、槐花（米）、莲须、莲子心、橘络、佛手片、通草、麻黄等。其中又以玫瑰花、款冬花、扁豆花、莲须、佛手片等最易变色。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】极易泛油的中药：天冬、麦冬、党参、牛膝（怀牛膝、川牛膝）、板蓝根、柏子仁、当归、胡桃仁、使君子仁、肉豆蔻、枸杞子、郁李仁、苦杏仁、甜杏仁、桃仁、狗肾、九香虫、刺猬皮、哈士蟆油、壁虎、蜈蚣、蟋蟀、斑蝥虫、牛虻虫、蜈蚣、红娘虫、青娘虫、乌梢蛇、蕲蛇、蛤蚧、水獭肝、鹿筋等。

4. (1) 【正确答案】B

【答案解析】加液研磨法系将药料先放入研钵中，加入少量液体后进行研磨，直至药料被研细为止。研樟脑、冰片、薄荷脑等药时，常加入少量乙醇；研麝香时，则加入极少量水。要注意轻研冰片，重研麝香。适用于樟脑、冰片、薄荷脑、麝香等药的粉碎。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】水飞法系将非水溶性药料先打成碎块，置于研钵中，加入适量水，以杵棒用力研磨，直至药料被研细，如朱砂、炉甘石、珍珠、滑石粉等。

5. (1) 【正确答案】D

【答案解析】水蒸气蒸馏法系指将含有挥发性成分的饮片与水共蒸馏，使挥发性成分随水蒸气一并馏出，经冷凝分取挥发性成分的浸提方法。(1)特点：混合物的沸点较单一液体的沸点为低，故可以在低于这两种液体沸点的情况下，将高沸点物质与不挥发性物质进行分离。(2)应用：该法适用于具有挥发性、能随水蒸气蒸馏而不被破坏、在水中稳定且难溶或不溶于水的药材成分的浸提。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】渗漉法是将适度粉碎的饮片润湿后置渗漉筒中，由上部不断添加溶剂，溶剂渗过饮片层向下流动过程中浸出饮片成分的方法。(1)特点：渗漉属于动态浸出方法，溶剂利用率高，有效成分浸出完全，不经滤过处理可直接收集浸出液。常用不同浓度的乙醇或白酒作溶剂。(2)应用：适用于贵重药材、毒性药材及高浓度制剂；也可用于有效成分含量较低的药材提取。但对新鲜的及易膨胀的药材、无组织结构的药材不宜选用。

6. (1) 【正确答案】E

【答案解析】中药合剂与口服液的制备工艺流程为：浸提→精制→浓缩→配液→分装→灭菌。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】煎膏剂的制法：煎膏剂的制备工艺流程为：煎煮→浓缩→收膏→分装→成品。

7. (1) 【正确答案】C

【答案解析】注射液的 pH 一般在 4~9 之间，大量输入的注射液 pH 应近中性。调整注射液 pH 至适宜范围能够减少对机体的刺激，增加注射液的稳定性，加速药物的吸收。常用的调节 pH 值的附加剂有盐酸、枸橼酸、氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠等。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】三氯叔丁醇：常用量为 0.3%~1%，既有止痛作用，又有抑菌作用。

8. (1) 【正确答案】C

【答案解析】软胶囊囊材主要由胶料（明胶）、增塑剂（甘油或山梨醇）、附加剂（防腐剂、色素、香料、遮光剂、芳香矫味剂）和水组成。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】软胶囊可以用滴制法和压制法来制备。

9. (1) 【正确答案】C

(2) 【正确答案】A

【答案解析】小蜜丸、水蜜丸和水丸 1 小时内全部溶散；浓缩丸和糊丸 2 小时内全部溶散；滴丸 30 分钟全部溶散，包衣滴丸 1 小时全部溶散。大蜜丸不作检查。

10. (1) 【正确答案】E

【答案解析】打光：在包衣片衣层表面打上薄薄一层的虫蜡。使片衣表面光亮，且有防潮作用。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】粉衣层（粉底层）：系指使衣层迅速增厚，消除药片原有棱角，为包好糖衣层打基础的衣料层。包衣物料为糖浆及滑石粉等。不需包隔离层的片剂可直接包粉衣层。一般包 15~18 层。

11. (1) 【正确答案】D

【答案解析】处方写“赤白芍 20g”时，二者应各称量 10g。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】处方写“赤白芍各 20g”时，二者应各称量 20g。

12. (1) 【正确答案】E

【答案解析】车前子种子较为细小，同时经过煎煮可溶出大量黏液质，故此需要包煎。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】阿胶属于胶类中药，为防止影响其他药物成分的溶出以及煎煮糊锅，故应用时需要烊化处理。

13. (1) 【正确答案】C

(2) 【正确答案】B

【答案解析】根据我国相关处方管理制度要求，麻醉药品与第一类精神药品处方保存期限为 3 年，医疗用毒性药品与第二类精神药品处方保存期限为 2 年。

14. (1) 【正确答案】A

【答案解析】方寸匕：古代量取药物的器具。其形状如刀匕，大小为一寸正方，故名。一方寸匕约等于现代的 2.74ml，盛金石药末约为 2g，草木药末为 1g 左右。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】枚：为果实计数的单位，随品种不同，亦各有其标准，例如大枣十二枚，则可选较大者为一枚之标准。

15. (1) 【正确答案】D

【答案解析】根据十八反“诸参辛芍叛藜芦”得知，人参与藜芦存在配伍禁忌。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】根据十八反“半蒺贝藜及攻乌”得知，半夏与草乌存在配伍禁忌。

16. (1) 【正确答案】C

【答案解析】牛黄降压丸

【主要成分】冰片、牛黄、珍珠、羚羊角等。

【功能】清心化痰，平肝安神。

【主治】心肝火旺、痰热壅盛所致的头目眩晕、头痛失眠、烦躁不安，高血压病见上述证候者。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】小活络丸

【主要成分】胆南星、制川乌、制草乌、地龙、乳香、没药。

【功能】祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。

【主治】风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛，或冷痛，或刺痛，或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。

17. (1) 【正确答案】B

【答案解析】真菌生长适合的温度是 20~35℃。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】药材贮藏冷库的温度是 0~10℃。

18. (1) 【正确答案】A

【答案解析】片剂因含药粉或浸膏量较多因此极易吸潮、松片、裂片。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】颗粒剂含有浸膏与大量蔗糖，且外观呈细小颗粒状，易受潮结块。

19. (1) 【正确答案】A

【答案解析】细辛主产于东北地区，又称“辽细辛”，属于关药。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】附子主产于四川江油、青川等地，属于川药。

20. (1) 【正确答案】B

【答案解析】小柴胡片

【主要成分】柴胡、黄芩、党参、姜半夏、甘草、生姜、大枣。

【功能】解表散热，疏肝和胃。

【主治】外感病，邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】防风通圣丸

【主要成分】甘草、生石膏、黄芩、桔梗、防风、川芎、当归、白芍、大黄、薄荷、麻黄、连翘、芒硝、荆芥穗、白术、栀子、滑石。

【功能】解表通里，清热解毒。

【主治】外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，瘰疬初起，风疹湿疹。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



www.med66.com



正保医学教育网

www.med66.com



医学教育网咨询热线：010-82311666 400 650 1888



正保医学教育网
www.med66.com

医学教育网（www.med66.com）是正保远程教育旗下医学业务领域的核心品牌网站，是一家集医学类考试培训服务和政策动态信息服务的大型综合性医学辅导平台。

正保医学教育网目前已覆盖40类医学辅导、1000余门考培课程、累计注册学员近500万人，凭借雄厚的师资力量、先进的视频课件技术、严谨细致的教学作风及灵活多样的教学方式，为全国数百万医学从业人员提供了考证、从业和晋升等专业帮助，培养了大量医学人才。



官方微信号



课程免费体验



医学教育网App