

仿真  
密卷

✓ 学霸同款

✓ 精华提炼

✓ 实战练习

卫生专业技术资格考试

**中西医结合内科学（中级）**

医学教育网命题组 编

**绝密·内部**

依据考纲  
精心研发

考前爆料  
命题规律

精选考题  
仿真练习

《基础知识》仿真密卷

一、A1 型题

**答题说明：**以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 疾病过程中某一阶段或某一类型的病理性概括，指的是

- A. 疾病
- B. 证候
- C. 症状
- D. 病症
- E. 体征

2. 促进并维持人体性功能发育成熟的物质是

- A. 血液
- B. 天癸
- C. 津液
- D. 肾气
- E. 宗气

3. 脏腑关系中，主要表现呼吸功能方面的两个脏是

- A. 肺与肝
- B. 肺与心
- C. 心与肾
- D. 肺与脾
- E. 肺与肾

4.与“少气不足以息、声低气怯、肢倦乏力”关系密切的是

- A.心气虚
- B.肝血虚
- C.肾气虚
- D.肺气虚
- E.脾气虚

5.中医学认为脾为“后天之本”，其理论依据是

- A.脾应长夏
- B.脾主运化
- C.脾主升清
- D.脾主统血
- E.脾喜燥恶湿

6.与血液的生成和运行密切联系的

- A.心与脾
- B.心与肺
- C.心与肝
- D.肝与脾
- E.脾与肺

7.肾主纳气之功能失调的主要表现不包括

- A.呼多吸少
- B.呼少吸多
- C.久病咳喘

D.动辄气喘

E.呼吸表浅

8.与肝相对应的季节为

A.春季

B.夏季

C.长夏

D.秋季

E.冬季

9.治疗血行瘀滞，多配用补气、行气药，是由于

A.气能生血

B.气能行血

C.气能摄血

D.血能生气

E.血能载气

10.下列各项，具有“慄疾滑利”特点的气是

A.卫气

B.营气

C.元气

D.宗气

E.清气

11.“吐下之余，定无完气”的理论基础是

A.气能生津

B.气能行津

C.气能摄津

D.津能生气

E.津能载气

12.气滞常会伴有血瘀，理论依据是

A.气能生血

B.气能行血

C.气能摄血

D.血能养气

E.血能载气

13.与血液生成作用密切相关的脏腑是

A.脾、心、肺、肾

B.肝、心、肺、肾

C.脾、心、肺、肝

D.脾、心、肝、肾

E.脾、肝、肺、肾

14.外感六淫中，常为其他外邪之先导的邪气是

A.暑邪

B.风邪

C.火邪

D.燥邪

E.湿邪

15.瘀血致病脉象多为

- A.结代
- B.沉迟
- C.弦数
- D.濡滑
- E.洪数

16.疾病发生的重要条件

- A.邪气亢盛
- B.正气受损
- C.正气不足
- D.邪气损正
- E.正气抗邪

17.久病患者，纳少乏力，自觉腹痛腹胀，但时有减缓，喜揉喜按，舌质淡嫩而苔润，脉细

弱。分析其病机可能是

- A.真实假虚
- B.实中夹虚
- C.真虚假实
- D.虚实错杂
- E.虚中夹实

18.内生“五邪”包括

- A.内风、内暑、内湿、内燥、内火
- B.内风、内寒、内暑、内燥、内火

C.内风、内寒、内湿、内燥、内火

D.内风、内寒、内湿、内暑、内火

E.内风、内寒、内湿、内燥、内暑

19.气的升发太过或下降不及，称之为

A.气闭

B.气滞

C.气逆

D.气陷

E.气脱

20. “故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔，如是则僻邪不至，长生久视。”，这段话出自

A.《灵枢·本神》

B.《素问·上古天真论》

C.《素问·四气调神大论》

D.《素问·至真要大论》

E.《素问·阴阳应象大论》

21.创造性提出望闻问切四诊之法的是

A.《伤寒论》

B.《金匱要略》

C.《内经》

D.《温病学》

E.《难经》

22.根据《素问·举痛论》原文，引起“气耗”的原因是

- A.寒
- B.炅
- C.惊
- D.劳
- E.悲

23.竹叶石膏汤主治

- A.余热未清，肝胃不和证
- B.中焦虚寒，肝脾失调证
- C.余热未清，气阴两伤证
- D.余热未清，脾胃虚寒证
- E.中焦虚寒，脾虚湿盛证

24.当归四逆汤的药物组成正确的是

- A.桂枝汤去芍药，加当归、细辛、枳实
- B.桂枝汤去大枣，加当归、细辛、通草
- C.桂枝汤去芍药，加当归、细辛、通草
- D.桂枝汤去生姜，加当归、枳实、通草
- E.桂枝汤去生姜，加当归、细辛、通草

25.真武汤治疗

- A.阳郁厥逆
- B.少阴阴虚火旺，心肾不交
- C.阴虚水热互结



D.少阴寒化兼太阳表证

E.少阴阳虚水泛

26.白虎加人参汤证的治则为

A.清热止渴，益气生津

B.温阳利水，润燥止渴

C.温阳散寒，通便止痛

D.温阳利水，益气生津

E.清热利湿，润燥止渴

27.《金匱要略》中，桂枝茯苓丸的药物组成中不包括

A.桂枝

B.茯苓

C.芍药

D.杏仁

E.牡丹皮

28.《金匱要略》中论述了虚劳病心肝血虚失眠的是

A.酸枣仁汤证

B.麦门冬汤证

C.朱砂安神丸证

D.天王补心丹证

E.桂枝加龙骨牡蛎汤证

29.治疗烂喉痧毒燔气营证首选

A.三石汤

B.蒿芩清胆汤

C.普济消毒饮

D.凉营清气汤

E.薛氏五叶芦根汤

30.湿温病常发生的季节是

A.春夏

B.春秋

C.夏秋

D.冬春

E.冬夏

31.证见身热汗出口渴，面赤耳聋，眩晕，胸闷喘咳，痰中带血，脘痞腹胀，下利稀水，小便短赤，舌红，苔黄滑，脉滑数，为

A.湿热中阻

B.湿热蕴毒

C.暑湿郁阻少阳

D.暑湿弥漫三焦

E.湿热酿痰，蒙蔽心包

32.认为马钱子无毒的著作是

A.《本草纲目》

B.《中国药学大辞典》

C.《内经》

D.《金匱要略》

E.《难经》

33.妊娠慎用的药物不包括的是

A.枳实

B.肉桂

C.附子

D.红花

E.莪术

34.病位在胸膈以上者，服药时间为

A.饭前服用

B.空腹服用

C.定时服用

D.不定时服用

E.饭后服用

35.善于治疗风热音哑，肝热目赤，小儿夜啼的药物是

A.薄荷

B.柴胡

C.葛根

D.桑叶

E.蝉蜕

36.阴虚火旺、肺肾阴虚所致盗汗、骨蒸潮热，宜选用的药物是

A.天花粉、沙参

B.青蒿、黄柏

C.黄柏、知母

D.黄芩、地骨皮

E.牡丹皮、桑白皮

37.甘遂、京大戟、芫花配伍应用时，不宜与下列何药配伍

A.干姜

B.海藻

C.人参

D.甘草

E.藜芦

38.防己的功效是

A.祛风湿，舒经络，解表

B.祛风湿，消骨鲠，解暑

C.祛风湿，止痛，化湿和胃

D.祛风湿，止痛，安胎

E.祛风湿，止痛，利水消肿

39.具有燥湿健脾，祛风散寒的功效，兼治疗夜盲症的药物是

A.砂仁

B.苍术

C.豆蔻

D.草果

E.以上都不是

40.均有清热利湿，退黄疸功效的药物是

A.葫芦、冬瓜皮

B.茯苓、赤小豆

C.金钱草、石韦

D.茵陈、冬葵子

E.茵陈、金钱草

41.具有温肾阳，温脾阳，温通血脉，引火归原功效的药物是

A.附子

B.干姜

C.肉桂

D.吴茱萸

E.桂枝

42.沉香具有的功效是

A.温中降逆，散寒止痛，温肾助阳

B.疏肝破气，消积化滞

C.破气除痞，化痰消积

D.行气止痛，温中止呕，纳气平喘

E.行气止痛，温肾散寒

43.鸡内金入药最宜

A.先煎

B.研末服

C.后下

D.包煎

E.另煎

44.南瓜子的用法用量为

A.煎服，30~50g

B.煎服，10~15g，捣碎

C.研粉，60~120g，冷开水调服

D.煎服，9~12g，捣碎，取仁炒香嚼服

E.研末服，每次20~30g

45.“十八反”中，与白及相反的药物是

A.甘草

B.乌头

C.藜芦

D.甘遂

E.芫花

46.穿山甲的功效为

A.破血逐瘀，散结消癥，攻毒蚀疮

B.破血通经，逐瘀消癥

C.活血消癥，搜风通经，通经下乳，消肿排脓

D.破血行气，消积止痛

E.活血定痛，化瘀止血，敛疮生肌

47.紫菀与款冬花都具有的功效是

A.燥湿化痰

B.清肺化痰

C.泻肺平喘

D.润肺止咳

E.止咳平喘

48.具有养心益肝，安神，敛汗功效的药物是

A.酸枣仁

B.莲子

C.远志

D.合欢皮

E.首乌藤

49.不入汤剂，只入丸散剂的药物是

A.马勃

B.蝉衣

C.石膏

D.牛黄

E.天花粉

50.石菖蒲在治疗痢疾方面长于治疗

A.湿热痢

B.寒湿痢

C.休息痢

D.噤口痢

E.疫毒痢

51.都具有涩肠止泻作用的药物是

A.五味子、桑螵蛸

B.肉豆蔻、麻黄根

C.莲子、覆盆子

D.乌梅、肉豆蔻

E.罂粟壳、芡实

52.关于十枣汤应用注意事项中描述不正确的是

A.宜清晨空腹服用

B.从大量开始，据病情增减用量

C.孕妇禁用

D.服药得快利后，食粥以养

E.年老者慎用

53.温脾汤中大黄配附子意在

A.温阳祛寒，攻下冷积

B.攻润相合，下不伤正

C.益气养血，下不伤正

D.泻结泄热，温中散寒

E.泻热逐瘀，下不伤正

54.逍遥散主证的病机要点是

A.阴虚肝郁，横犯脾胃

B.肝血不足，疏泄失常

C.肝气郁滞，耗伤阴血

D.肝郁血虚，脾失健运



E.营血虚滞，肝失疏泄

55.蒿芩清胆汤的功用是

A.疏肝解郁，益血健脾

B.补脾柔肝，祛湿止泻

C.清热泻火，利水通淋

D.清热利湿，逐瘀退黄

E.清胆利湿，和胃化痰

56.下列各项中，不属于仙方活命饮组成药物的是

A.连翘、荆芥、木香

B.贝母、乳香、没药

C.防风、甘草、皂角刺

D.当归、防风、天花粉

E.甘草、白芷、穿山甲

57.香薷散主治

A.阴暑证

B.暑湿证

C.暑热气津两伤证

D.暑热证

E.阳暑证

58.地黄饮子主治

A.肾阳不足证

B.下元虚衰，痰浊上泛之暗瘖证

C.真阴不足证

D.阴虚火旺证

E.肝肾阴虚证

59.治疗五更泄泻的首选方剂是

A.四神丸

B.理中丸

C.吴茱萸汤

D.真人养脏汤

E.金匱肾气丸

60.酸枣仁汤主治证候的病因病机是

A.心脾两虚， 气血不足

B.心阳偏亢， 心肾不交

C.心肾两亏， 阴虚血少

D.肝血不足， 虚热内扰

E.心阴不足， 肝气失和

61.安宫牛黄丸和至宝丹中通达十二经， 为开窍醒神之要药的药物是

A.郁金

B.黄连

C.冰片

D.麝香

E.龙脑

62.定喘汤的组成药物中不包括

- A.杏仁、法半夏
- B.苏子、款冬花
- C.桑叶、桔梗
- D.黄芩、桑白皮
- E.甘草、白果

63.具有养血祛瘀、温经散寒功效的方剂是

- A.失笑散
- B.少腹逐瘀汤
- C.生化汤
- D.复元活血汤
- E.温经汤

64.天麻钩藤饮的组成药物中含有

- A.生龙骨
- B.生牡蛎
- C.川牛膝
- D.生龟板
- E.生鳖甲

65.治疗白喉的方剂是

- A.济川煎
- B.增液汤
- C.麦门冬汤
- D.养阴清肺汤

E.百合固金汤

66.患者头痛身重，肩背、腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮，治宜用

A.桂枝汤

B.羌活胜湿汤

C.防己黄芪汤

D.独活寄生汤

E.以上都不是

67.贝母瓜蒌散主治

A.燥痰咳嗽

B.风痰上扰证

C.寒饮咳嗽

D.热痰咳嗽

E.湿痰证

68.健脾丸主治

A.寒湿食积证

B.湿热食积证

C.脾虚食积证

D.肝郁食积证

E.以上都不对

## 二、B 型题

**答题说明：**以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个

备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可

以选用数次，但也可以一次不选用。

1.A.胆

B.胃

C.脾

D.肺

E.肾

(1) 具有“朝百脉，主治节”功能的脏腑是

(2) 具有“腐熟水谷”功能的脏腑是

2.A.宗气

B.谷气

C.卫气

D.清气

E.元气

(1) 脾肺共同化生之气是

(2) 先天之精所化生之气是

3.A.瘀血

B.痰饮

C.疝气

D.结石

E.劳逸失度

(1) 上述各项，致病易于蒙蔽心神的是

(2) 上述各项，致病影响新血生成的是

4.A.实寒证

B.虚寒证

C.虚热证

D.实热证

E.寒热错杂证

(1) 阳偏盛引起的病理变化是

(2) 阳偏衰引起的病理变化是

5.A.脉极虚芤迟

B.尺中小紧

C.脉反沉迟

D.脉浮

E.脉洪大

(1) 属于瓜蒌桂枝汤证脉象特点的是

(2) 属于防己黄芪汤证脉象特点的是

6.A.气分证

B.血分证

C.卫分证

D.营分证

E.卫营同病证

(1) 热陷心包，心窍闭阻属于

(2) 湿热酿痰，蒙蔽心包属于

7.A.表寒证运用辛温解表的方药

- B.里热证采用苦寒清里的方药
- C.气血虚弱采用补气养血的方药
- D.瘀血证采用活血化瘀的方药
- E.里寒证运用辛热温里的方药

(1) 上述各项, 属“热者寒之”治法具体运用的是

(2) 上述各项, 属“虚者补之”治法具体运用的是

- 8.A.风寒束表, 肺气失宣
- B.外邪入里, 邪热壅肺
- C.饮停中焦, 上逆犯肺
- D.肠热壅盛, 上蒸迫肺
- E.素有喘病, 外感引发

(1) 麻杏甘石汤证之喘是因为

(2) 葛根芩连汤证见喘是因为

- 9.A.射干
- B.鱼腥草
- C.紫草
- D.苦参
- E.蒲公英

(1) 具有清热解毒、排脓利尿功效的药物是

(2) 具有凉血活血、解毒透疹功效的药物是

- 10.A.茵陈
- B.蒺藜

C.木通

D.薏苡仁

E.萆薢

(1) 具有利湿退黄功效的药物是

(2) 具有杀虫止痒功效的是

11.A.滋补肝肾，益精明目

B.补益肝肾，乌须明目

C.补益肝肾，润肠通便

D.补益肝肾，养血补心

E.滋补肝肾，清心安神

(1) 女贞子的功效为

(2) 枸杞的功效为

12.A.回阳救逆

B.补火助阳

C.温胃止呕

D.发汗平喘

E.发汗解肌

(1) 肉桂具有的功效是

(2) 桂枝具有的功效是

13.A.大承气汤

B.小承气汤

C.调胃承气汤



D.大柴胡汤

E.黄龙汤

(1) 主治痞、满、实之阳明热结轻证的方剂是

(2) 主治阳明燥热内结，燥、实而无痞、满之证的方剂是

14.A.痛泻要方

B.白头翁汤

C.芍药汤

D.木香槟榔丸

E.葛根芩连汤

(1) 治疗协热下利证的最佳方剂是

(2) 治疗赤白相兼的湿热痢疾的最佳方剂是

15.A.一贯煎

B.四神丸

C.真人养脏汤

D.右归丸

E.止嗽散

(1) 治疗泻痢无度，滑脱不禁的方剂是

(2) 治疗脾肾阳虚之肾泄的方剂是

16.A.邪热内陷心包

B.热闭心包

C.寒闭证

D.痰热扰心证

E.热盛动风证

- (1) 安宫牛黄丸的主治证是
- (2) 至宝丹的主治证是

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

**扫描二维码去做题**



正保医学教育网

www.med66.com

《相关专业知识》仿真密卷

一、A1 型题

**答题说明：**以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 头目胀痛多见于

- A. 肝阳上亢
- B. 脾胃湿热
- C. 肝肾阴虚
- D. 中气下陷
- E. 外感风热

2. 因风湿侵袭，气血运行不畅的疼痛属于

- A. 酸痛
- B. 绞痛
- C. 掣痛
- D. 空痛
- E. 重痛

3. 身体一半出汗，另一半无汗属于

- A. 热汗
- B. 半身汗
- C. 亡阳之汗
- D. 自汗
- E. 绝汗

4.下列哪种目色为黄疸的主要标志特点

- A.目赤肿痛
- B.白睛发黄
- C.目眦淡白
- D.目胞色黑晦暗
- E.目睛灰白混浊

5.口唇赤肿而干多为

- A.热盛
- B.热极
- C.瘀血
- D.寒盛
- E.痛极

6.患者呕吐清水痰涎者，多属于

- A.寒呕
- B.伤食
- C.肝胆郁热
- D.热呕
- E.痰饮

7.短缩舌与痿软舌的共同病机是

- A.痰浊内阻
- B.风痰阻络
- C.气血俱虚



D.寒凝筋脉

E.热入心包

8.患者舌苔厚腻如积粉，多为

A.湿邪夹热毒

B.食积内停

C.痰饮上泛

D.痰湿化热

E.湿浊内盛

9.为胃气渐复之象的是

A.舌苔剥脱部位时时移动

B.未剥落处仍有滑苔

C.舌苔从全到剥落

D.舌苔剥落后复生薄白苔

E.剥脱处全无舌苔

10.导致自言自语，喃喃不休，见人则止，首尾不续的主要原因是

A.心气虚弱，神气不足

B.痰热互结，上扰神明

C.心气大伤，精神散乱

D.痰气郁结，阻蔽神明

E.气郁化痰，痰火扰心

11.“金破不鸣”是指

A.久病失音

B.少气

C.肺虚咳嗽

D.肾虚作喘

E.抑郁太息

12.脉有神的表现特点为

A.徐和从容

B.从容软滑

C.节律整齐

D.尺脉有力

E.沉取不绝

13.食积化热，常见的脉象是

A.洪数

B.弦滑

C.弦数

D.弦细

E.滑数

14.具有脉体宽大，但无脉来汹涌之势的特征是

A.大脉

B.芤脉

C.实脉

D.洪脉

E.濡脉



15. 辨别寒热真假的关键是

- A. 面色
- B. 四肢温度
- C. 胸腹的冷热
- D. 脉象
- E. 神志

16. 疾病初期，恶寒发热并见多见于

- A. 外感表证
- B. 疟疾
- C. 阴虚证
- D. 阳虚证
- E. 寒湿证

17. 有关表证的临床表现中，不正确的是

- A. 恶寒重发热轻
- B. 恶寒轻发热重
- C. 鼻塞流涕、喷嚏
- D. 舌苔薄黄
- E. 脉沉实

18. 阳虚证的临床表现为

- A. 畏冷肢凉
- B. 五心烦热
- C. 两颧潮红

D.大便干结

E.舌红脉细数

19.暖气酸腐常见的原因是

A.中焦湿热

B.肝气犯胃

C.脾胃虚弱

D.宿食内停

E.胃阳亏虚

20.气虚类证不包括的是

A.气陷证

B.气结证

C.气不固证

D.气虚证

E.气脱证

21.痰火扰神证除可见神昏外，还可见的症状是

A.脉象细数

B.舌红苔黄腻

C.小便清长

D.高热抽搐

E.渴喜冷饮

22.小便赤涩灼痛，兼面赤口渴，心烦不寐，便干，舌红脉数，最宜诊断为

A.心火亢盛证



B.膀胱湿热证

C.心火下移证

D.阴虚火旺证

E.下焦湿热证

23.不属于寒湿困脾证临床表现的是

A.纳呆

B.肢冷

C.腹胀

D.便溏

E.身重

24.以干咳、少痰、腰酸、遗精为主要表现的虚热证候是

A.肺肾气虚证

B.肺肾阴虚证

C.脾肺气虚证

D.心肺气虚证

E.心肝血虚证

25.营分证一般不出现的症状是

A.脉象细数

B.夜间低热

C.舌质红绛

D.心烦不寐

E.时有谵语

26.下列哪项不属于卫分证的临床表现

- A.发热微恶寒
- B.头痛
- C.咽喉肿痛
- D.舌质深绛
- E.脉浮数

27.引起胸痛的胸壁疾病是

- A.肋骨病变
- B.心肌病变
- C.血管病变
- D.腹膜病变
- E.心脏神经症

28.下列最容易引起大量咯血的疾病是

- A.肺炎
- B.空洞型肺结核
- C.二尖瓣狭窄
- D.肺肿瘤
- E.肺梗死

29.下列可引起咳嗽的疾病是

- A.胸膜疾病
- B.呼吸道疾病
- C.心血管疾病

D.中枢神经因素

E.以上都是

30.呼吸困难伴发热可见于

A.肺炎

B.肺脓肿

C.肺结核

D.胸膜炎

E.以上都是

31.引起发热的病因中，属非感染性发热的是

A.立克次体

B.变态反应

C.肺炎支原体

D.螺旋体

E.病毒

32.长期服用肾上腺糖皮质激素的病人会出现

A.二尖瓣面容

B.满月面容

C.急性病容

D.无欲貌

E.贫血面容

33.胃癌发生淋巴结转移时常出现在

A.右锁骨上窝

B.左锁骨上窝

C.颈部

D.腋窝

E.滑车上

34.心尖区触及舒张期震颤，提示

A.主动脉瓣狭窄

B.肺动脉瓣狭窄

C.室间隔缺损

D.二尖瓣狭窄

E.二尖瓣关闭不全

35.双上眼睑下垂见于

A.脑炎

B.脑脓肿

C.蛛网膜下腔出血

D.脑出血

E.重症肌无力

36.可引起肢端肥大症的疾病是

A.缺铁性贫血

B.亚急性感染性心内膜炎

C.腺垂体功能亢进

D.类风湿关节炎

E.结核性关节炎



37.下列中性粒细胞病理性增多的原因中，属于急性中毒的是

- A.麻疹
- B.糖尿病酮症酸中毒
- C.再生障碍性贫血
- D.脾功能亢进
- E.伤寒

38.当内生肌酐清除率（Ccr）为 20~50ml/min，肾功能分期是

- A.肾功能正常
- B.肾衰竭代偿期
- C.肾衰竭失代偿期
- D.肾衰竭期
- E.肾衰竭终末期

39.某患者尿蛋白定性试验阳性，诊断应考虑为

- A.糖尿病
- B.蛋白尿
- C.类固醇性糖尿病
- D.尿酮体
- E.应激性糖尿

40.急性胰腺炎血清淀粉酶达高峰是在

- A.发病后 4~8 小时
- B.发病后 4~12 小时
- C.发病后 6~12 小时

D.发病后 12~24 小时

E.发病后 12~72 小时

41.下列说明乙肝患者已恢复的是

A.HBsAg (+)

B.抗-HBs (+)

C.HBeAg (+)

D.抗-HBe (+)

E.抗-HBc (+)

42.二度Ⅱ型房室传导阻滞

A.P-R 间期进行性缩短

B.R-R 间距进行性延长

C.固定的房室 3 : 1 传导

D.P-R 间期进行性延长, 伴 QRS 波脱漏

E.P-R 间期恒定

43.属于下消化道内镜检查禁忌证的是

A.原因不明的腹泻

B.肠道炎性疾病的诊断

C.结肠癌肿的术前诊断

D.急性弥漫性腹膜炎

E.需做结肠息肉摘除术者

44.组成肺容量的肺容积至少有

A.1 个

B.2 个

C.3 个

D.4 个

E.5 个

45.属于转移性骨肿瘤描述的是

A.骨端的囊性膨胀性骨破坏区

B.骨膜新生骨的再破坏

C.骨髓腔内不规则的骨破坏

D.混合型最多见

E.溶骨型最为多见

46.下列属肺癌性空洞 X 线特点的是

A.蜂窝状影

B.空洞内多有液面

C.薄壁空洞

D.洞壁多厚薄不规则

E.虫蚀样空洞

47.胃肠道穿孔最多见于

A.胃或十二指肠

B.小肠

C.大肠

D.小肠与大肠

E.以上都不是

48.左心室明显增大见于

- A.单纯二尖瓣狭窄
- B.慢性肺源性心脏病
- C.心包积液
- D.主动脉瓣关闭不全
- E.以上都不是

49.诊断骨折最常用、最基本的方法是

- A.CT
- B.MRI
- C.X 线
- D.以上都是
- E.以上均非

50.不属于常用描述药物作用的剂量包括

- A.最快有效量
- B.无效量
- C.最大有效量
- D.最小有效量
- E.治疗量

51.吗啡的外周作用是

- A.松弛胃肠道平滑肌
- B.促进肠道腺体分泌
- C.收缩膀胱括约肌



D.收缩外周血管引起血压升高

E.收缩脑血管引起颅内压降低

52.苯海索治疗帕金森病的机制是

A.补充纹状体中多巴胺的不足

B.激动多巴胺受体

C.兴奋中枢胆碱受体

D.阻断中枢胆碱受体

E.抑制多巴脱羧酶活性

53.首选药物为苯妥英钠的癫痫是

A.癫痫单纯部分性发作

B.癫痫大发作

C.癫痫复杂部分性发作

D.癫痫持续状态

E.癫痫失神小发作

54.下列关于苯二氮（苄卓）类药物的临床应用，不正确的是

A.头昏、嗜睡

B.焦虑

C.术前患者的恐惧、不安

D.癫痫持续状态

E.破伤风惊厥

55.下列疾病中，不属于肾上腺素临床应用的是

A.心脏骤停

B.局部止血

C.过敏性休克

D.支气管哮喘

E.房室传导阻滞

56.患者神志不清，两侧瞳孔呈针尖样大小，呼吸有大蒜臭味，应首先考虑的是

A.急性安眠药物中毒

B.急性毒草中毒

C.急性有机磷农药中毒

D.亚硝酸盐中毒

E.一氧化碳中毒

57.传染病常见的症状和体征不包括

A.发热

B.贫血

C.发疹

D.毒血症

E.单核-巨噬细胞系统反应

58.治疗休息痢首选方药为

A.胃苓汤

B.芍药汤

C.连理汤

D.白头翁汤

E.真人养脏汤



正保医学教育网

www.med66.com

59.肾综合征出血热原发性休克发生于病程的

- A.1~3 天
- B.2~5 天
- C.3~7 天
- D.4~8 天
- E.5~7 天

60.流脑典型脑脊液外观是

- A.混浊
- B.毛玻璃样
- C.绿色脓样
- D.脓样
- E.血水样

61.乙型肝炎的易感人群是

- A.人群普遍易感
- B.抗 HAV 阴性者
- C.抗 HBs 阴性者
- D.青壮年男性

E.与 HBV 同时感染

62.认识过程不包括

- A.感觉
- B.知觉
- C.记忆



D.联想

E.注意

63.睡眠中的异常行为包括

A.夜惊

B.梦游症

C.睡行症

D.机体不自主跳动

E.以上都是

64.神经症性障碍的临床表现不包括

A.焦虑

B.恐怖

C.强迫

D.妄想

E.疑病

65.下列行政处罚的种类中不包括

A.警告

B.罚款

C.吊销许可证

D.开除

E.吊销执照

66.医疗单位供应和调配毒性药品，凭医师签名的正式处方每次处方剂量不得超过

A.1 日极量

B.2 日极量

C.3 日极量

D.4 日极量

E.5 日极量

67.下列各项中属于二级医疗事故的是

A.造成患者死亡、重度残疾

B.造成患者明显人身损害的其他后果

C.造成患者重度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍

D.造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍

E.造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍

68.创办了世界上第一所护士学校的是

A.希波克拉底

B.阿维森纳

C.塞尔维特

D.南丁格尔

E.野口英世

69.下列不属于会诊的道德要求的是

A.一切从维护患者利益出发

B.经治医师应客观陈述患者的状况

C.尊重科学

D.学术面前人人平等

E.密切联系，加强协作

70.下列属于道家养生思想的是

- A.仁者寿
- B.智者寿
- C.欲而不贪
- D.天行健，君子以自强不息
- E.保养精气、顺乎自然、气功修炼

## 二、B 型题

**答题说明：**以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

- 1.A.痛势较缓，绵绵作痛
  - B.冷痛沉重，阴雨天加重
  - C.痛如针刺，固定不移
  - D.胀满疼痛
  - E.重痛，活动受限
- (1) 肾虚腰痛的特点为
- (2) 肝气犯胃所致胃脘痛的特点为
- 2.A.发热恶寒，无汗，头身痛，咳嗽
  - B.形体消瘦，口燥咽干，两颧潮红，五心烦热
  - C.时冷时热来去不定，胸胁苦满，不欲食
  - D.畏寒肢冷，口淡不渴，小便清长，大便稀薄
  - E.发热恶风，咽喉肿痛，鼻塞流涕，咳嗽

(1) 阴虚证的症状表现是

(2) 阳虚证的症状表现是

3.A.风热犯肺证

B.燥邪犯肺证

C.热邪壅肺证

D.肺阴虚证

E.肝火犯肺证

(1) 咳嗽，痰少而黄，发热，微恶寒，多见于

(2) 咳嗽，痰黄稠，面红，胸肋灼痛，多见于

4.A.心火亢盛

B.热盛伤津

C.肾气不固

D.肝郁犯脾

E.气虚失运

(1) 排尿不畅，且伴有急迫、疼痛、灼热感属于

(2) 小便之后点滴不净属于

5.A.表证

B.病轻易治

C.阴证

D.病趋重危

E.阳证

(1) “望色十法”中的“泽”主

(2) “望色十法”中的“天”主

6.A.消化性溃疡

B.肝硬化门静脉高压

C.再生障碍性贫血

D.急性传染病

E.急性胃黏膜病变

(1) 黑便伴慢性、周期性、节律性上腹痛，最可能的诊断是

(2) 黑便伴脾肿大，最可能的诊断是

7.A.肌张力正常

B.肌张力减低

C.肌张力缺失

D.折刀样肌张力过高

E.铅管样肌张力过高

(1) 锥体束损害时肌张力的变化是

(2) 锥体外系损害时肌张力的变化是

8.A.丙氨酸氨基转移酶 (ALT)

B.碱性磷酸酶 (ALP)

C.天冬氨酸氨基转移酶 (AST)

D.肌酸激酶 (CK)

E.乳酸脱氢酶 (LDH)

(1) 急性病毒性肝炎时，血清中显著升高的酶是

(2) 胆道结石时，血清中显著增高的酶是



- 9.A.代偿间歇不完全
- B.可见逆行性 P'波
- C.T 波方向与 QRS 主波方向相反，其前可见 P'波
- D.完全性代偿间歇
- E.QRS 波群时间 $\geq 0.12s$

(1) 房性期前收缩的心电图特点是

(2) 室性期前收缩的心电图特点是

- 10.A.实变区密度较低呈毛玻璃样
- B.左上缘影呈直线状斜向外下方
- C.右上肺与肺门部形成“S”状影
- D.肺内有多发的薄壁空腔
- E.肺内有多发的肿块影

(1) 弥漫性肺癌的征象为

(2) 右上中心型肺癌的 X 线表现为

- 11.A.氢氯噻嗪
- B.呋塞米
- C.甘露醇
- D.高渗葡萄糖
- E.螺内酯

(1) 尿崩症患者宜选用的药物是

(2) 轻度高血压患者宜选用的药物是

- 12.A.伤寒

B.肾综合征出血热

C.流行性乙型脑炎

D.中毒型痢疾

E.急性病毒性肝炎

(1) 治疗总的原则是“三早一就”的疾病为

(2) 出现“三痛症”和“三红征”的疾病为

13.A.没有原因地担忧未来

B.无法抑制地想一个问题

C.不能客观地看待客观事物

D.不遵守社会规范

E.情绪低落、自我评价低，主动意识下降

(1) 焦虑症的主要特点是

(2) 强迫症的主要特点是

14.A.警告

B.管制

C.拘役

D.罚金

E.没收财产

(1) 行政处分的种类有

(2) 行政处罚的种类有

15.A.张仲景

B.孙思邈

C.钱乙

D.陈实功

E.徐大椿

(1) 医术精湛，屡愈危证的北宋医学家是

(2) 在《外科正宗》一书中提出了医生的“十要”和“五戒”的医学家是

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

**扫描二维码去做题**



《专业知识》仿真密卷

一、A1 型题

**答题说明：**以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1.治疗慢性肺源性心脏病痰热郁肺证选用的方药是

- A.涤痰汤
- B.苏子降气汤
- C.越婢加半夏汤
- D.真武汤合五苓散
- E.沙参麦冬汤合五味消毒饮

2.在肺癌的组织分型中，最为常见的是

- A.中央型肺癌
- B.腺癌
- C.鳞癌
- D.大细胞癌
- E.小细胞癌

3.下列哪项不符合慢性呼吸衰竭

- A.明显发绀
- B.智力或定向功能障碍
- C. $\text{PaO}_2 < 80\text{mmHg}$
- D. $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- E.pH7.45

4.肺结核气阴耗伤证，治疗应首选的方剂是

- A.保真汤
- B.生脉饮
- C.增液汤
- D.沙参麦冬汤
- E.石斛夜光丸

5.确诊肺结核最特异的方法是

- A.血沉
- B.结核分枝杆菌检查
- C.X 线检查
- D.结核菌素检查
- E.纤维支气管镜

6.治疗原发性支气管肺癌中医证型之气阴两虚证选用的治法为

- A.活血散瘀，行气化滞
- B.祛湿化痰，清热解毒
- C.养阴清热，解毒散结
- D.益气养阴，化痰散结
- E.益气养阴，回阳固脱

7.哮病的病变脏腑是

- A.病位在肺，与脾、肾密切相关
- B.病位在肺，与脾、肾、肝密切相关
- C.病位在肺，与脾、肾、肝、心密切相关

- D.病位在气道，与肺、脾、肾密切相关
- E.病位在气道，与肺、脾、肾、肝密切相关
- 8.心肺复苏最后成败的关键是
- A.脑复苏
- B.恢复有效心律
- C.保护脑组织
- D.建立人工循环
- E.维持血压
- 9.心脏瓣膜病二尖瓣狭窄中，最常见的病因为
- A.风湿热
- B.腱索过长
- C.二尖瓣脱垂
- D.乳头肌脓肿
- E.乳头肌坏死
- 10.急性心肌梗死与心绞痛的临床表现，主要鉴别点是
- A.疼痛的部位
- B.疼痛持续时间长短
- C.疼痛的性质
- D.疼痛的程度
- E.是否合并休克
- 11.治疗慢性心力衰竭气阴亏虚首选
- A.养心汤合补肺汤

- B.生脉散合酸枣仁汤
- C.三子养亲汤合真武汤
- D.人参养荣汤合桃红四物汤
- E.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合金匱肾气丸

12.下列不属主动脉内球囊反搏的禁忌症的是

- A.存在严重的外周血管疾病
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.严重血小板缺乏
- D.活动性出血
- E.心肌缺血伴顽固性肺水肿

13.缓慢性心律失常之气阴两虚证首选

- A.桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- B.参附汤合真武汤
- C.炙甘草汤
- D.涤痰汤
- E.血府逐瘀汤

14.长期高血压伴顽固性低血钾首先应考虑

- A.皮质醇增多症
- B.继发于慢性肾炎的高血压
- C.原发性醛固酮增多症
- D.肾动脉狭窄
- E.嗜铬细胞瘤

15.病毒性心肌炎的发病关键是

- A.素体虚弱
- B.气阴两虚
- C.湿毒上犯
- D.热毒攻心
- E.正气不足，邪毒侵心

16.慢性胃炎主要病理学特征是

- A.炎症，萎缩，异常增生
- B.萎缩，化生，异常增生
- C.炎症，萎缩和肠化生
- D.萎缩和化生
- E.以上均不是

17.目前普查原发性肝癌的主要诊断指标是

- A.超声波检查
- B.甲胎球蛋白放射免疫测定
- C.放射性核素扫描
- D.肝功能检查
- E.X 线检查

18.消化性溃疡最常见的并发症是

- A.急性穿孔
- B.上消化道出血
- C.穿透



D.癌变

E.幽门梗阻

19.以下不是胃癌主要转移方式的是

A.直接蔓延

B.腹腔内种植

C.血行转移

D.胃肠道播散

E.淋巴转移

20.临床怀疑患者的上消化道出血是由于胃炎所导致，为了确诊，合适的检查方法是

A.粪便隐血试验

B.急诊胃镜检查

C.吞钡试验

D.剖腹探查

E.腹腔镜检查

21.治疗溃疡性结肠炎肝郁脾虚证首选

A.四神丸

B.芍药汤

C.痛泻要方

D.参苓白术散

E.膈下逐瘀汤

22.肝硬化食道静脉曲张破裂大出血并休克时，首选治疗为

A.输血

B. 升压

C. 止血

D. 补充液体

E. 人工冬眠

23. 肝硬化患者出血倾向的最主要原因是

A. 毛细血管脆性增加

B. 凝血因子合成障碍

C. 维生素 K 缺乏

D. 肝脏解毒功能不良而致毒性反应

E. 血小板功能不良

24. 肾病综合征所表现的水肿最易损伤五脏中哪些脏器

A. 心、肝、肾

B. 肾、肺、脾

C. 肺、脾、心

D. 肝、肾、脾

E. 心、肝、脾

25. 治疗急性膀胱炎推荐使用

A. 青霉素

B. 复方磺胺甲恶唑

C. 链霉素

D. 氟霉素

E. 四环素

26. 尿路感染最常见于

- A. 学龄前儿童
- B. 青壮年男性
- C. 中老年男性
- D. 育龄期妇女
- E. 中老年妇女

27. 下列哪项说法是正确的

- A. 血液透析能够代替内分泌和代谢功能
- B. 腹膜透析可以代替代谢功能但不能代替内分泌功能
- C. 肾脏移植不能够代替内分泌和代谢功能
- D. 血液透析不能替代内分泌但能替代代谢功能
- E. 肾脏移植能够代替内分泌和代谢功能

28. 下列不属于急性肾衰竭病因的是

- A. 血容量增多
- B. 肾缺血
- C. 肾毒性物质损伤肾小管上皮细胞
- D. 急性尿路梗阻
- E. 肾内血流动力学改变

29. 急性肾衰竭病人由少尿期进入多尿期，尿量超过

- A. 300ml
- B. 400ml
- C. 500ml

D.250ml

E.350ml

30.用于鉴别肾前性急性肾衰和急性肾小管坏死的是

A.尿常规

B.肾衰指数

C.尿渗透浓度

D.影像学检查

E.肾穿刺活检

31.再生障碍性贫血血象和骨髓象的特点是

A.全血细胞减少，少数呈两系细胞或血小板减少

B.细胞大小不等，中心淡染区扩大

C.可见巨核细胞增多，血片中血小板计数减少，可见畸形血小板

D.粒细胞停滞于早幼粒阶段，细胞质中颗粒粗大

E.骨髓增生活跃，但巨核细胞减少

32.下列各项，不属于再生障碍性贫血中医证型的是

A.肾阴亏虚

B.肾虚血瘀

C.气血两虚

D.热毒壅盛

E.脾肾阳虚

33.下列疾病，可见骨髓巨核细胞减少的是

A.血友病

B.缺铁性贫血

C.原发性免疫性血小板减少症

D.再生障碍性贫血

E.巨幼细胞贫血

34.特发性血小板减少性紫癜的首选治疗是

A.抗纤溶药物

B.免疫抑制剂

C.糖皮质激素

D.脾切除

E.氨肽素

35.治疗特发性血小板减少性紫癜之血热妄行证的首选方剂是

A.清营汤

B.茜根散

C.犀角地黄汤

D.玉女煎

E.清瘟败毒饮

36.脾切除对溶血性贫血疗效最好的是

A.镰形细胞性贫血

B.阵发性睡眠性血红蛋白尿

C.海洋性贫血

D.遗传性球形红细胞增多症

E.红细胞 6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏症

37.下列各项，不符合溶血性贫血的表现是

- A.网织红细胞增加
- B.骨髓幼红细胞增加
- C.尿中尿胆原排泄增加
- D.血中非结合胆红素增加
- E.血清结合珠蛋白增加

38.下列各项中，属于正常骨髓造血功能受抑制的表现是

- A.发热
- B.淋巴结肿大
- C.肝脾大
- D.关节疼痛
- E.眼球突出

39.急性白血病易发生感染，主要原因是

- A.白血病细胞增多
- B.继发性营养不良
- C.成熟粒细胞缺乏
- D.长期贫血导致机体抵抗力下降
- E.骨髓造血功能衰竭

40.痛风诊断的金标准为

- A.血尿酸测定
- B.尿尿酸测定
- C.滑囊液检查

D.X 线检查

E.超声检查

41.胰岛素的主要不良反应是

A.过敏反应

B.屈光不正

C.低血糖反应

D.胰岛素性水肿

E.注射部位脂肪营养不良

42.中度高渗性失水，失水量相当于体重的

A.2% ~ 3%

B.3% ~ 4%

C.4% ~ 6%

D.6% ~ 7%

E.7% ~ 8%

43.不属甲亢主要临床表现的是

A.眼征

B.甲状腺危象

C.高代谢症候群

D.弥漫性甲状腺肿

E.胫前黏液性水肿

44.类风湿关节炎发病的内在因素是

A.湿热痹阻

- B.阴虚内热
- C.正气虚弱
- D.痰瘀互结，经脉痹阻
- E.肝肾亏损，邪痹筋骨

45.治疗血管性痴呆髓海不足证首选的方剂是

- A.洗心汤
- B.还少丹
- C.七福饮
- D.通窍活血汤
- E.知柏地黄丸

46.腔隙性梗死最有效的检查手段是

- A.CT
- B.MRI
- C.PET
- D.SPECT
- E.脑电图

47.治疗帕金森病之血瘀动风证首选的方剂是

- A.大定风珠
- B.补阳还五汤
- C.导痰汤
- D.天麻钩藤饮
- E.地黄饮子



48.治疗脑血栓形成之阴虚风动证首选的方剂是

- A.镇肝熄风汤
- B.补阳还五汤
- C.星萎承气汤
- D.通窍活血汤
- E.真方白丸子

49.关于急性脑血管病的中医范畴叙述错误的是

- A.头痛
- B.晕厥
- C.痫证
- D.厥证
- E.中风病

50.急性脑出血脑疝形成时不可以

- A.静脉注射甘露醇
- B.腰椎穿刺
- C.给氧
- D.吸痰
- E.翻身

51.短暂性脑缺血发作发生发展的核心是

- A.阴虚
- B.血瘀
- C.气虚

D.阳虚

E.痰凝

52.治疗癫痫之瘀阻脑络证首选的方剂是

A.定痫丸

B.龙胆泻肝汤

C.涤痰汤

D.通窍活血汤

E.归脾汤

53.血管性痴呆的直接原因是

A.动脉硬化

B.心脏病

C.糖尿病

D.高血压

E.卒中

54.诊断中毒的重要依据是

A.毒物接触史

B.不明原因的昏迷

C.难以解释的精神改变

D.年轻患者不明原因的心律失常

E.不明原因的心脏骤停

55.急性有机磷杀虫药中毒，治疗时最理想的合用药是

A.呼吸兴奋剂合脱水剂

- B.脱水剂合肾上腺皮质激素
- C.肾上腺皮质激素合阿托品
- D.阿托品合胆碱酯酶复活剂
- E.胆碱酯酶复活剂合肾上腺皮质激素

56.减轻毒蕈碱样症状的药物是

- A.氯磷定
- B.阿托品
- C.碘解磷定
- D.双复磷
- E.双解磷

57.急性 CO 中毒最有价值的诊断指标是

- A.血 COHb 浓度
- B.血气分析
- C.脑电图
- D.心电图检查
- E.头部 CT

58.现代机械通气技术的绝对禁忌症是

- A.气胸
- B.肺实质病变
- C.心源性肺水肿
- D.纵隔气肿
- E.以上均不是

59.原发性肝癌最有效的治疗方法是

- A.放射治疗
- B.免疫治疗
- C.抗癌药物局部治疗
- D.冷冻治疗
- E.手术治疗

60.肝硬化患者出现全血细胞减少，最主要的原因是

- A.营养吸收障碍
- B.上消化道出血
- C.脾功能亢进
- D.血容量增加
- E.肝肾综合征

61.V<sub>1</sub>-V<sub>3</sub>出现异常 Q 波，ST 段抬高提示

- A.急性前间壁心肌梗死
- B.急性局限前壁心肌梗死
- C.急性前侧壁心肌梗死
- D.急性广泛前壁心肌梗死
- E.急性正后壁心肌梗死

62.右心衰竭的临床表现主要是由于

- A.心搏出量减少，周围器官供血不足
- B.体循环静脉淤血
- C.毛细血管通透性增高

D.阻力血管收缩

E.醛固酮增高使血容量增加

63.治疗甲亢手术的方式主要是

A.休息

B.化疗

C.甲状腺全切

D.<sup>131</sup>I 放射性治疗

E.甲状腺次全切除术

64.肺癌痰湿毒蕴证，治疗首选的方剂是

A.导痰汤

B.涤痰汤

C.苍附导痰丸

D.二陈丸

E.清气化痰丸

## 二、B 型题

**答题说明：**以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

1.A.涤痰汤合安宫牛黄丸

B.生脉饮

C.补天大造丸

D.百合固金汤

E.补肺汤合参蛤散

- (1) 呼吸衰竭肺肾气虚证，治疗首选方剂是
- (2) 呼吸衰竭痰蒙神窍证，治疗首选方剂是

2.A.异烟肼

B.利福平

C.链霉素

D.吡嗪酰胺

E.乙胺丁醇

- (1) 杀灭结核菌的机制在于抑制菌体的 RNA 聚合酶，从而阻碍 mRNA 的合成的药物是
- (2) 具有杀菌作用强、价格低廉、副作用少等优点的抗结核药物是

3.A.生脉散

B.安神定志丸

C.天王补心丹

D.归脾汤

E.桃仁红花煎

- (1) 治疗快速性心律失常的心血不足证，应首选的方剂是
- (2) 治疗快速性心律失常的气阴两虚证，应首选的方剂是

4.A.黄芪建中汤

B.活络效灵丹合丹参饮

C.一贯煎合芍药甘草汤

D.益胃汤

E.柴胡疏肝散合五磨饮子

(1) 消化性溃疡肝胃不和证治宜

(2) 消化性溃疡胃阴不足证治宜

5.A.黏液血便

B.大便的次数和便血程度

C.腹痛程度

D.腹胀

E.肠外表现

(1) 溃疡性结肠炎活动期的重要表现是

(2) 反映溃疡性结肠炎病情轻重的是

6.A.上消化道出血

B.肝性脑病

C.自发性腹膜炎

D.原发性肝癌

E.肝肾综合征

(1) 肝硬化患者最常见的并发症是

(2) 肝硬化患者最严重的并发症是

7.A. > 5ml

B. 50 ~ 100ml

C. 250 ~ 300ml

D. 400 ~ 500ml

E. > 1000ml

(1) 上消化道出血患者出现呕血，估计其出血量为

(2) 上消化道出血患者出现黑便，估计其出血量为

8.A.烟酸

B.HMG-CoA 还原酶抑制剂

C.洛伐他汀

D.非诺贝特

E.阿西莫司

(1) 治疗高胆固醇血症，应首选的药物是

(2) 治疗混合型血脂异常以 TG 增高为主，应首选的药物是

9.A.磺脲类

B.双胍类

C.α-糖苷酶抑制剂

D.噻唑烷二酮

E.非磺脲类胰岛素促泌剂

(1) 具有延缓小肠葡萄糖吸收、降低餐后血糖作用的药物类别是

(2) 具有促进胰岛素释放、增强靶组织细胞对胰岛素的敏感性的药物类别是

10.A.逍遥散

B.龙胆泻肝汤

C.天王补心丹

D.生脉散

E.二陈汤

(1) 治疗甲状腺功能亢进症肝火旺盛证，应首选的方剂是

(2) 治疗甲状腺功能亢进症阴虚火旺证，应首选的方剂是



11.A.尿糖

B.糖化血红蛋白

C.糖化血浆白蛋白

D.空腹血糖

E.餐后血糖

(1) 可反映患者近 8~12 周总的血糖水平的指标是

(2) 可反映患者近 2~3 周总的血糖水平的指标是

12.A.桂枝芍药知母汤

B.丁氏清络饮

C.四妙丸

D.身痛逐瘀汤

E.指迷茯苓丸

(1) 治疗类风湿关节炎寒热错杂证，应首选的方剂是

(2) 治疗类风湿关节炎阴虚内热证，应首选的方剂是

13.A.脑脊液检查

B.脑电图检查

C.脑血管造影

D.磁共振成像

E.颅脑 CT 检查

(1) 蛛网膜下腔出血首选的检查是

(2) 确诊癫痫最适合的检查是

14.A.导痰汤

B.补阳还五汤

C.大定风珠

D.地黄饮子

E.八珍汤合天麻钩藤饮

(1) 帕金森病气血两虚证，治疗应首选的方剂是

(2) 帕金森病阴阳两虚证，治疗应首选的方剂是

15.A.基底动脉尖综合征

B.延髓背外侧综合征

C.闭锁综合征

D.Weber 综合征

E.Benedict 综合征

(1) 以中脑病损为主要表现的是

(2) 脑干梗死中最常见的类型是

16.A.额叶出血

B.顶叶出血

C.颞叶出血

D.枕叶出血

E.脑桥出血

(1) 以前额痛，呕吐，痫性发作为主要表现的脑出血疾病是

(2) 以对侧同向性偏盲，并有黄斑回避现象的脑出血疾病是

17.A.局灶性癫痫

B.梅尼埃病

C.心脏疾病

D.发作性睡病

E.颅内肿瘤

(1) 常表现为持续数秒至数分钟的肢体抽搐，从躯体的一处开始并向周围扩散的疾病是

(2) 以发作性眩晕、恶心、呕吐为主要表现，但每次发作持续时间往往超过 24 小时的疾

病是

18.A.莨菪碱类中毒

B.蛇毒

C.有机磷类农药

D.甲醇中毒

E.一氧化碳中毒

(1) 瞳孔扩大可见于的急性中毒是

(2) 瞳孔缩小可见于的急性中毒是



每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

**扫描二维码去做题**



《专业实践能力》仿真密卷

一、A2 型题

**答题说明：**以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1.患者，男，70 岁。既往有慢性支气管炎病史 30 余年。现症见咳嗽气短，痰涎清稀，反复易感，倦怠懒言，自汗畏寒，舌苔淡白，脉细弱。其中医治法应为

- A.补肺益气，化痰止咳
- B.补肺健脾，止咳化痰
- C.补肺益肾，纳气平喘
- D.滋阴补肺，润肺止咳
- E.温肺化饮，散寒止咳

2.患者，男，40 岁。诊断为支气管扩张症，现症见：咳嗽阵阵，反复痰中带血，胸肋胀痛，烦躁不安，口干苦，大便干结，舌质红，苔薄黄少津，脉弦数。其方药是

- A.清金化痰汤合金苇茎汤
- B.黛蛤散合泻白散
- C.百合固金汤
- D.补肺汤
- E.清金化痰汤合膈下逐瘀汤

3.患者男性，48 岁。刺激性咳嗽 3 个月，伴痰中带血，持续体重下降，发热。X 线示左肺门类圆形阴影，边缘毛糙。应首先考虑的诊断是

- A.肺脓肿
- B.肺门淋巴结结核

C.肺良性肿瘤

D.支气管肺癌

E.结核球

4.患者，男，67岁。既往慢性肺心病病史6年。现呼吸道感染原有症状、体征加重，因睡眠障碍服用镇静剂3天后，出现精神恍惚，烦躁不安。可能出现的并发症是

A.消化道出血

B.心律失常

C.肺性脑病

D.休克早期

E.酸碱平衡失调

5.患者，男，25岁，3天前就诊，诊断为肺炎。现症见咳嗽气促，痰声辘辘，烦躁，神昏谵语，高热不退，舌红绛，苔黄干，脉细滑数。治法为

A.疏风清热，宣肺止咳

B.清热化痰，宽胸止咳

C.清热解毒，化痰开窍

D.益气养阴，润肺化痰

E.解表散寒，清泄里热

6.患者男性，52岁。支气管肺癌手术及化疗后，咳嗽无力，有痰，痰中带血，神疲乏力，时有心悸，汗出气短，口干，纳呆腹胀，便干，舌质红苔薄，脉细数无力。其中医证型是

A.气滞血瘀证

B.痰湿毒蕴证

C.阴虚毒热证

D.气阴两虚证

E.痰瘀互结证

7.患者男性，38岁。患风湿性心脏病多年，近日活动后心悸气短加重，倦怠乏力，头晕目眩，面色无华，动则汗出，夜寐不宁，口干，舌质红，苔薄白，脉细数无力。其治疗应首选的方剂是

A.独参汤合桃仁红花煎

B.炙甘草汤

C.参附汤合五苓散

D.真武汤合葶苈大枣泻肺汤

E.参附汤合生脉散

8.患者，男，64岁。患急性心肌梗死，心胸剧痛，持续难解，心悸气短，神疲乏力，自汗盗汗，手足心热，口渴心烦，面色苍白，舌质紫暗，脉细数无力。其治法是

A.益气温阳，宣痹散寒

B.益气养阴，祛痰开窍

C.益气温阳，活血通络

D.益气活血，祛瘀通络

E.益气温阳，祛痰活血

9.患者男性，64岁。因急性心梗入院，入院后3天，于心尖部出现3/6收缩期中晚期吹风样杂音，使用纠正心衰的药物效果很差而死亡。最可能的诊断为心肌梗死并发

A.室间隔穿孔

B.急性肺心病

C.梗死后综合征

D.二尖瓣乳头肌断裂

E.心室游离壁破裂

10.患者，女，74岁。有慢性心力衰竭5年。现症见心悸，气短，肢倦乏力，动则加剧，神疲咳喘，面色苍白，舌淡，脉沉细。治法为

A.补益心肺

B.益气养阴

C.益气活血

D.益气温阳

E.温补心肾

11.患者，女性，56岁。心悸失眠1月余。思虑过度则见心悸，眩晕，失眠，多梦，食少，体倦乏力，面色无华，舌淡，脉细弱。其中医证型是

A.肝气乘脾

B.心血不足

C.心神不宁

D.心肾不交

E.肝火犯胃

12.患者女性，36岁。心悸反复发作1年，每次发作持续时间约半小时，心电图示：QR波正常，心率为200次/min，P波不明显。应首先考虑的诊断是

A.窦性心动过速

B.室性心动过速

C.心房扑动

D.心房颤动

E.阵发性室上速

13.患者，男，50岁。反复右肋肋疼痛10年。现症见肋下痞块坚实，痛定不移，脘腹胀满，面目晦暗，肌肤甲错，高热烦渴，小便黄赤，大便干黑。舌红有瘀斑，苔黄腻，脉弦数。实验室检查：血清AFP阳性，定量检查 $>900\mu\text{g/L}$ 。诊断为“原发性肝细胞肝癌”。其治法是

A.运脾利湿，化气行水

B.清热利湿，化瘀解毒

C.疏肝理气，活血化瘀

D.理气活血，解毒排脓

E.养阴清热，解毒化瘀

14.患者，男，45岁。上腹隐痛，便潜血阳性，钡餐见胃窦小弯侧黏膜纹理紊乱，胃壁僵硬。

首先考虑的是

A.慢性胃炎

B.胃溃疡

C.胃癌

D.胃淋巴瘤

E.萎缩性胃炎

15.患者，男，70岁。其上腹部规律性隐痛2个月，1小时前呕咖啡样物150ml，排出柏油样便300ml来诊。患者无肝病史。查体：血压90/60mmHg，心率110次/分，上腹部轻度压痛，肝脾肋下未触及。血红蛋白90g/L。其止血措施最好选择

A.维生素K静脉滴注

B.奥美拉唑静注

C.6-氨基己酸静脉滴注



D.三腔两囊管压迫

E.垂体后叶素静脉滴注

16.患者，女，35岁，慢性胃炎病史6年。现胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治法为

A.疏肝理气，和胃止痛

B.化痰通络，和胃止痛

C.清利湿热，醒脾化浊

D.养阴益胃，和中止痛

E.健脾益气，温中和胃

17.患者，男，32岁，昨晚与朋友聚餐吃烤串，饮酒，回家后即出现全腹疼痛，痛而拒按，伴发热，于当地医院就诊，急查血淀粉酶800U，现口苦而干，脘腹胀满，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。中医治疗首选方剂为

A.清胰汤合龙胆泻肝汤

B.大承气汤

C.柴胡疏肝散

D.归脾汤

E.泻心汤

18.患者男性，42岁。饮酒后持续性上腹疼痛10小时，向腰背部放射，伴恶心，呕吐，发热，无血尿。应首选的检查是

A.血淀粉酶

B.血常规

C.血清脂肪酶

D.尿淀粉酶

E.AFP

19.患者，男，65岁。患肾病综合征。起始眼睑浮肿，继则四肢、全身亦肿，皮肤光泽，按之凹陷易恢复，伴发热、咽痛、咳嗽、小便不利，舌苔薄白，脉浮。辨证为

A.风水相搏证

B.湿毒浸淫证

C.水湿浸渍证

D.脾虚湿困证

E.肾阳衰微证

20.患者，男，45岁。慢性肾炎12年，现面浮肢肿，身热汗出，口干不欲饮，胸脘痞闷，腹部胀满，纳差，尿黄短少，便溏，舌红，苔黄腻，脉滑数。其中医治法是

A.益气养阴

B.活血化瘀

C.健脾化湿

D.清热利湿

E.温补脾肾

21.患者，男，57岁。有慢性肾衰竭病史5年。现头晕头痛，耳鸣眼花，两目干涩，口干咽燥，腰膝酸软，大便易干，尿少色黄，舌淡红少津，苔薄白，脉弦。血压升高达160/92mmHg。

治疗应首选

A.六味地黄丸

B.金匱肾气丸

C.杞菊地黄汤

D.龙胆泻肝汤

E.全鹿丸

22.患儿，男，6岁。因血尿、眼睑浮肿、高血压被诊断为肾炎。现症见发热而不恶寒，咽喉疼痛，口干口渴，头面浮肿，尿少色赤，舌质红，苔薄黄，脉浮数。治疗宜选

A.越婢加术汤加减

B.麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮加减

C.麻黄汤合五苓散加减

D.五皮饮合五苓散加减

E.防己黄芪汤加减

23.患者再生障碍性贫血病史，症见：面色晦暗，心悸气短，周身乏力，腰膝酸软，肌肤甲错，舌质紫暗、有瘀点，脉细，其中医证型是

A.气血两虚

B.肾阴亏虚

C.阴阳两虚

D.肾虚血瘀

E.气阴两虚

24.患儿女性，7岁。发热、流涕1周后突然出现鼻出血，全身瘀点、瘀斑，脾大，血小板

$20 \times 10^9/L$ ，凝血时间正常，PT正常，骨髓象示增生活跃，巨核细胞增多，幼稚巨核细胞

0.50，产血小板型巨核细胞缺少。其首选的治疗药物是

A.糖皮质激素

B.脾切除

C.免疫抑制剂

D.达那唑

E.氨肽素

25.患者女性，30岁。发热寒战，轻度黄疸，脾肋下3cm，血红蛋白70g/L；网织红细胞9%，血清铁1200μg/L，肝功能正常，Ham试验阴性，Coombs试验阳性，诊断应考虑为

A.蚕豆病

B.阵发性睡眠性血红蛋白尿

C.自身免疫性溶血性贫血

D.肝炎后合并继发性贫血

E.海洋性贫血

26.患者，女，36岁。诊断为缺铁性贫血。现症见：面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，毛发干脱，舌淡胖，苔薄，脉濡细，其辨证是

A.脾胃虚弱证

B.心脾两虚证

C.虫积证

D.脾肾阳虚证

E.心肾不交证

27.患者女性，44岁。近3个月来觉头晕，心慌，气短，伴疲乏无力，逐日加重，无偏食，1年前因溃疡病行胃次全切除术。今查Hb50g/L，RBC $3.0 \times 10^{12}$ /L，网织红细胞0.005，

诊断为缺铁性贫血，其最有可能的病因是

A.铁摄入不足

B.铁需要量增加

C.慢性失血

D.铁吸收不良

E.铁利用障碍

28.女性患者，诊断为急性白血病，现症见壮热，口渴汗多，烦躁，头痛面赤，身痛，口舌生疮，面颊肿胀疼痛，舌红，苔黄，脉大，其治疗首选的方剂是

A.犀角地黄汤

B.茜根散

C.黄连解毒汤合清营汤

D.葛根芩连汤

E.清营汤

29.患者，女，35岁。肢体关节重着，肿胀疼痛，肌肤麻木，阴雨天加重，舌苔薄白，脉弦紧。诊断为痛风，治疗应首选

A.大秦苳汤

B.蠲痹汤

C.宣痹汤

D.双合汤

E.白虎加桂枝汤

30.患者，男性，50岁，身高180cm，体重68kg。患2型糖尿病1年，经饮食控制、体育锻炼，血糖未达到理想水平。治疗方案首选

A.格列齐特

B.二甲双胍

C.胰岛素

D.胰岛素、二甲双胍

E.格列本脲、二甲双胍

31.患者，男，18岁。多饮、多食、多尿5年，曾酮症酸中毒史，现空腹血糖12.0mmol/L。

其最佳治疗方案是饮食疗法加

A.运动疗法

B.磺脲类降糖药

C.胰岛素

D.二甲双胍

E.噻唑烷二酮

32.患者，女，20岁。颈前肿胀5个月，伴眼突，烦躁易怒，手指颤抖，多汗，面红目赤，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选

A.龙胆泻肝汤

B.逍遥散

C.天王补心丹

D.柴胡疏肝散

E.镇肝息风汤

33.男性，40岁，体重60kg，因食管癌进食困难月余，主诉：乏力、极度口渴、尿少而色深。检查：血压、体温均正常，眼窝凹陷、舌干燥、皮肤弹性差，补液后口渴减轻，尿量增多，测血清钾浓度为3.1mmol/L，应在尿量达下列哪项指标时补给钾盐

A.20ml/h

B.25ml/h

C.30ml/h

D.35ml/h

E.40ml/h

34.患者男性，21 岁。参加野外训练中出现恶心、呕吐，皮肤苍白、湿冷、麻木，心音减弱，心率 56 次/min，急查心电图：PR 间期延长，P 波消失，QRS 波群渐宽，R 波渐低，S 波渐深，ST 段与 T 波融合。应考虑的诊断是

- A.胃肠炎
- B.高钠血症
- C.低钠血症
- D.低钾血症
- E.高钾血症

35.患者头晕，疲乏无力，恶心呕吐。实验室检查：血清钠 125mmol/L，血清钾 4.5mmol/L，尿比重 1.008。其诊断是

- A.高钾血症
- B.低钾血症
- C.高渗性失水
- D.低渗性失水
- E.等渗性失水

36.患者，女，30 岁。其患类风湿关节炎 1 年，应用甲氨蝶呤治疗。下列说法正确的是

- A.每周剂量为 7.5~25mg，以口服为主，1 日之内服完
- B.本药不可静注或肌内注射
- C.疗程一般为 3 个月
- D.极少引起肝损害
- E.本药不引起胃肠道反应、骨髓抑制等

37.患者，女，55岁。既往有高血压病史10年。患者于日前活动时突然出现口角喎斜，言语不利，四肢无力。头颅CT示：深穿支可见一个直径为7mm圆形腔隙性低密度阴影，边界清晰。应考虑的诊断是

- A.脑出血
- B.癫痫
- C.腔隙性脑梗死
- D.TIA
- E.蛛网膜下腔出血

38.患者，女，78岁。诊断为帕金森病。现症见表情呆钝，肢体振辐大，动作迟缓，肢体拘挛，活动笨拙，头晕目眩。耳鸣健忘，急躁易怒，多梦，腰膝酸软。舌红苔少，脉弦细数。

其中医辨证是

- A.气血两虚证
- B.肝肾阴虚证
- C.风痰阻络证
- D.血瘀动风证
- E.阴阳两虚证

39.患者，男，58岁。有轻度高血压史2年，近来时有右手发麻，今晨醒来时右手活动不灵，站立时右腿无力，随后数小时症状渐加重，意识一直清楚，无其他不适。应首先考虑的诊断

是

- A.脑出血
- B.脑血栓形成
- C.脑栓塞



D.蛛网膜下腔出血

E.短暂性脑出血发作

40.患者男性，59岁。高血压病史15年。现症见：生气后突然出现前额疼痛，呕吐，恶心，伴右侧肢体活动不利。查体：血压：180/100mmHg，体温：37.8℃，眼底出血。头颅CT：脑叶区见高密度影。则最可能的诊断是

A.额叶出血

B.顶叶出血

C.颞叶出血

D.枕叶出血

E.脑桥出血

41.患者，男，28岁。癫痫大发作。眩晕，两目干涩，心烦失眠，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。治疗应首选

A.定痫丸

B.龙胆泻肝汤合涤痰汤

C.六君子汤合归脾汤

D.左归丸合天王补心丹

E.通窍活血汤

42.患者男性，56岁。突发右手无力，言语不利，约半小时后昏迷。查体：浅昏迷，瞳孔等大，直径2mm，血压220/100mmHg，右侧肢体瘫痪，腱反射未引出，右侧Babinski征阳性。头颅CT：左基底核区可见高密度影。其最可能的诊断是

A.脑栓塞

B.蛛网膜下腔出血

C.脑出血

D.脑血栓形成

E.TIA

43.患者，男，30岁。服毒自杀，被发现后急送医院。查体：昏迷状态，呼吸急促，皮肤湿冷，双侧瞳孔如针尖大小。使用阿托品治疗后，提示治疗效果不满意的指标是

A.颜面潮红

B.口干、皮肤干燥

C.心率加快

D.瞳孔大小无变化

E.肺部啰音减少

44.患者女性，54岁，因急性中度一氧化碳中毒、意识障碍入院治疗，经吸氧、支持及对症治疗，患者意识恢复，好转出院，2周后患者突然出现失语、不能站立、偏瘫，大小便失禁。查体：T36.5℃，P85次/分，R16次/分，BP125/70mmHg，双侧病理反射阳性。最

可能的诊断是

A.药物中毒

B.急性脑出血

C.急性一氧化碳中毒迟发脑病

D.急性脑梗死

E.中枢神经系统感染

45.患者28岁，晨卧床不起，人事不省，多汗，流涎，呼吸困难。体检：意识不清，双瞳孔缩小如针尖，双肺布满湿啰音，心率60次/分，肌束震颤，抽搐，首先考虑的诊断是

A.急性有机磷中毒

B.急性安定中毒

C.急性巴比妥中毒

D.急性一氧化碳中毒

E.急性氯丙嗪中毒

46.患者，女，65岁。咳嗽、咯痰8年，近年来出现活动后气短症状，且闻油烟及刺激性气体可使气喘加重，此次感冒后咳喘加重。查体：双肺可闻及哮鸣音和细啰音，血WBC $8.5 \times 10^9/L$ ，N0.74。其治疗首选

A.解痉平喘

B.祛痰止咳

C.控制感染

D.免疫调节剂

E.氧气疗法

47.患者，男，54岁。咳嗽，气促，伴右侧胸痛，咯铁锈痰。查体：BP70/40mmHg，P120次/分，紫绀，神志恍惚，肢冷，右下肺少量湿性啰音。WBC $7.8 \times 10^9/L$ ，中性85%。首先应采取的紧急措施是

A.高流量吸氧

B.静滴血管活性药

C.静滴广谱抗生素

D.静滴糖皮质激素

E.补充血容量

## 二、A3/A4型题

**答题说明：**以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信

息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

1.患者，男，41 岁。3 天前受寒后出现恶寒，发热，咳嗽，呼吸急促，胸闷如塞，喉中有哮鸣声，咯吐不爽，痰稀薄色白，面色晦滞，口淡不渴，面白肢冷，舌苔白滑，脉浮紧。有哮喘病史 20 年。

(1) 应诊断为

- A.肺炎链球菌肺炎
- B.急性支气管炎
- C.支气管哮喘
- D.急性上呼吸道感染
- E.支气管扩张症

(2) 其辨证为

- A.风寒犯肺证
- B.阳虚水泛证
- C.脾虚证
- D.寒哮证
- E.痰浊阻肺证

(3) 本病的治法为

- A.燥湿化痰，降气止咳
- B.温肺散寒，化痰平喘
- C.温肾健脾，化饮利水
- D.健脾化痰

E.疏风散寒，宣肺止咳

(4) 治疗应首选

A.射干麻黄汤

B.三拗汤合止嗽散

C.真武汤合五苓散

D.六君子汤

E.二陈汤合三子养亲汤

(5) 若表寒明显，寒热身疼，可加

A.桂枝、生姜

B.麻黄、葶苈子

C.黄芪、紫苏子

D.干姜、桂枝

E.生姜、荆芥

2.患者男性，68岁。胸闷痛反复发作10余年，突然加重且持续不缓解将近1小时，伴有心悸，大汗出，四肢厥冷，面色唇甲青紫，舌质紫暗，脉沉微欲绝。心电图见V<sub>3</sub>~V<sub>5</sub>导联ST段抬高，血压90/60mmHg，CK-MB80U/L，肌钙蛋白2.2 μg/L。

(1) 其最可能的诊断是

A.急性前间壁心肌梗死

B.急性广泛前壁心肌梗死

C.急性下壁心肌梗死

D.急性前壁心肌梗死

E.急性高侧壁心肌梗死

(2) 其中医治法是

- A. 豁痰活血，理气止痛
- B. 活血化瘀，通络止痛
- C. 益气活血，祛瘀止痛
- D. 益气滋阴，通脉止痛
- E. 回阳救逆，益气固脱

(3) 治疗应首选的方剂是

- A. 补阳还五汤加减
- B. 真武汤加减
- C. 左归丸加减
- D. 参附龙牡汤加减
- E. 右归丸加减

3. 患者，男，40岁。右上腹痛2个月。查体：肝肋下3cm，脾肋下2cm，移动浊音阳性。

HBsAg 阳性；B超检查：肝右叶有一直径5cm的占位性病变。

(1) 该患者最可能的诊断是

- A. 肝硬化
- B. 细菌性肝脓肿
- C. 肝血管瘤
- D. 原发性肝癌
- E. 肝包虫病

(2) 该患者最适合的实验室检查是

- A. AFP

- B.γ-GT
- C.血培养
- D.包虫囊液皮试
- E.血清胆红素测定

(3) 对该病具有确定诊断意义的检查是

- A.B 超检查
- B.腹部 CT 检查
- C.X 线检查
- D.肝功能检查
- E.肝组织活检或细胞学检查

4.患者，女，35 岁。因寒战、发热、腰痛伴尿频、尿急、尿痛 1 天入院。现症见小便频数，灼热刺痛，色黄赤，小腹拘急胀痛，口苦，大便秘结。查体：T39.5℃，左侧肾区有叩击痛，肋脊角压痛，尿沉渣白细胞（+++），可见白细胞管型。舌质红，苔薄黄腻，脉滑数。

(1) 该患者最可能的诊断是

- A.肾结核
- B.急性膀胱炎
- C.急性肾小球肾炎
- D.慢性肾盂肾炎
- E.急性肾盂肾炎

(2) 该患者为了进一步检查，以便尽快选择有效药物治疗，最简便、阳性率最高的试验是

- A.尿细菌定量培养
- B.尿培养

C.内生肌酐清除率

D.X 线检查

E.尿沉渣涂片镜检

(3) 其中医证型为

A.热毒炽盛

B.肾阴不足，湿热留恋证

C.膀胱湿热

D.肝胆郁热

E.脾肾亏虚，湿热屡犯

(4) 其中医治法为

A.泻火解毒

B.清热利湿通淋

C.疏肝理气，清热通淋

D.健脾补肾

E.滋阴益肾，清热通淋

(5) 其中医治疗方剂为

A.黄连解毒汤

B.知柏地黄丸

C.丹栀逍遥散

D.八正散

E.无比山药丸

5. 张某，男，35 岁，工人。痔疮便血 2 年。血常规：血红蛋白 67g/L，MCV68fl，MCH20pg，



总铁结合力  $70\mu\text{mol/L}$ ，血清铁  $6\mu\text{mol/L}$ ，转铁蛋白饱和度 9.5%，现症见：面色苍白，唇甲色淡，头晕，疲乏，形寒肢冷，腰膝酸软，大便不成形，舌淡，脉沉细弱。

(1) 其西医诊断是

- A. 巨幼细胞贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 自身免疫性溶血性贫血

(2) 其中医辨证是

- A. 脾胃虚弱
- B. 心脾两虚
- C. 脾虚痰阻
- D. 脾肾阳虚
- E. 肝肾阴虚

(3) 其中医治法是

- A. 健脾和胃
- B. 益气补血
- C. 温补脾肾
- D. 温补肾阳
- E. 健脾化湿

(4) 口服铁剂治疗的时间是

- A. 1 个月

B.2 个月

C.4~6 个月

D.8 个月

E.1 年

(5) 患者畏寒肢冷明显，应加用

A.附子、桂枝

B.生龙骨、生牡蛎

C.竹茹、生姜

D.薏苡仁、山药

E.木香、延胡索

6.患者，男性，63 岁。素有糖尿病病史，近几个月以来出现心烦，口渴，多饮多尿，口干舌燥，舌边尖红，苔薄黄，脉洪数。

(1) 其辨证为

A.肾阴亏虚

B.胃热炽盛

C.肺热伤津

D.肾气不固

E.阴阳两虚

(2) 治法为

A.滋阴补肾，润燥止渴

B.清泻胃火，养阴增液

C.滋阴固肾

D.滋阴温阳，补肾固涩

E.清热润肺，生津止渴

(3) 治疗应首选

A.金匱肾气丸

B.六味地黄丸

C.柴胡疏肝散

D.玉女煎

E.消渴方

(4) 若脉虚数，烦渴不止，小便频数，可用

A.二冬汤

B.增液承气汤

C.生脉散

D.参附龙牡汤

E.炙甘草汤

7.患者女性，30岁。四肢关节疼痛半年余，近1个月出现面颊部对称性红斑，反复发作口腔溃疡。现症见：心悸怔忡，健忘失眠，多梦，面色不华，肢体麻木，舌质淡，苔薄白，脉细缓。外周血 WBC $2.4 \times 10^9/L$ ，ESR47mm/h。

(1) 其最可能的诊断是

A.类风湿关节炎

B.系统性红斑狼疮

C.皮炎

D.白塞病

E.风湿病

(2) 其中医证型是

A.气营热盛

B.气血两亏

C.热郁积饮

D.脾肾两虚

E.瘀热痹阻

(3) 治疗应首选的方法是

A.清热凉血

B.益气养血

C.清热蠲饮

D.清热活血

E.健脾利水

(4) 治疗的首选方剂为

A.八珍汤

B.清瘟败毒饮

C.玉女煎

D.泻白散

E.犀角地黄汤

8.患者，男，58岁。有高血压病病史10年，今日用力排便时，突然出现剧烈头痛、呕吐，右侧肢体活动不利、失语，随即出现意识模糊，测血压210/120mmHg,右侧瘫痪。

(1) 最可能的诊断是

- A.蛛网膜下腔出血
- B.脑出血
- C.脑栓塞
- D.脑血栓形成
- E.短暂脑缺血发作

(2) 为明确诊断，应首选下列哪项检查

- A.脑脊液检查
- B.CT
- C.MBI
- D.头颅 X 线平片
- E.脑电图

(3) 对该患者的治疗，下列哪项是错误的

- A.20%甘露醇快速静点
- B.控制血压在 140/90mmHg 左右
- C.保持呼吸道通畅
- D.保持安静
- E.防治感染

9.患者有机磷杀虫剂中毒第三天，现已清醒，维持阿托品化状态，出现抬头困难、抬臂困难、呼吸困难，无流涎，双瞳孔 5mm 大小，肺部无干、湿啰音，监护示血氧饱和度下降。

(1) 首选的抢救治疗手段是

- A.加大阿托品用量
- B.气管插管，保持气道通畅，准备机械通气

- C.应用呼吸兴奋剂
- D.给予糖皮质激素治疗
- E.减少阿托品用量

(2) 该患者经抢救后脱险，1 个月后出现四肢麻木，末梢感觉异常，有疼痛感。这时最有可能的诊断是

- A.中间型综合征
- B.迟发性神经病
- C.中毒反跳
- D.阿托品中毒
- E.中毒性脑病

(3) 若患者为有机磷农药慢性中毒，治疗错误的是

- A.对症治疗
- B.脱离接触 OPI
- C.长期给予阿托品治疗
- D.症状消失需 2~4 周
- E.小剂量阿托品治疗

10.患者，男，52 岁。突然心悸、气短、眩晕。心电图示 P 波规律出现，P 波与 QRS 波数目之比为 2: 1，下传的 PR 间期为 0.14 秒。

(1) 最可能的诊断是

- A.一度房室传导阻滞
- B.二度 I 型房室传导阻滞
- C.三度房室传导阻滞

D.二度Ⅱ型房室传导阻滞

E.室内传导阻滞

(2) 下列有关对该患者采取的治疗中，不正确的是

A.如用药效果不佳可安装起搏器

B.阿托品

C.应用 $\beta$ 受体阻滞剂

D.观察心电图变化

E.异丙肾上腺素

(3) 该病的中医诊断为

A.胸痛

B.心悸

C.短气

D.眩晕

E.真心痛

11.患者，男，40岁。腹痛半年余，诊为消化性溃疡。现症见胃脘灼热疼痛，胸肋胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。

(1) 其中医辨证是

A.肝胃郁热证

B.胃阴不足证

C.胃络瘀阻证

D.脾胃虚寒证

E.肝胃不和证

(2) 其中医治法是

- A.疏肝理气，健脾和胃
- B.温中散寒，健脾和胃
- C.活血化瘀，通络和胃
- D.清胃泄热，疏肝理气
- E.健脾养阴，益胃止痛

(3) 治疗应首选的方剂是

- A.柴胡疏肝散合五磨饮子
- B.黄芪建中汤
- C.化肝煎合左金丸
- D.一贯煎合芍药甘草汤
- E.活络效灵丹合丹参饮

(4) 若患者两肋胀痛甚，应加

- A.郁金、川楝子
- B.川芎、五灵脂
- C.陈皮、青皮
- D.玫瑰花、乳香
- E.川芎、延胡索

12.患者，男，40岁。发现血尿、蛋白尿5年，现症见腰脊酸痛，神疲乏力，纳呆，大便溏薄，尿频，夜尿多。查体：BP150/90mmHg，双下肢轻度凹陷性水肿。实验室检查：尿蛋白0.8g/d，尿红细胞5~15/HP，Scr100 $\mu$ mol/L。B超示双肾大小正常。舌质淡，舌有齿痕，苔薄白，脉细。



(1) 首先考虑的临床诊断是

- A. 无症状性蛋白尿和（或）血尿
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 肾病综合征
- E. 高血压肾损害

(2) 降压药物应首选

- A. 袢利尿剂
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 钙通道阻滞剂
- D.  $\alpha$ 受体阻滞剂
- E.  $\beta$ 受体阻滞剂

(3) 理想的血压控制目标是

- A.  $<160/95\text{mmHg}$
- B.  $<140/90\text{mmHg}$
- C.  $<140/85\text{mmHg}$
- D.  $<130/80\text{mmHg}$
- E.  $<125/75\text{mmHg}$

(4) 其治疗的最终目标是

- A. 消除尿蛋白
- B. 消除水肿
- C. 延缓肾脏病进展

D.控制血压

E.消除血尿

(5) 其中医治法为

A.补气健脾益肾

B.补益肺肾

C.温补脾肾

D.滋养肝肾

E.益气养阴

(6) 其中医治疗方剂为

A.玉屏风散合金匱肾气丸

B.异功散

C.附子理中丸

D.杞菊地黄丸

E.参芪地黄汤

13.患者，男，66岁。慢性咳嗽，咳痰20年，近5年气促明显。现症见咳嗽痰多，色白黏腻，短气喘息，脘痞纳少，倦怠乏力。查体：球结膜充血水肿，口唇发绀，颈静脉怒张，桶状胸，两肺可闻及干湿性啰音，心率110次/分。舌质偏淡，苔薄腻，脉滑。

(1) 本病考虑诊断为

A.慢性阻塞性肺气肿

B.慢性支气管炎

C.心力衰竭

D.支气管扩张症

E.慢性肺源性心脏病

(2) 其辨证为

A.痰浊壅肺证

B.痰热郁肺证

C.痰蒙神窍证

D.阳虚水泛证

E.肺脾气虚证

(3) 其治法为

A.温肾健脾，化饮利水

B.涤痰开窍，息风止痉

C.清肺化痰，降逆平喘

D.健脾益肺，化痰降气

E.补肺纳肾，降气平

(4) 其首选方剂为

A.补肺汤

B.涤痰汤

C.真武汤合五苓散

D.越婢加半夏汤

E.苏子降气汤

(5) 若患者痰多，胸满不能平卧，则加

A.葶苈子、莱菔子

B.党参、黄芪、防风

C.蒲公英、板蓝根

D.金银花、连翘

E.白芍、杏仁

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

**扫描二维码去做题**



**正保医学教育网**

www.med66.com

## 《基础知识》仿真密卷答案及解析

### 一、A1 型题

1.【正确答案】B

【答案解析】证，即证候，是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括，一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成。

2.【正确答案】B

【答案解析】人体的天癸，是肾精及肾气充盈到一定程度而产生的一种精微物质，具有促进人体生殖器官的发育成熟和维持人体生殖功能的作用。

3.【正确答案】E

【答案解析】呼吸运动：肺主气而司呼吸，肾藏精而主纳气。人体的呼吸运动，虽由肺所主，但亦需肾的纳气功能协助。肺气久虚，肃降失司，与肾气不足，摄纳无权，往往互为影响，以致出现气短喘促，呼吸表浅，呼多吸少等肾不纳气的病理变化。

4.【正确答案】D

【答案解析】肺有主司一身之气的生成和运行的作用。体现于宗气的生成和对全身气机的调节作用。肺的呼吸失常，不仅影响宗气及一身之气的生成，出现少气不足以息、声低气怯、肢倦乏力等“气虚”症状。并且影响一身之气的运行，导致各脏腑经络之气的升降出入运动失调。

5.【正确答案】B

【答案解析】脾主运化水谷精微，化生气血，为后天之本。

6.【正确答案】A

【答案解析】心与脾的关系，主要表现在血液的生成和运行方面的密切联系。脾气健运，气血充盈，则心有所主。脾气健旺，脾的统血功能正常，则血行脉中，而不逸出于脉外。在病

理上，若脾气虚弱，运化失职，气血生化无源，或脾不统血，导致血液妄行，均可引起血虚而心无所主。

7.【正确答案】B

【答案解析】肾的纳气功能减退，摄纳无权，呼吸就表浅，可出现动辄气喘、呼多吸少等病理表现，久病及肾导致肾的纳气功能失调表现为咳喘，特别是年老肾虚患者。

8.【正确答案】A

【答案解析】肝、心、脾、肺、肾分别与春、夏、长夏、秋、冬相对应。因此该题选择 A。

9.【正确答案】B

【答案解析】气能行血，指血液的运行离不开气的推动作用。血液的运行有赖于心气、肺气的推动及肝气的疏泄调畅，临床上在治疗血液运行失常时，常常配合补气、行气、降气、升提的药物，即是气能行血理论的实际应用。

10.【正确答案】A

【答案解析】卫气由水谷精微中慄悍滑利部分所化生。卫气有防御外邪、温养全身和调控腠理的生理功能。

11.【正确答案】E

【答案解析】津液亦是气运行的载体。在脉外之气的运行必须依附于津液，不会漂浮失散而无归。津伤导致气无所依，所以气随津伤，体现了津能载气的作用。

12.【正确答案】B

【答案解析】血属阴而主静，血不能自行，有赖于气的推动，气行则血行，气滞则血瘀。因此该题选择气能行血。

13.【正确答案】A

【答案解析】水谷精微和肾精是血液化生的基础。它们在脾胃、心、肺、肾等脏腑的共同作

用下，经过气化过程而得以化生为血液。

14.【正确答案】B

【答案解析】风为百病之长：一是指风邪常兼他邪合而伤人，为外邪致病的先导。二是指风邪袭人致病最多。古人甚至将风邪作为外感致病因素的总称。

15.【正确答案】A

【答案解析】瘀血致病脉象多见涩脉或结代脉等。

16.【正确答案】A

【答案解析】邪气是发病的重要条件，邪气影响发病的性质、类型与特点、影响病情与病位，某些情况下邪气在发病中起主导作用等方面。

17.【正确答案】C

【答案解析】真虚假实：是指病机的本质为“虚”，但表现出“实”的临床假象。一般是由于正气虚弱，脏腑经络之气不足，推动、激发功能减退所致，故真虚假实又称为“至虚有盛候”。

18.【正确答案】C

【答案解析】内生“五邪”，是指在疾病的发展过程中，由于气血津液和脏腑等生理功能的异常而产生的类似风、寒、湿、燥、火六淫外邪致病的病理现象。由于病起于内，故分别称为“内风”、“内寒”、“内湿”、“内燥”和“内火”等，统称为内生“五邪”。

19.【正确答案】C

【答案解析】气逆指气机升降失常，或气升之太过，或降之不及，脏腑之气逆上的病理状态。

20.【正确答案】A

【答案解析】故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔，如是则僻邪不至，长生久视。（《灵枢·本神》）。

21.【正确答案】C

【答案解析】《内经》创造性提出望闻问切四诊之法，发挥视、听、嗅、味、触等所有感官作用，获取有关疾病信息。

22.【正确答案】D

【答案解析】《素问·举痛论》原文：余知百病生于气也。怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，灵则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结，九气不同，何病之生？

23.【正确答案】C

【答案解析】竹叶石膏汤证论述了病后余热未清，气阴两伤的证治。

24.【正确答案】E

【答案解析】当归四逆汤即桂枝汤去生姜，倍用大枣加当归、细辛、通草而成。

25.【正确答案】E

【答案解析】真武汤证论少阴阳虚水泛的证治。本证属肾阳虚衰，水气泛滥，故用真武汤温阳化气行水。

26.【正确答案】A

【答案解析】白虎加人参汤治则：清热止渴，益气生津。

27.【正确答案】D

【答案解析】桂枝茯苓丸：桂枝、茯苓、牡丹皮、芍药、桃仁。

28.【正确答案】A

【答案解析】酸枣仁汤证论述了虚劳病心肝血虚失眠的证治。

29.【正确答案】D

【答案解析】治疗烂喉痧毒燔气营证，选用方药凉营清气汤。三石汤用于暑湿弥漫三焦证；蒿芩清胆汤用于暑湿郁阻少阳证；普济消毒饮用于大头瘟毒盛肺胃证；薛氏五叶芦根汤用



于温病后期余湿留恋证。

30.【正确答案】 C

【答案解析】湿温病是感受湿热病邪引起的，多发生于夏秋雨湿较盛、气候炎热季节的急性外感热病。

31.【正确答案】 D

【答案解析】暑湿弥漫三焦病机：气分暑湿郁蒸，弥漫于上中下三焦。证候表现：身热汗出口渴，面赤耳聋，眩晕，胸闷喘咳，痰中带血，脘痞腹胀，下利稀水，小便短赤，舌红，苔黄滑，脉滑数。

32.【正确答案】 A

【答案解析】《本草纲目》认为马钱子无毒，《中国药学大辞典》认为黄丹、桃仁无毒。

33.【正确答案】 E

【答案解析】妊娠慎用的药物包括通经祛瘀、行气破滞及辛热滑利之品，如桃仁、红花、牛膝，大黄、枳实，附子、肉桂、干姜，木通、冬葵子、瞿麦等。莪术为妊娠禁用的药物。

34.【正确答案】 E

【答案解析】一般来讲，病在胸膈以上者，如眩晕、头痛、目疾、咽痛等宜饭后服；如病在胸腹以下，如胃、肝、肾等脏疾患，则宜饭前服。

35.【正确答案】 E

【答案解析】蝉蜕长于疏散肺经风热以宣肺利咽、开音疗哑，还可明目退翳，息风止痉，治疗目赤翳障、急慢惊风、破伤风证及小儿夜啼不安。

36.【正确答案】 C

【答案解析】知母入肺肾经而能滋肾阴、泻肾火、退骨蒸，用治阴虚火旺所致骨蒸潮热、盗汗、心烦者。黄柏入肾、膀胱、大肠经，偏泻下焦相火，除骨蒸，湿热下注诸证及骨蒸劳热

者多用。

37.【正确答案】D

【答案解析】这部分属于十八反中的内容。甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白蔹、白及；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。

38.【正确答案】E

【答案解析】防己功效：祛风湿，止痛，利水消肿。

39.【正确答案】B

【答案解析】苍术

性能：辛、苦，温。归脾、胃、肝经。

功效：燥湿健脾，祛风散寒，明目。

应用

(1) 湿阻中焦证。

(2) 风寒湿痹。

(3) 风寒夹湿表证。

(4) 夜盲症及眼目昏涩。

40.【正确答案】E

【答案解析】茵陈功效：清利湿热，利胆退黄。

金钱草功效：利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿。

冬葵子功效：利尿通淋，下乳，润肠。

石韦功效：利尿通淋，清肺止咳，凉血止血。

冬瓜皮功效：利水消肿，清热解暑。

葫芦功效：利水消肿。

茯苓功效：利水渗湿，健脾，宁心。

41.【正确答案】C

【答案解析】肉桂

性能：辛、甘，大热。归肾、脾、心、肝经。

功效：补火助阳，散寒止痛，温经通脉，引火归原。

42.【正确答案】D

【答案解析】沉香的功效：行气止痛，温中止呕，纳气平喘。

43.【正确答案】B

【答案解析】鸡内金用法：煎服。研末服。研末服效果比煎服好。

44.【正确答案】C

【答案解析】南瓜子

用法用量：研粉，60~120g，冷开水调服。

45.【正确答案】B

【答案解析】此题考察的是对十八反内容的掌握。甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白芍、白及；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。

46.【正确答案】C

【答案解析】穿山甲的功效：活血消癥，搜风通经，通经下乳，消肿排脓。

47.【正确答案】D

【答案解析】紫菀功效：润肺化痰止咳。

款冬花功效：润肺下气，止咳化痰。

48.【正确答案】A

【答案解析】酸枣仁功效：养心益肝，安神，敛汗，生津止渴。

莲子功效：益肾固精，补脾止泻止带，养心安神。

远志功效：安神益智，交通心肾、祛痰消肿。

合欢皮功效：解郁安神，活血消肿。

首乌藤功效：养血安神，祛风通络。

49.【正确答案】D

【答案解析】牛黄用法用量：入丸、散剂，每次 0.15~0.35g。外用适量，研末敷患处。

50.【正确答案】D

【答案解析】石菖蒲善于治疗噤口痢。

51.【正确答案】D

【答案解析】肉豆蔻功效：涩肠止泻，温中行气。

乌梅功效：敛肺止咳，涩肠止泻，安蛔止痛，生津止渴，消疮毒，炒炭固冲止漏。故根据题干要求，最佳的选项是 D。

芡实功效：益肾固精，健脾止泻，除湿止带。

罂粟壳功效：涩肠止泻，敛肺止咳，止痛。

覆盆子功效：固精缩尿，益肝肾明目。

桑螵蛸功效：固精缩尿，补肾助阳。

五味子功效：收敛固涩，益气生津，补肾宁心。

52.【正确答案】B

【答案解析】十枣汤使用注意：本方药性峻猛，孕妇禁用，年老体弱者慎用。宜清晨空腹时服用，并从小量开始，或据病情增减用量。若服后虽泻不爽，水饮未尽，次日可渐加量再服，总以快利为度；若体虚邪实又非攻不可者，可与健脾补益之剂交替使用；若服药得快利后，当食糜粥以保养脾胃。

53. 【正确答案】 A

【答案解析】温脾汤方中附子温壮脾阳，温散寒凝；大黄泻下攻积，与大热之附子相伍，则寒性去而泻下之功犹存，共为君药，共奏温阳祛寒，攻下冷积之用。

54. 【正确答案】 D

【答案解析】逍遥散所治病证由肝郁血虚，脾失健运所致。

55. 【正确答案】 E

【答案解析】蒿芩清胆汤的功用是清胆利湿、和胃化痰。

56. 【正确答案】 A

【答案解析】趣记：仙方活命饮【迎风只要背朝天，当家没乳叫陈（仙）】金银花、防风、白芷、赤芍、生归尾、天花粉、贝母、乳香、没药、皂角刺、穿山甲、陈皮、甘草节。

方歌：仙方活命金银花，防芷陈皮皂山甲，贝母花粉及乳没，赤芍甘草酒煎佳。

57. 【正确答案】 A

【答案解析】香薷散祛暑解表，化湿和中，主治阴暑证。

58. 【正确答案】 B

【答案解析】地黄饮子主治下元虚衰，痰浊上泛之暗痲证。舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

59. 【正确答案】 A

【答案解析】五更泄泻，实为脾肾阳虚之肾泄证，选用四神丸温肾暖脾、涩肠止泻。

60. 【正确答案】 D

【答案解析】酸枣仁汤主治病证由肝血不足，虚热内扰所致。治宜养血安神，清热除烦。

61. 【正确答案】 D

【答案解析】安宫牛黄丸和至宝丹中麝香通达十二经，为开窍醒神之要药。

62. 【正确答案】 C

【答案解析】趣记：定喘汤【秦老用果子麻花拌杏仁霜】白果、麻黄、苏子、款冬花、杏仁、法制半夏、甘草、桑白皮、黄芩。

方歌：定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑；苏杏黄芩兼甘草，风寒痰热喘哮尝。

63. 【正确答案】 E

【答案解析】温经汤功用：温经散寒，养血祛瘀。

64. 【正确答案】 C

【答案解析】趣记：天麻钩藤饮【天麻钩藤教绝技，诸神擒牛众致意】天麻、钩藤、石决明、山栀、黄芩、川牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、朱茯神。

方歌：天麻钩藤石决明，栀芩杜膝与寄生；夜藤茯神益母草，头痛眩晕失眠宁。

65. 【正确答案】 D

【答案解析】养阴清肺汤主治白喉之阴虚燥热证。喉间起白如腐，不易拭去，咽喉肿痛，初期或发热或不发热，鼻干唇燥，或咳或不咳，呼吸有声，似喘非喘，脉数无力或细数。

66. 【正确答案】 B

【答案解析】羌活胜湿汤主治风湿犯表。头痛身重，肩背、腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮。

67. 【正确答案】 A

【答案解析】贝母瓜蒌散主治燥痰咳嗽。咳嗽痰少，咳痰不爽，涩而难出，咽干口燥哽痛，或上气喘促，苔白而干。

68. 【正确答案】 C

【答案解析】健脾丸的功用是健脾和胃，消食止泻。主治脾虚食积证。

## 二、B 型题

1. (1) 【正确答案】D

【答案解析】肺朝百脉，主治节。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】胃主受纳水谷；主腐熟水谷。

2. (1) 【正确答案】A

【答案解析】水谷之精所化生的水谷之气和自然界的清气，两者又合称为后天之气(即宗气)。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】人体之气来源于先天之精所化生的先天之气(即元气)。

3. (1) 【正确答案】B

【答案解析】痰饮的致病特点为阻滞气血运行；影响水液代谢；易于蒙蔽心神；致病广泛，变幻多端。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】瘀血的致病特点易于阻滞气机；影响血脉运行；影响新血生成；病位固定，病证繁多。

4. (1) 【正确答案】D

【答案解析】阳偏胜，即是阳盛，指机体在疾病过程中所出现的一种阳气病理性偏盛、功能亢奋、机体反应性增强、热量过剩的病理状态。一般地说，其病机特点多表现为阳盛而阴未虚的实热证。阳气的病理性亢盛，则以热、动、燥为其特点。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】阳偏衰，即是阳虚，是指机体阳气虚损，温煦、推动、兴奋等作用减退，出现功能减退或衰弱，代谢减缓，产热不足的病理状态。一般地说，其病机特点多表现为机体阳气不足，阳不制阴，阴气相对偏亢的虚寒证。

5. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痉，瓜蒌桂枝汤主之。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 风湿，脉浮，身重，汗出，恶风者，防己黄芪汤主之。

6. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】 热陷心包，心窍闭阻属于营分证。

(2) 【正确答案】 A

【答案解析】 湿热酿痰，蒙蔽心包病机：气分湿热久郁，酿成痰浊，蒙蔽心包。

7. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 里热证采用苦寒清里的方药属“热者寒之”。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 气血虚弱采用补气养血的方药属“虚者补之”。

8. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 麻黄杏仁甘草石膏汤中肺热壅盛，则蒸迫津液而外泄，故汗出而喘。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 葛根黄芩黄连汤证中肠热上攻，表热内迫，肺气不利，故喘。

9. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 鱼腥草功效：清热解毒，消痈排脓，利尿通淋，清热止痢。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 紫草功效：清热凉血，活血，解毒透疹。

10. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 茵陈功效：清利湿热，利胆退黄。



(2) 【正确答案】B

【答案解析】萹蓄功效：利尿通淋，杀虫止痒。

11. (1) 【正确答案】B

【答案解析】女贞子功效：滋补肝肾，乌须明目。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】枸杞功效：滋补肝肾，益精明目。

12. (1) 【正确答案】B

【答案解析】肉桂功效：补火助阳，散寒止痛，温经通脉，引火归原。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】桂枝功效：发汗解肌，温通经脉，助阳化气。

13. (1) 【正确答案】B

【答案解析】小承气汤、调胃承气汤皆为大承气汤类方。大承气汤硝、黄并用，大黄后下，且加枳、朴，攻下之力颇峻，为“峻下剂”，主治痞、满、燥、实四症俱全之阳明热结重证；小承气汤不用芒硝，且三味同煎，枳、朴用量亦减，攻下之力较轻，称为“轻下剂”，主治痞、满、实之阳明热结轻证；调胃承气汤不用枳、朴，后纳芒硝，大黄与甘草同煎，泻下之力较大承气汤缓和，称为“缓下剂”，主治阳明燥热内结，燥、实而无痞、满之证。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】小承气汤、调胃承气汤皆为大承气汤类方。大承气汤硝、黄并用，大黄后下，且加枳、朴，攻下之力颇峻，为“峻下剂”，主治痞、满、燥、实四症俱全之阳明热结重证；小承气汤不用芒硝，且三味同煎，枳、朴用量亦减，攻下之力较轻，称为“轻下剂”，主治痞、满、实之阳明热结轻证；调胃承气汤不用枳、朴，后纳芒硝，大黄与甘草同煎，泻下之力较大承气汤缓和，称为“缓下剂”，主治阳明燥热内结，燥、实而无痞、满之证。

14. (1) 【正确答案】E

【答案解析】葛根芩连汤主治：表证未解，邪热入里之协热下利证。身热下利，胸脘烦热，口中作渴，喘而汗出，舌红苔黄，脉数或促。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】芍药汤主治：湿热痢疾。腹痛，便脓血，赤白相兼，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数。

15. (1) 【正确答案】C

【答案解析】真人养脏汤主治久泻久痢，脾肾虚寒证。本证之久泻久痢，因脾肾虚寒，关门不固所致。症见泻痢无度，滑脱不禁，甚至脱肛坠下，脐腹疼痛，喜温喜按，倦怠食少，舌淡苔白，脉迟细。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】四神丸主治脾肾阳虚之肾泄。五更泄泻，不思饮食，食不消化，或久泻不愈，腹痛喜温，腰酸肢冷，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉沉迟无力。

16. (1) 【正确答案】A


【答案解析】安宫牛黄丸主治：邪热内陷心包证。高热烦躁，神昏谵语，舌謇肢厥，舌红或绛，脉数有力。亦治中风昏迷，小儿惊厥，属邪热内闭者。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】至宝丹主治：热闭心包证。神昏谵语，身热烦躁，舌红苔黄垢腻，脉滑数。亦治中风、中暑、小儿惊厥属于痰热内闭者。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

**扫描二维码去做题**



**正保医学教育网**

www.med66.com

《相关专业知识》仿真密卷答案及解析

一、A1 型题

1.【正确答案】A

【答案解析】头目胀痛，多见于肝阳上亢或肝火上炎的病证。

2.【正确答案】A

【答案解析】酸痛指疼痛伴有酸软不适感的症状，多因风湿侵袭，气血运行不畅，或肾虚、气血不足，组织失养所致。常见于四肢、腰背的关节、肌肉处。

3.【正确答案】B

【答案解析】半身汗是指病人仅半侧身体汗出的症状，或左侧，或右侧，或上半身，或下半身。经常无汗出的半侧是病变的部位，可见于中风、痿证、截瘫等病人。多因为风痰、痰瘀、风湿等阻滞经络，营卫不能周流，气血失和所致。

4.【正确答案】B

【答案解析】白睛发黄：为黄疸的主要标志。多由湿热或寒湿内蕴，肝胆疏泄失常，胆汁外溢所致。

5.【正确答案】B

【答案解析】口唇赤肿而干：多为热极。唇色深红：多属热盛。口唇青黑：多属寒盛、痛极。口唇青紫：多属瘀血证。

6.【正确答案】E

【答案解析】饮邪停留于胃肠，阻滞气机，胃失和降，可见泛吐清水，脘腹痞胀，腹部水声漉漉，是为狭义的“痰饮”。所以呕化清水痰涎，为痰饮停于胃中所致，故选 E。

7.【正确答案】C

【答案解析】短缩舌可因寒凝筋脉，舌收引挛缩；内阻痰湿，引动肝风，风邪夹痰，梗阻舌

根；热盛伤津，筋脉拘挛；气血俱虚，舌体失于濡养温煦所致。痿软舌多因气血虚极，阴液失养筋脉所致；可见于气血俱虚，热灼津伤，阴亏已极等证。故选 C。

8. 【正确答案】 A

【答案解析】积粉苔：苔白如积粉，扪之不燥，常见于瘟疫或者内痈等病，系秽浊时邪与热毒相结而成，故选 A。

9. 【正确答案】 D

【答案解析】舌苔剥脱后，复生薄白之苔：为邪去正胜，胃气渐复之佳兆。

10. 【正确答案】 A

【答案解析】独语指自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续的症状。多因心气虚弱，神气不足，或气郁痰阻，蒙蔽心神所致，属阴证。常见于癫病、郁病。

11. 【正确答案】 A

【答案解析】久病音哑或失音多属虚证，多因精气内伤，肺肾阴虚，虚火灼肺，以致津枯肺损，声音难出，即所谓“金破不鸣”。

12. 【正确答案】 C

【答案解析】脉搏有力是有神的标志，故有胃即有神。脉之有神是指：脉象有力柔和，节律整齐。

13. 【正确答案】 E

【答案解析】滑数脉：多见于痰热（火）、湿热或食积内热。

14. 【正确答案】 A

【答案解析】大脉：脉体宽大，但无脉来汹涌之势。其脉象特征是寸口三部皆脉大而和缓、从容。

15. 【正确答案】 C

【答案解析】辨别寒热证候的真假，应以表现于内部、中心的症状为准、为真，肢末、外部的症状是现象，可能为假象，故胸腹的冷热是辨别寒热真假的关键，胸腹灼热者为热证，胸腹部冷而不灼热者为寒证。

16. 【正确答案】 A

【答案解析】表证指六淫、疫疠等邪气，经皮毛、口鼻侵入机体的初期阶段，正（卫）气抗邪于肌表浅层，以新起恶寒发热为主要表现的轻浅证候。

17. 【正确答案】 E

【答案解析】表证常见的临床表现有新起恶风寒，或恶寒发热，头身疼痛，喷嚏，鼻塞，流涕，咽喉痒痛，微有咳嗽、气喘，舌淡红，苔薄，脉浮。

18. 【正确答案】 A

【答案解析】阳虚证临床表现：畏冷，肢凉，口淡不渴，或喜热饮，或自汗，小便清长或尿少不利，大便稀薄，面色白，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟（或为细数）无力。可兼有神疲、乏力、气短等气虚的表现。

19. 【正确答案】 D

【答案解析】暖气酸腐，兼脘腹胀满者，多因宿食内停，属于实证。

20. 【正确答案】 B

【答案解析】气虚类证不包括的是气虚证、气陷证、气不固证、气脱证。

21. 【正确答案】 B

【答案解析】痰火扰神证的临床表现：发热，口渴，胸闷，气粗，咯吐黄痰，喉间痰鸣，心烦，失眠，甚则神昏谵语，或狂躁妄动，打人毁物，不避亲疏，胡言乱语，哭笑无常，面赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。本证以神志狂躁、神昏谵语与痰热症状共见为辨证的主要依据。

22. 【正确答案】 C

【答案解析】心火亢盛证临床表现：发热，口渴，心烦，失眠，便秘，尿黄，面红，舌尖红绛，苔黄，脉数有力。甚或口舌生疮、溃烂疼痛；或见小便短赤、灼热涩痛；或见吐血、衄血；或见狂躁谵语、神志不清。本证以发热、心烦、吐衄、舌赤生疮、尿赤涩灼痛等症为辨证的主要依据。兼小便赤、涩、灼、痛者，称为心火下移证，习称为心移热于小肠。

23. 【正确答案】 B

【答案解析】寒湿困脾证指寒湿内盛，困阻脾阳，脾失温运，以纳呆、腹胀、便溏、身重等为主要表现的寒湿证候，又名湿困脾阳证、寒湿中阻证、太阴寒湿证。

24. 【正确答案】 B

【答案解析】肺肾阴虚证指肺肾阴液亏虚，虚热内扰，以干咳、少痰、腰酸、遗精等为主要表现的虚热证候。

25. 【正确答案】 B

【答案解析】营分证的临床表现：身热夜甚，口不甚渴或不渴，心烦不寐，甚或神昏谵语，斑疹隐隐，舌质红绛，无苔，脉细数。

26. 【正确答案】 D

【答案解析】卫分证指温热病邪侵袭肌表，卫气功能失调，肺失宣降，以发热、微恶风寒、脉浮数等为主要表现的表热证候。

临床表现：发热，微恶风寒，少汗，头痛，全身不适，口微渴，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数，或有咳嗽、咽喉肿痛。舌质深绛是血分证的表现，故最佳的选项是 D。

27. 【正确答案】 A

【答案解析】引起胸痛的胸壁疾病有皮肤及皮下组织病变、肌肉病变、肋骨病变、肋间神经病变。

28. 【正确答案】 B

【答案解析】大量咯血常见于空洞型肺结核、支气管扩张和肺脓肿。

29.【正确答案】E

【答案解析】咳嗽的病因包括：呼吸道疾病、胸膜疾病、心血管疾病、中枢神经因素以及其他原因如胃食管反流病、服用血管紧张素转化酶抑制剂等。

30.【正确答案】E

【答案解析】呼吸困难伴发热，见于肺炎、肺脓肿、肺结核、胸膜炎、急性心包炎等。

31.【正确答案】B

【答案解析】非感染性发热的病因有：（1）无菌性坏死物质吸收；（2）变态反应；（3）内分泌与代谢障碍；（4）皮肤散热减少；（5）体温调节中枢功能失常；（6）自主神经功能紊乱。

32.【正确答案】B

【答案解析】满月面容：面圆如满月，皮肤发红，常伴痤疮和小须。见于库欣综合征及长期应用肾上腺皮质激素的患者。

33.【正确答案】B

【答案解析】左锁骨上窝淋巴结肿大，多为腹腔脏器癌肿（胃癌、肝癌、结肠癌等）转移；右锁骨上窝淋巴结肿大，多为胸腔脏器癌肿（肺癌、食管癌等）转移。

34.【正确答案】D

【答案解析】二尖瓣狭窄时，心尖部可闻及舒张中晚期隆隆样杂音，呈递增型，音调较低而局限，左侧卧位呼气末时较清楚，常伴有第一心音亢进、二尖瓣开放拍击音及舒张期震颤，肺动脉瓣第二心音亢进、分裂；主动脉瓣关闭不全所致的相对性二尖瓣狭窄的杂音，称为奥-弗杂音（Austin-Flint 杂音），性质柔和，不伴有第一心音亢进、开瓣音，无震颤。

35.【正确答案】E



【答案解析】双上眼睑下垂见于重症肌无力、先天性上眼睑下垂。

36.【正确答案】C

【答案解析】肢端肥大症：见于腺垂体功能亢进、生长激素分泌过多引起的肢端肥大症。

37.【正确答案】B

【答案解析】中性粒细胞病理性增多的原因之急性中毒：如代谢性酸中毒（尿毒症、糖尿病酮症酸中毒）、化学药物中毒（安眠药中毒）、有机磷农药中毒等。

38.【正确答案】C

【答案解析】内生肌酐清除率（Ccr）是判断肾小球损害的敏感指标，根据 Ccr 可将肾功能分为 4 级：①肾衰竭代偿期：Ccr51 ~ 80ml/min。②肾衰竭失代偿期：Ccr50 ~ 20ml/min。③肾衰竭期（尿毒症早期）：Ccr19 ~ 10ml/min。肾衰竭终末期（尿毒症晚期）：Ccr < 10ml/min。Ccr 测定还可指导临床用药。

39.【正确答案】B

【答案解析】健康成人经尿排出的蛋白质总量为 20 ~ 80mg/24h。尿蛋白定性试验阳性或定量试验 > 150mg/24h 称为蛋白尿。

40.【正确答案】E

【答案解析】急性胰腺炎血清淀粉酶在发病后 12 ~ 72 小时达高峰。

41.【正确答案】B

【答案解析】抗-HBs 阳性：感染后 3 ~ 6 个月出现，是一种保护性抗体，见于注射过乙肝疫苗和曾经感染过 HBV 者。

42.【正确答案】E

【答案解析】二度 II 型房室传导阻滞：①P-R 间期恒定（正常或延长）。②部分 P 波后无 QRS 波群（发生心室漏搏）。③房室传导比例一般为 4:3 或 3:2 等。

43. 【正确答案】 D

【答案解析】 下消化道内镜检查禁忌证：

- (1) 肛门、直肠严重狭窄者。
- (2) 重症细菌性痢疾、溃疡性结肠炎及憩室炎等。
- (3) 严重心肺功能不全、精神失常及昏迷者。
- (4) 急性弥漫性腹膜炎及腹腔器官穿孔者。
- (5) 妊娠妇女。

44. 【正确答案】 B

【答案解析】 肺容量由 2 个或 2 个以上的肺容积组成。

45. 【正确答案】 E

【答案解析】 转移性骨肿瘤：①根据 X 线表现的不同将其分为溶骨型、成骨型和混合型 3 种，以溶骨型最为多见。②CT 显示骨转移瘤不仅比普通平片敏感，而且还能清楚地显示骨外局部软组织肿块的范围、大小、与相令脏器的关系等。③MRI 对骨髓中的肿瘤组织及其周围水肿非常敏感，比 CT 能更早地发现骨转移瘤，从而为临床诊断、治疗等提供更早而可靠的依据。

46. 【正确答案】 D

【答案解析】 空洞：为肺组织坏死液化所致，X 线表现为：①薄壁空洞：常见于肺结核，也可见于肺转移瘤。②厚壁空洞：常见于肺脓肿（空洞内多有液面）、肺癌（洞壁多厚薄不规则）。③虫蚀样空洞：见于干酪样肺炎。

47. 【正确答案】 A

【答案解析】 胃肠道穿孔最多见于胃或十二指肠穿孔，立位 X 线透视或腹部平片可见：两侧膈下有弧形或半月形透亮气体影。

48.【正确答案】D

【答案解析】主动脉瓣关闭不全：左心室明显增大，升主动脉、主动脉弓普遍扩张，心脏呈靴形。

49.【正确答案】C

【答案解析】X线检查是诊断骨折最常用、最基本的方法。

50.【正确答案】A

【答案解析】剂量一般是指药物每天的用量，是决定血药浓度和药物效应的主要因素。常用来描述药物作用的剂量包括：无效量、最小有效量、最大有效量、治疗量、最小中毒量和致死量。

51.【正确答案】C

【答案解析】吗啡的外周作用：①消化系统：治疗剂量的吗啡兴奋胃肠平滑肌，抑制胆汁、胰液和肠液分泌，同时抑制中枢，减轻便意，引起便秘。吗啡还能兴奋胆道 Oddi 括约肌，使胆道和胆囊内压增加，诱发或加重胆绞痛，所以胆绞痛时应与阿托品合用。②心血管系统：扩张全身血管，引起直立性低血压。抑制呼吸致  $\text{CO}_2$  积聚，可使脑血管扩张，颅内压增高。③其他：治疗量吗啡能提高膀胱括约肌张力；也可对抗催产素的作用而延长产程；大剂量吗啡还可收缩支气管，抑制免疫功能。

52.【正确答案】D

【答案解析】苯海索主要是通过阻断中枢胆碱受体，来改善帕金森病因多巴胺不足而出现的相对胆碱能作用亢进的症状。

53.【正确答案】B

【答案解析】苯妥英钠是治疗癫痫强直-阵挛性发作（大发作）的首选药。

54.【正确答案】A

【答案解析】苯二氮（卓）类药物的应用：抗焦虑、镇静催眠、抗惊厥和抗癫痫、中枢性肌松。

55. 【正确答案】 E

【答案解析】肾上腺素临床应用

①心脏骤停：可用于溺水、麻醉意外、手术意外、药物中毒、传染病和心脏传导阻滞等引起的心脏骤停。②过敏性休克：为治疗过敏性休克的首选药。③支气管哮喘：因不良反应严重，仅用于急性发作。④与局麻药配伍，可延缓局麻药的吸收，延缓麻醉时间和减少中毒。也可用于局部止血。

56. 【正确答案】 C

【答案解析】急性有机磷中毒的表现为神志不清，两侧瞳孔呈针尖样大小，呼吸有大蒜臭味。

57. 【正确答案】 B

【答案解析】传染病常见的症状和体征：发热、发疹、毒血症、单核-巨噬细胞系统反应等。

58. 【正确答案】 C

【答案解析】治疗休息痢，方药用连理汤加减，或四君子汤合香连丸加减。

59. 【正确答案】 C

【答案解析】肾综合征出血热于病程 3~7 天发生低血压休克，又称为原发性休克。

60. 【正确答案】 A

【答案解析】流脑脑脊液压力升高，外观混浊。

61. 【正确答案】 C

【答案解析】乙型肝炎的易感人群是抗 HBs 阴性者。

62. 【正确答案】 D

【答案解析】认识过程：感觉、知觉、记忆、想象和注意。

63. 【正确答案】 E

【答案解析】睡眠中的异常行为：主要是指与睡眠有关的发作性躯体异常和行为异常，如梦游症、梦呓、睡行症、夜惊、梦魇、磨牙和机体不自主跳动等。

64. 【正确答案】 D

【答案解析】神经症性障碍主要临床表现为烦恼、焦虑、紧张、恐怖、强迫、疑病、抑郁等，患者有严重的痛苦体验，一般无幻觉、妄想等精神病性症状。

65. 【正确答案】 D

【答案解析】行政处罚是指卫生行政机关或者法律法规授权组织在职权范围内对违反卫生行政管理秩序而尚未构成犯罪的公民、法人和其他组织实施的一和卫生行政制裁。行政处罚的种类主要有警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、行政拘留等。

66. 【正确答案】 B

【答案解析】《医疗用毒性药品管理办法》规定：医疗单位供应和调配毒性药品，凭医师签名的正式处方。每次处方剂且不得超过 2 日极量。

67. 【正确答案】 D

【答案解析】根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：

一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；

二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；

三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；

四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

68. 【正确答案】 D

【答案解析】南丁格尔（1820～1910 年），近代护理学和护士教育的创始人。她主张从人

道主义出发，帮助患者完成疾病的“修复过程”。注意患者护理过程的自然环境和生理因素，对患者的饮食起居，空气、阳光、通风、环境等都提出了具体的要求。创办了世界上第一所护士学校，注重学生道德品质的培养。

69. 【正确答案】 E

【答案解析】会诊的道德要求：一切从维护患者利益出发；经治医生应客观陈述患者的状况；尊重科学，学术面前人人平等。

70. 【正确答案】 E

【答案解析】道家的养生思想强调“清静无为”，“保养精气、顺乎自然、气功修炼”，“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”除了选项 E 以外，其余各项均为儒家的养生思想。

## 二、B 型题

1. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】隐痛指痛势较缓，尚可忍耐，但绵绵不休的症状，是虚证疼痛的特点。常见于头部、腕腹、肋肋、腰背等部位，多因精血亏虚，或阳气不足，机体失养所致。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】胀痛指疼痛带有胀满的症状，是气滞作痛的特点。如胸肋腕腹等处胀痛，时发时止，多属肺、肝、胃肠气滞之证；但头目胀痛，多见于肝阳上亢或肝火上炎的病证。

2. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】阴虚证的临床表现：形体消瘦，口燥咽干，两颧潮红，五心烦热，潮热，盗汗，小便短黄，大便干结，舌红少津或少苔，脉细数等。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】阳虚证的临床表现：畏冷，肢凉，口淡不渴，或喜热饮，或自汗，小便清长或

尿少不利，大便稀薄，面色白，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟（或为细数）无力。可兼有神疲、乏力、气短等气虚的表现。

3. (1) 【正确答案】A

【答案解析】风热犯肺证的临床表现：咳嗽，痰少而黄，气喘，鼻塞，流浊涕，咽喉肿痛，发热，微恶风寒，口微渴，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。本证多有感受风热的病史，以咳嗽、痰少色黄与风热表证共见为辨证的主要依据。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】肝火犯肺证的临床表现：胸肋灼痛，急躁易怒，头胀头晕，面红目赤，口苦口干，咳嗽阵作，痰黄稠黏，甚则咳血，舌红，苔薄黄，脉弦数。本证以胸肋灼痛、急躁、咳嗽痰黄或咳血等与实热症状共见为辨证的主要依据。

4. (1) 【正确答案】B

【答案解析】尿道涩痛：即排尿不畅，且伴有急迫、疼痛、灼热感，见于淋证。多因湿热蕴结、热灼津伤、结石或瘀血阻塞等所致。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】余溺不尽：即排尿后小便点滴不净，多因老年人肾阳亏虚，肾气不固所致。

5. (1) 【正确答案】B

【答案解析】泽是面色润泽，主精气未衰，病轻易治；天是面色枯槁，主精气已衰，病重难医。面色由泽转天，是病趋重危；由天转泽，是病情好转。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】泽是面色润泽，主精气未衰，病轻易治；天是面色枯槁，主精气已衰，病重难医。面色由泽转天，是病趋重危；由天转泽，是病情好转。

6. (1) 【正确答案】A

【答案解析】呕血与黑便伴慢性、周期性、节律性上腹痛：见于消化性溃疡。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】呕血与黑便伴蜘蛛痣、肝掌、黄疸、腹壁静脉曲张、腹水、脾肿大：见于肝硬化门静脉高压。

7. (1) 【正确答案】D

【答案解析】正常时肌肉有一定的张力。张力过低或缺失见于周围神经、脊髓灰质前角及小脑病变。折刀样张力过高见于锥体束损害，铅管样肌张力过高见于锥体外系损害。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】正常时肌肉有一定的张力。张力过低或缺失见于周围神经、脊髓灰质前角及小脑病变。折刀样张力过高见于锥体束损害，铅管样肌张力过高见于锥体外系损害。

8. (1) 【正确答案】A

【答案解析】急性病毒性肝炎：两者均显著增高，ALT 增高更明显，ALT/AST>1。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】肝胆系统疾病：各种肝内、外胆管阻塞性疾病，如胰头癌、胆道结石，ALP 明显增高。

9. (1) 【正确答案】A

【答案解析】房性期前收缩的心电图表现：

(1) 提早出现的房性 P'，形态与窦性 P 波不同。

(2) P'-R 间期 $\geq$ 0.12s。

(3) 房性 P'波后有正常形态的 QRS 波群。

(4) 代偿间歇不完全。

(2) 【正确答案】D



【答案解析】室性期前收缩的心电图表现：

- (1) 提早出现宽大畸形的 QRS-T 波群，其前无提早出现的异位 P 波。
- (2) QRS 时限常 $\geq 0.12s$ 。
- (3) T 波方向与 QRS 主波方向相反。
- (4) 常有完全性代偿间歇。

10. (1) 【正确答案】A

【答案解析】细支气管肺泡癌（弥漫性肺癌）：表现为两肺广泛的细小结节，边界不清，分布不对称，进一步发展可融合成大片肿块，形成癌性实变。CT 可见两肺不规则分布的 1cm 以下结节，边缘模糊，常伴有肺门、纵隔淋巴结转移；融合后的大片实变影中靠近肺门处可见支气管充气征，实变区密度较低呈毛玻璃样，其中可见到高密度的隐约血管影是其重要特征。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】发生于右上叶的肺癌，肺门肿块及右肺上叶不张连在一起可形成横行“S”状下缘。

11. (1) 【正确答案】A

【答案解析】氢氯噻嗪的临床应用

(1) 轻、中度水肿：是治疗各类轻、中度水肿的首选药。对肾性水肿的疗效与肾功能有关，肾功能不良者疗效差；对肝性水肿与螺内酯合用疗效增加，可避免血钾过低诱发肝昏迷。

(2) 高血压：轻、中度高血压可单用或与其他降压药合用。

(3) 尿崩症：用于肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症。轻症效果好，重症疗效差。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】氢氯噻嗪的临床应用

(1) 轻、中度水肿：是治疗各类轻、中度水肿的首选药。对肾性水肿的疗效与肾功能有关，肾功能不良者疗效差；对肝性水肿与螺内酯合用疗效增加，可避免血钾过低诱发肝昏迷。

(2) 高血压：轻、中度高血压可单用或与其他降压药合用。

(3) 尿崩症：用于肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症。轻症效果好，重症疗效差。

12. (1) 【正确答案】B

【答案解析】肾综合征出血热目前尚无特效疗法，仍以综合疗法为主。总的原则是“三早一就”，即“早发现、早休息、早治疗及就近治疗”，防治休克、出血、肾功能衰竭和继发感染。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】肾综合征出血热发热期主要表现为全身中毒症状、毛细血管损伤和肾损害等。全身中毒症状表现为头痛、腰痛、眼眶痛（三痛症），出现中毒性神经精神症状者多数可发展为重型。毛细血管损伤表现为充血、出血和渗出水肿征。皮肤充血表现为颜面、颈、胸背潮红（三红征），重者呈醉酒貌，黏膜充血见于眼结膜、软腭和咽部。

13. (1) 【正确答案】A

【答案解析】焦虑是一切神经症性障碍表现的基础，也是所有神经症性障碍的一个共同症状。但在焦虑性神经症中，患者对焦虑的体验要显著得多，弥漫性也大得多，每时每刻都会感到很高程度的恐惧，同时伴有显著的植物神经症状和肌肉紧张，以及运动性不安。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】强迫症的特点是有意识的自我强迫和自我反强迫同时存在，二者的尖锐冲突使患者异常焦虑和痛苦。

14. (1) 【正确答案】A

【答案解析】行政处分是指由行政机关或企事业单位依照行政隶属关系给予有违法失职行为

的工作人员的一种惩罚措施，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等形式。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】行政处罚是指卫生行政机关或者法律法规授权组织在职权范围内对违反卫生行政管理秩序而尚未构成犯罪的公民、法人和其他组织实施的一和卫生行政制裁。行政处罚的种类主要有警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、行政拘留等。

15. (1) 【正确答案】C

【答案解析】钱乙（1035～1117年），北宋医学家。他医术精湛，屡愈危证，名震朝野。他为人治病不分贵贱。“自是戚里贵室，逮士庶之家，愿致之，无虚日”。钱乙70多岁时回到故乡，虽然手挛痛，坐卧不起，但登门求医者仍“扶携襁负，累累满前，近自邻井，远或百数十里，皆授之药”。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】陈实功（1555～1636年），明代医学家。他医术高明，医德高尚，深得病家信任。他提出“遇贫难者，当量力微赠，方为仁术”。他在《外科正宗》一书中提出了医生的“十要”和“五戒”。对医生的学习、知识结构、药物的选择和配制、对同道的态度、防治疾病、医生对患者家庭和社会的责任、对待患者馈赠等都做出了详细的规定。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

**扫描二维码去做题**



《专业知识》仿真密卷答案及解析

一、A1 型题

1.【正确答案】C

【答案解析】慢性肺心病痰热郁肺证

证候：喘息气粗，烦躁，胸满，咳嗽，痰黄或白，黏稠难咳，或身热，微恶寒，有汗不多，  
溲黄便干，口渴，舌红，舌苔黄或黄腻，边尖红，脉数或滑数。

治法：清肺化痰，降逆平喘。

方药：越婢加半夏汤加减。

2.【正确答案】C

【答案解析】肺癌按解剖学分类：中央型肺癌、周围型肺癌

肺癌按组织学分类：小细胞肺癌（SCLC）；非小细胞肺癌（NSCLC）：①鳞状上皮细胞癌  
（简称鳞癌）：为最常见的类型，多见于老年男性，多有吸烟史，以中央型肺癌多见。②腺  
癌：③大细胞未分化癌（简称大细胞癌）

3.【正确答案】C

【答案解析】I 型呼吸衰竭的血气特点为  $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 \leq 50\text{mmHg}$ 。II 型呼  
吸衰竭的血气特点为： $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ 。

4.【正确答案】A

【答案解析】肺结核之气阴耗伤证的治法：益气养阴。方药：保真汤加减。

5.【正确答案】B

【答案解析】结核分枝杆菌检查是确诊肺结核病的主要方法，也是制订化疗方案和考核治疗  
效果的主要依据。

6.【正确答案】D

【答案解析】肺癌气阴两虚证

证候：咳嗽无力，有痰或无痰，痰中带血，肺中积块，神疲乏力，时有心悸，汗出气短，口干，发热或午后潮热，手足心热，纳呆腹胀，便干或稀，舌质红苔薄，或舌质胖嫩有齿痕，脉细数无力。

治法：益气养阴，化痰散结。

方药：生脉散合沙参麦冬汤加减。

7.【正确答案】C

【答案解析】本病病位在肺，与脾、肾、肝、心密切相关。

8.【正确答案】A

【答案解析】脑复苏是心肺复苏最后成败的关键。

9.【正确答案】A

【答案解析】心脏瓣膜病二尖瓣狭窄最常见病因为风湿热。先天性畸形或结缔组织病，如系统性红斑狼疮心内膜炎为二尖瓣狭窄的罕见病因。

10.【正确答案】B

【答案解析】心绞痛发作持续时间一般在 15 分钟以内，急性心肌梗死疼痛持续时间多超过 30 分钟。

11.【正确答案】B

【答案解析】慢性心力衰竭之气阴亏虚证的方药：生脉散合酸枣仁汤加味。

12.【正确答案】E

【答案解析】主动脉内球囊反搏是有效改善心肌灌注同时又降低心肌耗氧量和增加心输出量的治疗手段。

(1) 适应证①急性心肌梗死或严重心肌缺血并发心源性休克，且不能由药物治疗纠正；②

伴血流动力学障碍的严重冠心病（如急性心肌梗死伴机械并发症）；③心肌缺血伴顽固性肺水肿。

(2) 禁忌证①存在严重的外周血管疾病；②主动脉瘤；③主动脉瓣关闭不全；④活动性出血或其他抗凝禁忌证；⑤严重血小板缺乏。

13. 【正确答案】 C

【答案解析】 缓慢性心律失常之气阴两虚证的方药：炙甘草汤加减。

14. 【正确答案】 C

【答案解析】 原发性醛固酮增多症：女性多见。以长期高血压伴顽固性低血钾为特征，可有多饮、多尿、肌无力、周期性麻痹等。

15. 【正确答案】 E

【答案解析】 病毒性心肌炎病位在心，与肺脾关系密切；正气不足，邪毒侵心是发病的关键。心、肺、脾虚为本，热毒、湿毒、饮、瘀为标。

16. 【正确答案】 C

【答案解析】 慢性胃炎病理变化是胃黏膜损伤与修复的慢性过程，主要病理学特征是炎症、萎缩和肠化生。

17. 【正确答案】 B

【答案解析】 甲胎蛋白（AFP）目前仍是原发性肝癌特异性的标记物和主要诊断指标，现已广泛用于肝细胞癌的普查、诊断、疗效判断和预测复发。

18. 【正确答案】 B

【答案解析】 上消化道出血是消化性溃疡最常见的并发症，DU 较 GU 更多并发出血，尤以十二指肠球部后壁和球后溃疡更多见。

19. 【正确答案】 D

【答案解析】胃癌的主要转移途径有四种：直接蔓延，淋巴结转移，血行转移，腹腔内种植。

20. 【正确答案】 B

【答案解析】胃镜为目前诊断上消化道出血病因的首选方法，可直观地观察食管、胃、十二指肠球部至降段，发现病部位。

21. 【正确答案】 C

【答案解析】溃疡性结肠炎肝郁脾虚证治法为疏肝健脾，方药首选痛泻要方加味。

22. 【正确答案】 A

【答案解析】肝硬化食道静脉曲张破裂大出血并休克时，首选治疗为输血。紧急输血指征：

①当改变体位时出现晕厥、血压下降和心率加快，或心率大于 120 次/分或收缩压低于 90mmHg，或较基础血压下降 25%；②失血性休克；③血红蛋白低于 70g/L 或血细胞比容低于 25%。

23. 【正确答案】 B

【答案解析】出血是由于肝功能减退合成凝血因子减少，脾功能亢进和毛细血管脆性增加等原因造成。

24. 【正确答案】 B

【答案解析】肾病综合征的发病是由脏腑功能失调、水液代谢失常所致。主要表现为肺脾肾三脏功能失调。

25. 【正确答案】 B

【答案解析】治疗急性膀胱炎可选用磺胺类、喹诺酮类、半合成青霉素或头孢类等抗生素，任选一种药物，连用 3 天，约 90% 的患者可治愈。目前更推荐此法，与单剂量疗法相比，3 日疗法更有效；耐药性并无增高；可减少复发，增加治愈率。

26. 【正确答案】 D

【答案解析】尿路感染最常见于育龄期妇女。

27. 【正确答案】 E

【答案解析】慢性肾衰竭的治疗：肾移植：成功的肾移植会恢复正常的肾功能（包括内分泌和代谢功能），可使患者几乎完全康复。

28. 【正确答案】 A

【答案解析】急性肾衰竭病因

(1) 肾前性急性肾衰：血容量减少（如各种原因的液体丢失和出血）、有效动脉血容量减少和肾内血流动力学改变等。

(2) 肾性急性肾衰：肾实质损伤，常见的是肾缺血或肾毒性物质（包括外源性毒素，如生物毒素、化学毒素、抗菌药物、造影剂等和内源性毒素，如血红蛋白、肌红蛋白等）损伤肾小管上皮细胞。

(3) 肾后性急性肾衰：特征是急性尿路梗阻。

29. 【正确答案】 B

【答案解析】急性肾衰竭患者尿量超过 400ml 时，则由少尿期进入多尿期。

30. 【正确答案】 B

【答案解析】肾衰指数 (RFI) 可用于鉴别肾前性急性肾衰和急性肾小管坏死，一般认为肾前性急性肾衰  $< 1$ ；急性肾小管坏死时多见  $> 1$ 。

31. 【正确答案】 A

【答案解析】再生障碍性贫血的血象：多呈全血细胞减少，发病早期可一系或二系减少。骨髓象：多部位骨髓增生减少，粒、红系及巨核细胞明显减少且形态大致正常。

32. 【正确答案】 E

【答案解析】再生障碍性贫血中医证型分别是：肾阴亏虚证、肾阳亏虚证、肾阴阳两虚证、



肾虚血瘀证、气血两虚证、热毒壅盛证。

33.【正确答案】D

【答案解析】再生障碍性贫血的骨髓象：多部位骨髓增生减少，粒、红系及巨核细胞明显减少且形态大致正常，淋巴细胞、网状细胞及浆细胞等非造血细胞比例明显增高。

34.【正确答案】C

【答案解析】糖皮质激素是治疗特发性血小板减少性紫癜的首选药物。

35.【正确答案】C

【答案解析】特发性血小板减少性紫癜之血热妄行证，治法：清热凉血。方药：犀角地黄汤加减。

36.【正确答案】D

【答案解析】遗传性球形细胞增多症为血管外溶血，是由单核-巨噬细胞系统，主要是脾破坏红细胞，由于破坏红细胞的场所主要是脾脏，所以可进行脾切除。

37.【正确答案】E

【答案解析】血管内溶血时，珠蛋白降低；急性溶血停止约 3~4 天后，血浆中结合珠蛋白才能复原（正常为 0.5~1.5g/L），其余均符合溶血性贫血的表现。

38.【正确答案】A

【答案解析】正常骨髓造血功能受抑制表现：（1）贫血，（2）发热，（3）出血。

39.【正确答案】C

【答案解析】急性白血病需防治感染，是由于白血病患者常伴有粒细胞减少，特别在化疗、放疗后粒细胞缺乏将持续相当长时间。

40.【正确答案】C

【答案解析】滑囊液检查具有确诊意义，为痛风诊断的“金标准”。

41. 【正确答案】 C

【答案解析】胰岛素的主要不良反应是低血糖反应，其他包括过敏反应、胰岛素性水肿、屈光不正、注射部位脂肪营养不良等。

42. 【正确答案】 C

【答案解析】中度高渗性失水：失水量相当于体重的 4%~6%。

43. 【正确答案】 B

【答案解析】甲亢主要临床表现有：高代谢症候群、弥漫性甲状腺肿、眼征和胫前黏液性水肿。甲状腺危象为甲亢的特殊临床表现。

44. 【正确答案】 C

【答案解析】正气虚弱是本病发病的内在因素，凡禀赋不足、劳逸失度、情志失调、饮食所伤等均易受外邪侵袭。

45. 【正确答案】 C

【答案解析】血管性痴呆之髓海不足证的方药：七福饮加减。

46. 【正确答案】 B

【答案解析】MRI 可清晰显示脑干病灶、对病灶进行准确定位，并能区分陈旧性腔隙系由于腔隙性梗死亦或颅内小出血所致，是最有效的检查手段。

47. 【正确答案】 B

【答案解析】帕金森病之血瘀动风证的方药：补阳还五汤加减。

48. 【正确答案】 A

【答案解析】脑血栓形成之阴虚风动证的方药：镇肝熄风汤加减。

49. 【正确答案】 C

【答案解析】急性脑血管病主要归属于中医学“中风病”的范畴，另有少数可归属于中医学

“头痛” “眩晕” “厥证” “偏疽” 等范畴。

50.【正确答案】 B

【答案解析】 腰穿有诱发脑疝的危险。

51.【正确答案】 B

【答案解析】 短暂性脑缺血发作发生发展的核心是血瘀。

52.【正确答案】 D

【答案解析】 癫痫之瘀阻脑络证的方药：通窍活血汤加减。

53.【正确答案】 E

【答案解析】 一般认为卒中是血管性痴呆（VD）发生的直接原因。

54.【正确答案】 A

【答案解析】 毒物接触史是诊断中毒的重要依据。

55.【正确答案】 D

【答案解析】 解毒药在清除毒物过程中，应该同时应用胆碱受体阻断药（阿托品为代表药物）和胆碱酯酶复能药。

56.【正确答案】 B

【答案解析】 阿托品主要作用于外周 M 胆碱能受体，缓解 M 样症状。

57.【正确答案】 A

【答案解析】 急性 CO 中毒：血中 COHb 测定有确定诊断价值，停止接触 CO 超过 8 小时多已降至正常。

58.【正确答案】 E

【答案解析】 机械通气禁忌证：

1.无绝对禁忌证。

2.特殊情况下(如大咯血或严重误吸导致的窒息、肺大疱、张力性气胸、急性心肌梗死及低血容量休克等)需先采取必要处理后再给予机械通气治疗。

59.【正确答案】E

【答案解析】手术切除仍是目前根治原发性肝癌的最好方法。

60.【正确答案】C

【答案解析】肝硬化患者脾功能亢进时，白细胞及血小板计数均见减少，后者减少尤为明显。

61.【正确答案】A

【答案解析】心肌梗死的心电图定位诊断： $V_1-V_3$ 对应部位为前间壁。

62.【正确答案】B

【答案解析】右心衰竭以体循环静脉淤血的表现为主。

63.【正确答案】E

【答案解析】外科手术是治疗甲状腺功能亢进症的有效手段之一，手术的方式主要是甲状腺次全切除术。

64.【正确答案】A

【答案解析】肺癌之痰湿毒蕴证的治法：祛湿化痰，清热解毒。方药：导痰汤加减。

## 二、B型题

1. (1) 【正确答案】E

【答案解析】呼吸衰竭之肺肾气虚证的治法：补益肺肾，纳气平喘。方药：补肺汤合参蛤散加减。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】呼吸衰竭之痰蒙神窍证治法：涤痰开窍，息风止痉。方药：涤痰汤合安宫牛黄丸或至宝丹。

2. (1) 【正确答案】B

【答案解析】利福平为广谱抗生素。其杀灭结核菌的机制在于抑制菌体的 RNA 聚合酶，从而阻碍 mRNA 的合成。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】异烟肼是最重要的治疗结核病的药物之一，具有杀菌作用强、价格低廉、副作用少、口服等优点。

3. (1) 【正确答案】D

【答案解析】快速性心律失常的心血不足证的治法：补血养心，益气安神。方药：归脾汤加减。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】快速性心律失常的气阴两虚证的治法：益气养阴，养心安神。方药：生脉散加味。

4. (1) 【正确答案】E

【答案解析】消化性溃疡肝胃不和证方药：柴胡疏肝散合五磨饮子加减。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】消化性溃疡胃阴不足证方药：一贯煎合芍药甘草汤加减。

5. (1) 【正确答案】A

【答案解析】黏液脓血便是溃疡性结肠炎活动期的重要表现。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】大便次数及便血的程度反映病情轻重，粪质亦与病情轻重有关。

6. (1) 【正确答案】A

【答案解析】上消化道出血是肝硬化最常见的并发症。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 肝性脑病是肝硬化最严重的并发症。

7. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 成人每日消化道出血 > 5ml 即可出现粪便隐血试验阳性，每日出血量 50 ~ 100ml 可出现黑便，胃内蓄积血量在 250 ~ 300ml 可引起呕血。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 成人每日消化道出血 > 5ml 即可出现粪便隐血试验阳性，每日出血量 50 ~ 100ml 可出现黑便，胃内蓄积血量在 250 ~ 300ml 可引起呕血。

8. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 高胆固醇血症：首选 HMG-CoA 还原酶抑制剂。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 混合型血脂异常：如以 TC 与 LDL-C 增高为主，可用他汀类；如以 TG 增高为主则用贝丁酸类。

9. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】  $\alpha$ -糖苷酶抑制剂主要作用机制为延缓小肠葡萄糖吸收，降低餐后血糖。

(2) 【正确答案】 A

【答案解析】 磺酰脲类主要作用机制为促进胰岛素释放，增强靶组织细胞对胰岛素的敏感性，抑制血小板凝集，减轻血液黏稠度。

10. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 甲状腺功能亢进症肝火旺盛证——龙胆泻肝汤加减。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 甲状腺功能亢进症阴虚火旺证——天王补心丹加减。

11. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】糖化血红蛋白反映患者近 8~12 周总的血糖水平。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】糖化血浆白蛋白反映患者近 2~3 周总的血糖水平。

12. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】类风湿关节炎之寒热错杂证的治法：祛风散寒，清热化湿。方药：桂枝芍药知母汤加减。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】类风湿关节炎之阴虚内热证的治法：养阴清热，祛风通络。方药：丁氏清络饮加减。

13. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】颅脑 CT 是确诊蛛网膜下腔出血的首选诊断方法。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】脑电图是诊断癫痫最常用的一种辅助检查方法。

14. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】帕金森病气血两虚证的方药是：八珍汤合天麻钩藤饮加减。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】帕金森病阴阳两虚证的方药是：地黄饮子加减。

15. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】基底动脉尖综合征是出现以中脑病损为主要表现的一组临床综合征，包括：①眼球运动及瞳孔异常；②意识障碍；③对侧偏盲或皮质盲；④严重记忆障碍（颞叶内侧受累）。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】延髓背外侧综合征是脑干梗死中最常见的类型，主要表现：①眩晕、呕吐、眼球震颤（前庭神经核）；②交叉性感觉障碍（三叉神经脊束核及对侧交叉的脊髓丘脑束受损）；③同侧 Horner 征（交感神经下行纤维受损）；④吞咽困难和声音嘶哑（舌咽、迷走神经受损）；⑤同侧小脑性共济失调（绳状体或小脑受损）。

16. (1) 【正确答案】A

【答案解析】额叶出血：前额痛、呕吐、痫性发作较多见；对侧偏瘫、共同偏视、精神障碍；优势半球出血时可出现运动性失语。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】枕叶出血：对侧同向性偏盲，并有黄斑回避现象，可有一过性黑矇和视物变形；多无肢体瘫痪。

17. (1) 【正确答案】A

【答案解析】局灶性癫痫：常表现为持续数秒至数分钟的肢体抽搐，从躯体的一处开始，并向周围扩展。24 小时脑电图监测有局限性癫痫放电则可确诊为癫痫；CT 或 MRI 检查可发现脑内局灶性病变。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】梅尼埃病：发作性眩晕、恶心、呕吐，但每次发作持续时间往往超过 24 小时，可达 3~4 天，伴有耳鸣、耳阻塞感、听力减退等症状，除眼球震颤外，无其他神经系统定位体征。发病年龄多在 50 岁以下。

18. (1) 【正确答案】A

【答案解析】急性中毒眼部表现

(1) 瞳孔扩大：见于阿托品、莨菪碱类中毒。

(2) 瞳孔缩小：见于有机磷类农药、氨基甲酸酯类杀虫药中毒。



(2) 【正确答案】C

【答案解析】急性中毒眼部表现

(1) 瞳孔扩大：见于阿托品、莨菪碱类中毒。

(2) 瞳孔缩小：见于有机磷类农药、氨基甲酸酯类杀虫药中毒。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

**扫描二维码去做题**



  
**正保医学教育网**  
www.med66.com

《专业实践能力》仿真密卷答案及解析

一、A2 型题

1.【正确答案】A

【答案解析】慢性支气管炎之肺气虚证

证候：咳嗽气短，痰涎清稀，反复易感，倦怠懒言，声低气怯，面色晄白，自汗畏风，舌淡苔白，脉细弱。

治法：补肺益气，化痰止咳。

方药：玉屏风散加减。

2.【正确答案】B

【答案解析】支气管扩张症之肝火犯肺证

证候：咳嗽阵阵，反复痰中带血或少量咯血，或大咯血不止，胸肋胀痛，烦躁不安，口干苦，大便干结，舌质红，苔薄黄少津，脉弦数。

治法：清肝泻火，凉血止血。

方药：黛蛤散合泻白散加减。

3.【正确答案】D

【答案解析】肺癌早期多表现为刺激性干咳、咳痰、痰中带血等呼吸道症状，中央型肺癌 X 线检查多为一侧肺门类圆形阴影，边缘毛糙。

4.【正确答案】C

【答案解析】根据患者慢性肺心病病史 6 年，呼吸道感染原有症状、体征加重，及出现精神恍惚，烦躁不安等神志症状，可诊断患者出现的并发症为肺性脑病。

5.【正确答案】C

【答案解析】肺炎之热闭心神证

证候：咳嗽气促，痰声辘辘，烦躁，神昏谵语，高热不退，甚则四肢厥冷，舌红绛，苔黄而干，脉细滑数。

治法：清热解毒，化痰开窍。

方药：清营汤加减。

6.【正确答案】D

【答案解析】肺癌之气阴两虚证

证候：咳嗽无力，有痰或无痰，痰中带血，神疲乏力，时有心悸，汗出气短，口干，发热或午后潮热，手足心热，纳呆腹胀，便干或稀，舌质红苔薄，或舌质胖嫩有齿痕，脉细数无力。

7.【正确答案】B

【答案解析】心脏瓣膜病之气阴两虚证

证候：心悸气短，倦怠乏力，头晕目眩，面色无华，动则汗出，自汗或盗汗，夜寐不宁，口干，舌质红或淡红，苔薄白，脉细数无力或促、结代。

治法：益气养阴，宁心复脉。

方药：炙甘草汤加味。

8.【正确答案】D

【答案解析】心肌梗死之气虚血瘀证

证候：胸闷心痛，动则加重，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌体胖大有齿痕，舌质暗淡，苔薄白，脉细弱无力或结代。

治法：益气活血，祛瘀止痛。

方药：补阳还五汤加减。

9.【正确答案】D

【答案解析】急性心肌梗死的并发症：乳头肌功能不全或断裂可发生不同程度的左房室瓣脱

垂并关闭不全，心尖区出现收缩中、晚期喀喇音和吹风样收缩期杂音。

10.【正确答案】A

【答案解析】慢性心力衰竭之心肺气虚证

证候：心悸，气短，肢倦乏力，动则加剧，神疲咳喘，面色苍白，舌淡或边有齿痕，脉沉细或虚数。

治法：补益心肺。

方药：养心汤合补肺汤加减。

11.【正确答案】B

【答案解析】快速性心律失常之心血不足证

证候：心悸气短，活动尤甚，眩晕乏力，失眠健忘，面色无华，纳呆食少，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：补血养心，益气安神。

方药：归脾汤加减。

12.【正确答案】E

【答案解析】阵发性室上速心电图特点：心率快而规则，心率为 160~220 次/min，P 波形态与窦性 P 波不同，当心率快时，P 波与前面的 T 波重叠，不易识别，ST-T 无变化。

13.【正确答案】B

【答案解析】原发性肝癌——湿热瘀毒证证候：肋下结块坚实，痛如锥刺，脘腹胀满，目肤黄染，日渐加深，面色晦暗，肌肤甲错，或高热烦渴，口苦咽干，小便黄赤，大便干黑，舌质红有瘀斑，苔黄腻，脉弦数或涩。治法：清利湿热，化瘀解毒。方药：茵陈蒿汤合鳖甲煎丸加减。

14.【正确答案】C

【答案解析】胃癌 X 线钡餐检查为：局部胃壁僵硬、皱襞中断，蠕动波消失，突出于胃腔内的充盈缺损，结合该患者钡餐结果加上便潜血阳性，首先考虑胃癌可能性大。

15. 【正确答案】 B

【答案解析】患者有上腹部隐痛史，现出现消化道出血，无肝病史，考虑是消化性溃疡引起的出血，对于非曲张静脉上消化道大出血：①抑制胃酸分泌。常静脉用 H<sub>2</sub> 受体拮抗剂和质子泵抑制剂，以质子泵抑制剂效果好。通常为西咪替丁、雷尼替丁、奥美拉唑，静脉注射或滴注。②内镜治疗。③手术治疗。④介入治疗。

16. 【正确答案】 D

【答案解析】慢性胃炎——胃阴不足证，证候：胃脘隐隐作痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治法：养阴益胃，和中止痛。方药：一贯煎合芍药甘草汤加减。

17. 【正确答案】 B

【答案解析】急性胰腺炎——肠胃热结证

证候：全腹疼痛，痛而拒按，发热，口苦而干，脘腹胀满，大便秘结，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉沉实或滑数。

治法：通腑泄热，行气止痛。

方药：大承气汤加减。

18. 【正确答案】 A

【答案解析】根据患者临床表现，考虑急性胰腺炎可能性大，首选血淀粉酶检测。血淀粉酶起病后 6 至 12 小时开始升高；尿淀粉酶升高较晚在发病后 12 至 14 小时开始升高；血清脂肪酶起病 24 至 72 小时开始上升。

19. 【正确答案】 A

【答案解析】肾病综合征之风水相搏证

证候：起始眼睑浮肿，继则四肢、全身亦肿，皮肤光泽，按之凹陷易恢复，伴发热，咽痛，咳嗽，小便不利等症，舌苔薄白，脉浮。

20.【正确答案】D

【答案解析】慢性肾小球肾炎之湿热证

证候：面浮肢肿，身热汗出，口干不欲饮，胸脘痞闷，腹部胀满，纳食不香，尿黄短少，便溏不爽，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿。

21.【正确答案】C

【答案解析】慢性肾衰竭之肝肾阴虚证

证候：头晕头痛，耳鸣眼花，两目干涩或视物模糊，口干咽燥，渴而喜饮或饮水不多，腰膝酸软，大便易干，尿少色黄，舌淡红少津，苔薄白或少苔，脉弦或细弦，常伴血压升高。

治法：滋肾平肝。

方药：杞菊地黄汤加减。

22.【正确答案】A

【答案解析】急性肾小球肾炎是以急性起病，不同程度的血尿、蛋白尿、水肿、高血压、少尿及一过性氮质血症为临床表现的综合征。

急性肾小球肾炎之风热犯肺，水邪内停证

证候：发热而不恶寒，或热重寒轻，咽喉疼痛，口干口渴，头面浮肿，尿少色赤，舌质红，苔薄黄，脉象浮数或细数。

治法：散风清热，宣肺行水。

方药：越婢加术汤加减。

23. 【正确答案】 D

【答案解析】 再生障碍性贫血之肾虚血瘀证

证候：心悸气短，周身乏力，面色晦暗，头晕耳鸣，腰膝酸软，皮肤紫斑，肌肤甲错，肋痛，出血不明显，舌质紫暗，有瘀点或瘀斑，脉细或涩。

治法：补肾活血。

方药：六味地黄丸或金匱肾气丸合桃红四物汤加减。

24. 【正确答案】 A

【答案解析】 患者为儿童，有瘀点、瘀斑，有上呼吸道感染史，查  $PLT 20 \times 10^9/L$ ，凝血时间正常，再结合骨髓象诊断为急性特发性血小板减少性紫癜。其首选药物是糖皮质激素。

25. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性溶血的表现为：常起病急骤，短期大量溶血可出现寒战、高热，伴头痛、呕吐，腰背肢体酸痛，面色苍白，血红蛋白尿和黄疸。且患者 Coombs 试验阳性，故诊断为自身免疫性溶血性贫血。

26. 【正确答案】 B

【答案解析】 缺铁性贫血之心脾两虚证

证候：面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，毛发干脱，爪甲脆，舌淡胖，苔薄，脉濡细。

治法：益气补血，养心安神。

方药：归脾汤或八珍汤加减。

27. 【正确答案】 D

【答案解析】 胃大部切除术及胃空肠吻合术后，由于食物不经过十二指肠，影响了正常铁的吸收，导致缺铁性贫血的发生。

28. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性白血病之热毒炽盛证

证候：壮热，口渴多汗，烦躁，头痛面赤，身痛，口舌生疮，咽喉肿痛，面颊肿胀疼痛，或咳嗽，咯黄痰，皮肤、肛门疔肿，便秘尿赤，或见吐血、衄血、便血、尿血、斑疹，或神昏谵语，舌质红绛，苔黄，脉大。

治法：清热解毒，凉血止血。

方药：黄连解毒汤合清营汤加减。

29. 【正确答案】 B

【答案解析】 痛风之风寒湿阻证

证候：肢体关节疼痛，屈伸不利，或呈游走性疼痛，或疼痛剧烈，痛处不移，或肢体关节重着，肿胀疼痛，肌肤麻木，阴雨天加重，舌苔薄白，脉弦紧或濡缓。

治法：祛风散寒，除湿通络。

方药：蠲痹汤加减。

30. 【正确答案】 A

【答案解析】 磺酰脲类适应证：T2DM 经饮食及运动治疗后不能使病情获得良好控制的患者。

31. 【正确答案】 C

【答案解析】 患者有酮症酸中毒病史，并现空腹血糖高，应首选胰岛素治疗。

32. 【正确答案】 A

【答案解析】 甲状腺功能亢进症——肝火旺盛证

证候：颈前肿胀，眼突，烦躁易怒，易饥多食，手指颤抖，恶热多汗，面红烘热，心悸失眠，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，月经不调，舌质红，舌苔黄，脉弦数。



治法：清肝泻火，消瘿散结。

方药：龙胆泻肝汤加减。

33.【正确答案】C

【答案解析】补钾时必须检查肾功能和尿量，每日尿量 $>700\text{ml}$ 或每小时尿量在 $>30\text{ml}$ 以上补钾较为安全。

34.【正确答案】E

【答案解析】当血清钾 $>7\sim 9\text{mmol/L}$ 时，心电图检查可见：PR 间期延长，P 波消失，QRS 波群渐宽，R 波渐低，S 波渐深，ST 段与 T 波融合。

35.【正确答案】D

【答案解析】低渗性失水的轻度失水：每千克体重缺钠 $8.5\text{mmol/L}$ 时(血浆钠在 $130\text{mmol/L}$ 左右)，血压可在 $100\text{mmHg}$ 以上，患者出现疲乏无力、尿少、头晕等。尿钠极低或测不出。结合该患者的症状及辅助检查诊断为低渗性失水。

36.【正确答案】A

【答案解析】甲氨蝶呤：每周剂量为 $7.5\sim 25\text{mg}$ ，以口服为主(1 日之内服完)，亦可静注或肌注。4~6 周起效，疗程至少半年。不良反应有肝损害、胃肠道反应、骨髓受抑制和口角糜烂等，停药后多能恢复。

37.【正确答案】C

【答案解析】患者 55 岁，中年发病，有高血压病史，突然起病，且头颅 CT 示：深穿支可见一个直径为 $7\text{mm}$ 圆形腔隙性低密度阴影，边缘清晰，故诊断为腔隙性脑梗死。

38.【正确答案】B

【答案解析】帕金森之肝肾阴虚证

证候：表情呆板，肢体震颤幅度很大，动作迟缓，肢体拘痉，活动笨拙，头晕目眩，耳鸣健

忘，急躁易怒，多梦，腰膝酸软，舌体瘦小，舌质红，苔少，脉弦细数。

治法：补肾养阴，柔肝息风。

方药：大定风珠加减。

39.【正确答案】B

【答案解析】脑血栓形成的诊断标准：

- (1) 起病较急，多于安静状态下发病。
- (2) 多见于有动脉硬化、高血压、糖尿病及心脏病病史的中老年人。
- (3) 有颈内动脉系统和/或椎-基底动脉系统体征和症状，如偏瘫、偏身感觉障碍、失语、共济失调等，部分可有头痛、呕吐、昏迷等全脑症状，并在发病后数小时至几天内逐渐加重。
- (4) 头颅 CT、MRI 发现梗死灶，或排除脑出血、瘤卒中和炎症性疾病等。

40.【正确答案】A

【答案解析】结合患者高血压病史，头颅 CT：脑叶区见高密度影。诊断为脑出血。额叶出血的表现：前额痛、呕吐、痫性发作较多见；对侧偏瘫、共同偏视、精神障碍；优势半球出血时可出现运动性失语。故诊断为额叶出血。

41.【正确答案】D

【答案解析】癫痫之心肾亏虚证

证候：痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。

治法：补益心肾，潜阳安神。

方药：左归丸合天王补心丹加减。

42.【正确答案】C

【答案解析】典型脑出血的诊断要点：①50 岁以上，多有高血压病史，在体力活动或情绪

激动时突然起病，发病迅速。②早期有意识障碍及头痛、呕吐等颅内压增高症状，并有脑膜刺激征及偏瘫、失语等局灶症状。③头颅 CT 示高密度阴影。患者症状体征，与脑出血诊断要点相符合。

43. 【正确答案】 D

【答案解析】“阿托品化”（表现为用阿托品后，瞳孔较前扩大、口干、皮肤干燥、心率增快和肺湿啰音消失）。

44. 【正确答案】 C

【答案解析】急性一氧化碳中毒患者在意识障碍恢复后，经过 2~60 天的“假愈期”，可出现神经精神症状，为急性一氧化碳中毒迟发脑病。

45. 【正确答案】 A

【答案解析】尽管服毒史不明，但结合典型的有机磷中毒临床表现仍考虑急性有机磷中毒，故选 A。

46. 【正确答案】 C

【答案解析】根据题干可诊断患者为喘息型慢性支气管炎，是一种慢性炎症，各种引发呼吸道感染的因素均可加重哮喘，因此，控制和减少感染是关键预防措施。因患者感冒后引起哮喘加重，故应控制感染。

47. 【正确答案】 E

【答案解析】根据题干可诊断患者为肺炎，且进入感染性休克阶段，故首先应采取的紧急措施是补充血容量，扩容治疗是抗休克的基本方法。

## 二、A3/A4 型题

1. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】支气管哮喘诊断标准

- 1.反复发作喘息、气急、胸闷或咳嗽，多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激以及病毒性上呼吸道感染、运动等有关。
- 2.发作时在双肺可闻及散在或弥漫性、以呼气相为主的哮鸣音，呼气相延长。
- 3.上述症状和体征可经治疗缓解或自行缓解。
- 4.除外其他疾病所引起的喘息、气急、胸闷和咳嗽。
- 5.临床表现不典型者（如无明显喘息或体征），应至少具备以下 1 项试验阳性：①支气管激发试验或运动激发试验阳性；②支气管舒张试验阳性， $FEV_1$  增加 $\geq 12\%$ ，且  $FEV_1$  增加绝对值 $\geq 200ml$ ；③呼气流量峰值（PEF）日内（或 2 周）变异率 $\geq 20\%$ 。

符合 1~4 条或 4、5 条者，可以断为哮喘。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】支气管哮喘之寒哮证

证候：呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如塞，咳不甚，咯吐不爽，痰稀薄色白，面色晦滞。口不渴或渴真热饮，天冷或受寒易发，形寒畏冷，初起多兼恶寒、发热、头痛等表证，舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。

治法：温肺散寒，化痰平喘。

方药：射干麻黄汤加减。表寒明显，寒热身疼，配桂枝、生姜辛散风寒；痰涌气逆，不得平卧，加葶苈子、苏子泻肺降逆，并酌加杏仁、白前、橘皮等化痰利气；咳逆上气，汗多，加白芍以敛肺。

(3) 【正确答案】B

【答案解析】支气管哮喘之寒哮证

证候：呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如塞，咳不甚，咯吐不爽，痰稀薄色白，面色晦滞。口不渴或渴真热饮，天冷或受寒易发，形寒畏冷，初起多兼恶寒、发热、头痛等表证，

舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。

治法：温肺散寒，化痰平喘。

方药：射干麻黄汤加减。表寒明显，寒热身疼，配桂枝、生姜辛散风寒；痰涌气逆，不得平卧，加葶苈子、苏子泻肺降逆，并酌加杏仁、白前、橘皮等化痰利气；咳逆上气，汗多，加白芍以敛肺。

(4) 【正确答案】A

【答案解析】支气管哮喘之寒哮证

证候：呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如塞，咳不甚，咯吐不爽，痰稀薄色白，面色晦滞。口不渴或渴真热饮，天冷或受寒易发，形寒畏冷，初起多兼恶寒、发热、头痛等表证，舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。

治法：温肺散寒，化痰平喘。

方药：射干麻黄汤加减。表寒明显，寒热身疼，配桂枝、生姜辛散风寒；痰涌气逆，不得平卧，加葶苈子、苏子泻肺降逆，并酌加杏仁、白前、橘皮等化痰利气；咳逆上气，汗多，加白芍以敛肺。

(5) 【正确答案】A

【答案解析】支气管哮喘之寒哮证

证候：呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如塞，咳不甚，咯吐不爽，痰稀薄色白，面色晦滞。口不渴或渴真热饮，天冷或受寒易发，形寒畏冷，初起多兼恶寒、发热、头痛等表证，舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。

治法：温肺散寒，化痰平喘。

方药：射干麻黄汤加减。表寒明显，寒热身疼，配桂枝、生姜辛散风寒；痰涌气逆，不得平卧，加葶苈子、苏子泻肺降逆，并酌加杏仁、白前、橘皮等化痰利气；咳逆上气，汗多，加

白芍以敛肺。

2. (1) 【正确答案】D

【答案解析】题目中  $V_3 \sim V_5$  导联 ST 段抬高，提示为前壁心肌梗死。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】心肌梗死之心阳欲脱证

证候：胸闷憋气，心痛频发，四肢厥逆，大汗淋漓，面色苍白，口唇发绀，手足青至节，虚烦不安，甚至神志淡漠或突然昏厥，舌质青紫，脉微欲绝。

治法：回阳救逆，益气固脱。

方药：参附龙牡汤加减。

(3) 【正确答案】D

【答案解析】心肌梗死之心阳欲脱证

证候：胸闷憋气，心痛频发，四肢厥逆，大汗淋漓，面色苍白，口唇发绀，手足青至节，虚烦不安，甚至神志淡漠或突然昏厥，舌质青紫，脉微欲绝。

治法：回阳救逆，益气固脱。

方药：参附龙牡汤加减。

3. (1) 【正确答案】D

【答案解析】患者肝肿大，有腹水，并在肝右叶发现一直径 5cm 的占位性病变。因此最可能的诊断为原发性肝癌。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】AFP 目前仍是原发性肝癌特异性的标志物和主要诊断指标。

(3) 【正确答案】E

【答案解析】在超声或 CT 引导下用细针穿刺病变部位，吸取病变组织进行病理学检查，阳

性者即可确诊。

4. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】 上尿路感染（急性肾盂肾炎）常有发热、寒战，甚至出现毒血症症状，伴明显腰痛，输尿管点和/或肋脊点压痛、肾区叩击痛等。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】 尿涂片细菌检查设备简单、操作方便，检出率达 80%~90%，可初步确定是杆菌或球菌、是革兰氏阴性还是革兰氏阳性细菌，对及时选择有效抗生素有重要参考价值。

(3) 【正确答案】 C

【答案解析】 急性肾盂肾炎之膀胱湿热证

证候：小便频数，灼热刺痛，色黄赤，小腹拘急胀痛，或腰痛拒按，或见恶寒发热，或见口苦，大便秘结，舌质红，苔薄黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿通淋。

方药：八正散加减。

(4) 【正确答案】 B

【答案解析】 急性肾盂肾炎之膀胱湿热证

证候：小便频数，灼热刺痛，色黄赤，小腹拘急胀痛，或腰痛拒按，或见恶寒发热，或见口苦，大便秘结，舌质红，苔薄黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿通淋。

方药：八正散加减。

(5) 【正确答案】 D

【答案解析】 急性肾盂肾炎之膀胱湿热证

证候：小便频数，灼热刺痛，色黄赤，小腹拘急胀痛，或腰痛拒按，或见恶寒发热，或见口

苦，大便秘结，舌质红，苔薄黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿通淋。

方药：八正散加减。

5. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 缺铁性贫血的诊断包括以下 3 方面：

(1) 贫血为小细胞低色素性：男性 Hb < 120g/L，女性 Hb < 110g/L，孕妇 Hb < 100g/L；  
MCV < 80fl，MCH < 27pg，MCHC < 32%。

(2) 有缺铁的依据：符合贮铁耗尽 (ID) 或缺铁性红细胞生成 (IDE) 的诊断。

ID：符合下列任一条即可诊断。①血清铁蛋白 < 12μg/L；②骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失，铁粒幼红细胞 < 15%。

IDE：①符合 ID 诊断标准；②血清铁 < 8.95μmol/L，总铁结合力升高 > 64.44μmol/L，转铁蛋白饱和度 < 15%；③FEP/Hb > 4.5μg/gHb。

(3) 存在铁缺乏的病因，铁剂治疗有效。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 缺铁性贫血之脾肾阳虚证

证候：面色苍白，形寒肢冷，腰膝酸软，神倦耳鸣，唇甲淡白，或周身浮肿，甚则腹水，大便溏薄，小便清长，男子阳痿，女子经闭，舌质淡或有齿痕，脉沉细。

治法：温补脾肾。

方药：八珍汤合无比山药丸加减。

(3) 【正确答案】 C

【答案解析】 缺铁性贫血之脾肾阳虚证

证候：面色苍白，形寒肢冷，腰膝酸软，神倦耳鸣，唇甲淡白，或周身浮肿，甚则腹水，大



便溏薄，小便清长，男子阳痿，女子经闭，舌质淡或有齿痕，脉沉细。

治法：温补脾肾。

方药：八珍汤合无比山药丸加减。

(4) 【正确答案】C

【答案解析】铁剂治疗在血红蛋白恢复正常后至少持续 4~6 个月，待铁蛋白正常后停药。

(5) 【正确答案】A

【答案解析】畏寒肢冷者，加附子、桂枝以温阳祛寒。

6. (1) 【正确答案】C

【答案解析】糖尿病——上消（肺热伤津证）

证候：烦渴多饮，口干舌燥，尿频量多，多汗，舌边尖红，苔薄黄，脉洪数。

治法：清热润肺，生津止渴。

方药：消渴方加减。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】糖尿病——上消（肺热伤津证）

证候：烦渴多饮，口干舌燥，尿频量多，多汗，舌边尖红，苔薄黄，脉洪数。

治法：清热润肺，生津止渴。

方药：消渴方加减

(3) 【正确答案】E

【答案解析】糖尿病——上消（肺热伤津证）

证候：烦渴多饮，口干舌燥，尿频量多，多汗，舌边尖红，苔薄黄，脉洪数。

治法：清热润肺，生津止渴。

方药：消渴方加减。

(4) 【正确答案】A

【答案解析】若脉虚数，烦渴不止，小便频数，乃肺肾气阴亏虚，可用二冬汤加减。

7. (1) 【正确答案】B

【答案解析】参照美国风湿病学会 1982 年的 SLE 分类标准：①颧部红斑；②盘状红斑；③光过敏；④口腔溃疡；⑤关节炎；⑥浆膜炎；⑦肾脏病变；⑧神经系统病变：癫痫发作或精神症状；⑨血液系统异常：溶血性贫血或血白细胞减少或淋巴细胞绝对值减少或血小板减少；⑩免疫学异常：狼疮细胞阳性或抗 dsDNA 或抗 Sm 抗体阳性或梅毒血清试验假阳性；抗核抗体阳性。

在上述 11 项中，如果有超过 4 项阳性，则可诊断为 SLE。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】系统性红斑狼疮之气血两亏证

证候：心悸怔忡，健忘失眠，多梦，面色不华，肢体麻木，舌质淡，苔薄白，脉细缓。

治法：益气养血。

方药：八珍汤加减。

(3) 【正确答案】B

【答案解析】系统性红斑狼疮之气血两亏证

证候：心悸怔忡，健忘失眠，多梦，面色不华，肢体麻木，舌质淡，苔薄白，脉细缓。

治法：益气养血。

方药：八珍汤加减。

(4) 【正确答案】A

【答案解析】系统性红斑狼疮之气血两亏证

证候：心悸怔忡，健忘失眠，多梦，面色不华，肢体麻木，舌质淡，苔薄白，脉细缓。

治法：益气养血。

方药：八珍汤加减。

8. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 典型脑出血的诊断要点：

(1) 50 岁以上，多有高血压病史，在体力活动或情绪激动时突然起病，发病迅速。

(2) 早期有意识障碍及头痛、呕吐等颅内压增高症状，并有脑膜刺激征及偏瘫、失语等局灶症状。

(3) 头颅 CT 示高密度阴影。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 为确诊脑出血，应查头颅 CT，若头颅 CT 示高密度阴影，提示脑出血。

(3) 【正确答案】 B

【答案解析】 应根据患者年龄、病前血压水平、病后血压情况及颅内压高低，确定最适当的血压水平。而不是统一将控制血压在 140/90mmHg 左右。

9. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 中间综合征为急性中毒后 24 ~ 96 小时，胆碱能危象基本消失且意识清晰，出现以屈颈肌和四肢近端肌肉，第Ⅲ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ对脑神经支配的肌肉、呼吸肌无力为主的临床表现。结合患者病程及目前表现，考虑为中间综合征并且病情严重，治疗首先建立人工气道，进行机械通气。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 迟发性多发性神经病为急性重、中度中毒后 2 ~ 3 周，胆碱能症状消失后出现的感觉、运动型多发性神经病。先出现腓肠肌酸痛及压痛，数日后出现下肢无力，远端最明显，逐渐影响到下肢近端和上肢，多伴有肢体远端手套、袜套式感觉减退。

(3) 【正确答案】 C

【答案解析】慢性中毒主要为对症治疗，脱离接触 OPI，可短程、小剂量使用阿托品。症状、体征基本消失和胆碱酯酶活性恢复常约需 2~4 周。

10. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】二度房室传导阻滞：

①二度 I 型：P-R 间期逐渐延长；与此同时，R-R 间隔相应地逐渐缩短，直到 P 波后无 QRS 波群出现，如此周而复始。②二度 II 型：P-R 间期固定（正常或延长）；P 波突然不能下传而 QRS 波脱漏。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】二度房室传导阻滞心室率不太慢者，无须接受治疗；如心室率显著缓慢，伴有血流动力学障碍，甚至阿-斯综合征发作，应给予治疗，可用阿托品或异丙肾上腺素静脉滴注；间歇发生二度 II 型房室阻滞，有症状者，可安装人工心脏起搏器。 $\beta$ 受体阻滞剂抑制心脏功能，房室传导阻滞的病人可加重病情，故选 C。

(3) 【正确答案】 B

【答案解析】心律失常归属于中医学“心悸”“怔忡”等范畴。

11. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】消化性溃疡——肝胃郁热证证候：胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。治法：清胃泄热，疏肝理气。方药：化肝煎合左金丸加减。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】消化性溃疡——肝胃郁热证证候：胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。治法：清胃泄热，疏肝理气。方药：化肝

煎合左金丸加减。

(3) 【正确答案】 C

【答案解析】 消化性溃疡——肝胃郁热证证候：胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。治法：清胃泄热，疏肝理气。方药：化肝煎合左金丸加减。

(4) 【正确答案】 A

【答案解析】 两胁胀痛甚者，加郁金、川楝子。

12. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 慢性肾小球肾炎是由多种原因引起的，不同病理类型组成的原发于肾小球的一组疾病。该组疾病起病方式各异、病情迁延、病变缓慢进展、病程绵长，并以蛋白尿、血尿、水肿及高血压为其基本临床表现。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）为慢性肾炎患者控制高血压的首选药物。

(3) 【正确答案】 D

【答案解析】 慢性肾小球肾炎患者，蛋白尿 < 1g/d，血压控制在 130/80mmHg 以下。

(4) 【正确答案】 C

【答案解析】 慢性肾小球肾炎治疗的最终目标是延缓肾功能恶化。

(5) 【正确答案】 A

【答案解析】 慢性肾小球肾炎之脾肾气虚证

证候：腰脊酸痛，神疲乏力，或浮肿，纳呆或脘胀，大便溏薄，尿频或夜尿多，舌质淡，舌有齿痕，苔薄白，脉细。

治法：补气健脾益肾。

方药：异功散加味。

(6) 【正确答案】B

【答案解析】慢性肾小球肾炎之脾肾气虚证

证候：腰脊酸痛，神疲乏力，或浮肿，纳呆或脘胀，大便溏薄，尿频或夜尿多，舌质淡，舌有齿痕，苔薄白，脉细。

治法：补气健脾益肾。

方药：异功散加味。

13. (1) 【正确答案】E

【答案解析】根据患者慢性咳嗽，咳痰 20 年，近 5 年气促明显，球结膜充血水肿，口唇发绀，颈静脉怒张，桶状胸，两肺可闻及干湿性啰音等临床表现，可诊断患者为慢性肺源性心脏病。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】慢性肺源性心脏病之痰浊壅肺证

证候：咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫样，短气喘息，稍劳即著，脘痞纳少，倦怠乏力，舌质偏淡，苔薄腻或浊腻，脉滑。

治法：健脾益肺，化痰降气。

方药：苏子降气汤加减。

(3) 【正确答案】D

【答案解析】慢性肺源性心脏病之痰浊壅肺证

证候：咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫样，短气喘息，稍劳即著，脘痞纳少，倦怠乏力，舌质偏淡，苔薄腻或浊腻，脉滑。

治法：健脾益肺，化痰降气。

方药：苏子降气汤加减。

(4) 【正确答案】E

【答案解析】慢性肺源性心脏病之痰浊壅肺证

证候：咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫样，短气喘息，稍劳即著，脘痞纳少，倦怠乏力，舌质偏淡，苔薄腻或浊腻，脉滑。

治法：健脾益肺，化痰降气。

方药：苏子降气汤加减。

(5) 【正确答案】A

【答案解析】慢性肺源性心脏病之痰浊壅肺证

证候：咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫样，短气喘息，稍劳即著，脘痞纳少，倦怠乏力，舌质偏淡，苔薄腻或浊腻，脉滑。

治法：健脾益肺，化痰降气。

方药：苏子降气汤加减。痰多，胸满不能平卧，加葶苈子、莱菔子泻肺祛痰平喘；肺脾气虚，易出汗，短气乏力，痰量不多，酌加党参、黄芪、防风健脾益气，补肺固表。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题





正保医学教育网  
www.med66.com





医学教育网咨询热线：010-82311666 400 650 1888



正保医学教育网  
www.med66.com

医学教育网（www.med66.com）是正保远程教育旗下医学业务领域的核心品牌网站，是一家集医学类考试培训服务和政策动态信息服务的大型综合性医学辅导平台。

正保医学教育网目前已覆盖40类医学辅导、1000余门考培课程、累计注册学员近500万人，凭借雄厚的师资力量、先进的视频课件技术、严谨细致的教学作风及灵活多样的教学方式，为全国数百万医学从业人员提供了考证、从业和晋升等专业帮助，培养了大量医学人才。



官方微信号



课程免费体验



医学教育网App